

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com






E.BIBL.RADCL.

1656



-41.5

•



# OPERE

ANATOMICHE, E CERUSICHE

AMBROGIO BERTRANDI.

• \_ 

## OPERE

D 1

## AMBROGIO BERTRANDI

PROFESSORE DI CHIRURGIA PRATICA NELLA R. UNIVERSITA
DI TORINO, MEMBRO DELLA REALE ACCADEMIA DI
CHIRURGIA DI PARIGI, DELLA SOCIETA' REALE DI
TORINO, E PRIMO CHIRURGO DELLA S. R. M.
DEL FU RE CARLO EMANUELE

PUBBLIGATE, E ACCRESCIUTE DI NOTE, E DI SUPPLEMENTI

DAI CHIRURGHI

GIO. ANTONIO PENCHIENATI

İ

## GIOANNI BRUGNONE

PROFESSORI NELLA REGIA UNIVERSITA', E MEMBRÍ
DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI TORINO

TOMOL



## TORINO MDCCLXXXVI.

PRESSO 1 FRATELLI REYCENDS.

Con Privilegio di S. S. R. M.

•

.



## S. R. M.

Applauso universale, con cui sono state accolte nella più colta Europa le Operazioni Chirurgi-

VI

che di Ambrogio Bertrandi Professore in questa Regia Università, ha eccitațo nella Repubblica Letteraria gran desiderio, che si pubblicassero anche gli altri Trattati, dal che fare non era alieno lo stesso Autore, se da morte troppo immatura non fosse stato rapito. Io, che per parecchi anni vissuo era con lui familiarmente, e che perciò dovea meglio d'ogni altro essere informato delle sue intenzioni, univa agli altrui i miei voti. Quindi tosto che l'Augusto vostro GENI-TORE, il quale già prima m'avea fauo l'onore di accogliermi più volte benignamente a' suoi piedi, e non ispregiava i miei pareri, qualunque si fossero, nelle cose di mia professione, degnossi di promuoverz

mi alla stessa Cauedra; pensai di consegnargli alle stamper ma questo. mio pensiero incontrò nell' esecuzione non poche difficoltà, che non mi riusci per allora di superare; cosicchè, per recarlo ad effetto, ho. dovuto aspettare circostanze migliori. Queste si sono finalmente presentate sotto il Vostro Regno, o SIRE, che, ficcome d'ogni scienza, e d'ogni util arte, così della Chirurgia principalmente siete sommo Protettore. Voi non solo Vi siete compiaciuto di significare tutto il Vostro gradimento, che si divolgassero questi scritti, ma anche di consenuire, che fossero del glorioso Vostro immortal Nome fregiati. Ecco pertanto, che ossequiosamente Ve li presento parte recati a fine

sia colla scorta delle cognizioni, cha da lui avea acquistaie, sia con quella delle proprie offervazioni , unti di varle note accresciuti, ed alcuni interamente composti, per non aver egli potuto porvi mano nel breve tempo, che visse. Non posso però in verun modo tacere, che, per ridurli nello stato, in cui sono, ho giudicato, nella moltiplicità de' miei affari, prevalermi dell' opra del dottissimo, ed onorato Col+ lega Brugnoni, in cui insin da primi anni, che il praticai ancora Studente; conobbi felici disposizioni per divenire non ordinario Profefsore nell" Arte mia. Qualunque poi sia per essere l'estro di questo mio difegnò i io ne sarò, a. pieno soddisfano, se dalla M. V. fara confiderato come un effetto del puro zelo, ch' ebbi in ogni tempo d'impiegarmi a util pubblico in quella. Scienza, cui tutto mi sono dato.

Umilifimo, ed obbedientifimo Servitore, e Suddito fedelifimo GIOANNI ANTONIO PENCHIENATI.



## RAGIONAMENTO

ISTORICO, E CRITICO

SULLA VITA, SUGLI STUDJ, E SULLE OPERE

D 1

## AMBROGIO BERTRANDI.

PPOCRATE, o chiunque sia l'Autore del giuramento comunemente attribuito a IPPOCRATE (a), faceva solennemente giu-

(a) Il MERCURIALE ( nella prefazione alla sua bella edizione Greco-Latina delle Opere d'IPPOCRATE), e l'ALLERO ( Artis medica principes tom. IV. pag. 197.) escludono il giuramento dalle opere genuine d'IPPOCRATE, prima perchè facendosi in esso giurare ai giovani Medici di non praticare giammai la liuotomia, ma di abbandonarla viris operatoribus hanc operationem obeuntibus, credono doversi quindi dedurre, che quest' Opuscolo sia stato composto, dopo che la Medicina già era stata divisa in tre parti, e destinatisi a ciascheduna parte particolari Maestri, la qual cosa non si sece, che qualche secolo dopo IPPOCRATE, cioè a' tempi di EROFILO, e di ERASISTRATO ( CELS, m pref. lib. 1.); poi perchè in determinatione della significa de la cosa con perchè in determinatione della significa de la cosa con pressione della significa de la cosa con pressione della significa de la cosa con perchè in determinatione della significa della signific

Introduzione . giurare a' suoi Scolari, prima d'iniziarli nell'arte, che avrebbero tenuto quai propri fratelli germani i sigliuoli del Maestro, e instruitili gratuitamente (a). Noi, che abbiamo avuto la bella sorte di avere nell'Arte Cerusica a comune Maestro il celebratissimo Ambrogio Bertrandi, e che intimamente sentiamo l'eterno obbligo, che ci strigne per la paterna amorevolezza, con cui degnossi

am-

to giuramento si proibisce il proccurare l'aborto, mentre IPPOCRATE nel lib. de natura pueri non ha rossore di raccontare di averlo egli stesso proccura-to. Ma si risponde alla prima ragione, che dalle parole del giuramento in nessun modo si può conchiudere, che în que' tempi le tre parti della Medicina fossero esercitate da tre diverse persone, ma si bene che v'erano particolari operatori per la litotomia, come sarebbero a nostri di i Norcini, i quali, senza effere ne Medici, ne Cerusici, corrono per le campagne, facendo la castratura, l'erniotomia, e persino la litotomia. Si risponde all'altra con far osservare, che quel libro de natura pueri è da molti Eruditi riguardato come spurio, e che, quantunque fosse opera genuina d'IPPOCRATE, ció niente proverebbe nel nostro caso; conciossachè uno può dare un omimo precetto di merale ai fuoi Discepoli, e poi esse Resso non metterlo in esecuzione nell'occasione. Quel, che è certo, si è, che tutti gli Antichi attribuirono il giuramento a IPPOCRATE, tali sono Gab teno, Eroziano, Scribonio Largo, e moltifimi altri. Anzi dalla maggior parte degl' Interpreti credesi, che Aristofane là, dove parla del giuramento Medico, alluda a quello d'IPPOCRATE.

(a) Jurefurando affirmo ... Præceptorem quidem, que me hanc artem edocate, parentem toco habiturum ..., ejusque posteros apud me vodem toco, quo germanos frætes, fore, eosque, se hanc artem ediscere volent, absque

mercede, & Syngrapha edollurum

ammaestrarci, e indirizzare negli studi; non potendo dimostrare la nostra gratitudine inverso de' suoi Figliuoli, perchè, essendo vissuto celibe, non ne lasciò alcuno, ci eravamo fin dall'anno 1765., che Iddio il chiamò a se, determinati di usarla inverso i parti del suo ingegno, cioè inverso le sue Opere sì postume, che pubblicate prima della sua morte, con raccoglierle, ordinarle, e farvi a' debiti luoghi le necessarie aggiunte, e dilucidazioni, e poscia consegnarle alle stampe. Ci sembrava, che noi dovevamo questo figliale ufficio come alla memoria di un Precettore cotanto di noi benemerito, così pure alla Patria, la quale dalla pubblicazione, ristampa di quelle Opere, che i' avevano in pochi anni arricchita di non pochi eccellenti Cerufici, non poteva non ritrarne sommo vantaggio, e splendore. Il nostro disegno non potè allora per certi motivi, che sarebbe inutile il quì narrare, avere il suo effetto, e fummo nostro malgrado costretti a sospenderne l'esecuzione sino al presente. Ma fe un così lungo ritardo ci ha da una parte oltremodo afflitti, ci consola dall'altra il pensare, che il pubblico ne avrà in qualche modo il compenso, perchè possiamo ora darle corredate delle numerose, e interessanti scoperte, che

fonosi d'allora in poi fatte nella Chirurgia, e di molte osservazioni somministrateci dalla nostra pratica medesima.

Catalogo delle opere postume del BERTRAN-

Le Opere postume del BERTRANDI unite al Trattato delle Operazioni pubblicato, mentr' era ancora in vita, fanno quasi un corso compito di Chirurgia. Sono esse distinte in tanti Trattati, che pubblicamente, e successivamente dettò dalla Cattedra in questa Regia Università dall' anno 1758. fino alla sua morte. Questi Trattati, che sono de' Tumori. delle Ferite, delle Ulcere, delle malattie delle ossa, delle malattie veneree, e dell'arte ostetricia, sono metodici, e chiari, scritti in uno stile didascalico, qualche volta un po' trascurato, egli è vero, quanto alla lingua, ma assai animato, e che diletta pei fiori di eloquenza, che a tempo, e luogo sa spargervi, e per la scelta erudizione, onde sono ornati. Noi li pubblichiamo collo stesso ordine, con cui gli abbiamo cennati, avendovi aggiunto, ov' era d'uopo, delle postille, e i necessari supplementi a que Trattati, che lascio imperfetti, quali sono quelli de' tumori, delle malattie veneree, e dell'arte oftezricia; anzi perchè niente manchi al compimento di un corfo intero di Chirurgia, diamo pure un Trattato delle malattie degli occhi, delle orecchie. della

Quel, che da noi vi fi aggiunga.

della bocca, argomento lasciato intatto dal BERTRANDI. I' suoi Opuscoli anatomici, e Cerusici già stampati si premettono a que' Trattati, ai quali per la materia, che trattano, vanno naturalmente uniti: così alla Sezione de' tumori umorali, che tratta de' tumori caldi, facciamo precedere le Dissertazioni de hepate, & de hepatis abscessibus, qui vulneribus capitis superveniunt, e a quella de' tumori freddi la Dissertazione de hydrocele. Al Trattato delle malattie degli occhi mettiamo innanzi l' Ophtalmographia, e all' arte ostetricia le osservazioni de glanduloso ovarii corpore, placenta, & de utero gravido. Quel, che è nostro, farà messo tutto a piè di pagina, e avvertiremo a fuo luogo dei supplementi, che saremo obbligati di fare. Nè siavi chi voglia attribuire a vanagloria questo nostro procedere; è all' opposto nostra intenzione, ciò adoprando, di far sì, che il Lettore non attribuisca all' Autore i nostri errori. A ciaschedun Trattato si premette un breve estratto delle cose più essenziali contenutevi: prima però abbiam creduto cosa convenevole di dare un fuccinto ragguaglio della vita, e degli studi del BER-TRANDI, e del giudizio portato dai Letterati fulle Opere da lui medesimo pubblicate.

Gioanni

BERTRAN-DI.

Natcita del / Gioanni Ambrogio Maria BERTRANDI (a) nacque in Torino, ai diciassette di Ottobre dell' anno 1723 (b). Il suo Padre Giuseppe era un semplice, e meschino Flebotomista, e Barbiere; ma la fua Madre Vittoria SERRA; comecchà povera dei beni di fortuna, era però ricca di senno, e di sodo giudizio, donna onesta, laboriosa, ed economa, la quale suppliva col lavoro delle sue mani al poco guadagno, che il marito ritraeva dalla sua professione, insufficientissimo al mantenimento della numerosa famiglia, cioè di quattro figlie, e del nostro Ambrogio, alla cui educazione vegliava attentamente. Dall' assidua sollecitudine di questa ottima Madre, più che

> (a) Tal è il suo nome intero, non già Domeni-co Ambrogio, come per errore scrive l'eruditissimo signor Conte BAVA di San Paolo a pag. 6. del suo Elogio storico di Ambrogio BERTRANDI stampato in Vercelli l'anno 1782. in 8.

<sup>(</sup>b) Noi abbiamo ricavate queste notizie dal Libro autentico de' Battesimi tenuto nella Chiesa Metro-politana di S. Gioanni, nella quale il BERTRANDI su battezzato addì 18. di Ottobre di quell' anno-Correggansi adunque e il Signor Louis ( Éloge hi-storique de Mr. Ambroise BERTRANDI à Turin 1767. 8. ) e il lodato signor Conte, i quali il fanno naz scere l'anno 1727., amendue ai 18. di Ottobre. Il preciso anno della nascita è indicato dall' ELOY ( Distinguire historique de la Médecine tom. 1. pag. 329.), e dal signor PORTAL ( Histoire de l'Anatomie, & da la Chirurgie tom. v. pag. 433.), folamente ne mettono, come gli altri, il giorno ai 18. di Ottobre, che fu zi 17.

che da quella del Padre, uomo idiota anzi che no, e poco curante, ha sempre riconosciuto il grato, e amorevole: Figliuolo l'inclinazione, che mai sempre ebbe alla virtù, e allo studio, e alprocacciarsi col bene oprare un nome durevole.

Seppe egli fin da giovanetto distinguersi nelle classi inferiori fra i suoi coetanei, ed uguali per la vivacità, ed acume del suo ingegno; e dopo avere apprese fondatamente le lingue Latina, ed. Italiana, e sufficientemente la Greca, dieffi allo studio della Logica, della Geometria, delle Matematiche, e della Fisica, senza obbliare l'Eloquenza, nelle quali scienze tutte fece egli sì rapidi progressi, che si meritò l'universale applauso della Reale Università, e l'amore di tutt' i Professori, e principalmente del Padre Garro Religioso de' Minimi, che vi occupava allora la Cattedra di Fisica sperimentale.

Finiti questi studi preparativi, bisognava applicarsi a qualche scienza particolare, e scegliersi uno stato. La povertà, ond'erano oppressi i suoi Parenti, loro non permetteva di poter fare le spese occorrenti si per continuare gli studj, che per ottenere i gradi, a qualunque scienza si fosse egli addetto. Essi perciò l'avrebbero volentieri desti-

BERTRANDI TUM. TOM. I.

Suoi study nella Filo-

Vuol entrare nel chioftro tra ♣ Minimi .

1

nato allo stato Ecclesiastico, perchè in questo più, che in qualunque altro, era facile di ottenere dalla Reale Munificenza dei sussidi, che avrebbero servito e per se, e pel figliuolo. Questi però, se pur dovea abbracciare quello stato, voleva abbandonare affatto il secolo, ed entrare nel Chiostro tra i Minimi, invaghitosene per le accoglienze, e forse anche per le persuasioni del nominato Padre GARRO; e per tal fine studiò trattanto per due anni la Teologia. Mentre i Parenti, i quali, se va a sequestrarsi nel Chiostro, si vedono interamente frustrati delle speranze, che hanno in esso fondate pel sostegno della loro vecchiaja, si sforzano con tutt' i mezzi possibili di distorlo da quella determinazione, e sono tuttavia incerti che farlo applicare, eccoti che la generosità di un loro Amico viene a trarli d'ogni incertezza, e timore, con risolvere il Figliuolo allo studio della Chirurgia, e con somministrargli tutt' i comodi per riuscirne un valente Professore; intendiamo parlare di Sebastiano KLINGHER Senese, allora Professore di Chirurgia, e Cerufico del Re, uomo dotto, e virtuoso, peritissimo della sua Arte, i cui Trattati Cerusici, dettati precisione, e chiacon non ordinaria rezza, e con purità di lingua, corrono an-

N'è diftolto dal KLIN-GHER, il qual lo perfuade allo fludio della Chirurgia, e lo fa entrare nel Real Collegio delle Province.

ancora manoscritti per le mani dei dotti, e si fan leggere con piacere. Siccome i Professori hanno il dritto di nominare uno Studente per Alunno nel Real Coldelle Province, se ne valse il KLINGHER a benefizio del BERTRANDI.

destinandolo per la Chirurgia.

Appena entrato in quest utilissimo sta- Vi si applibilimento del Re VITTORIO AME-DEO II., con tanto fervore fi· mile nella intrapresa carriera, e principalmente mostrò tanta inclinazione per la Notomia, che tirò a se gli sguardi di tutt' i suoi Superiori, e sorpasso in breve tutti gli altri Studenti: facevasi sovra tutto ammirare colla sua facondia conversare, e coll'acutezza, e prontezza del suo spirito nello sciogliere ex abrupto ogni più astrusa quistione, che gli fosse proposta: non passava giorno, che non isparasse qualche animale o vivo. o morto, e che non portasse dallo Spedale a casa qualche pezzo di cadavere umano; fempre ne avea la camera guernita, e piene le saccocce persino a tam vola. Tre anni dopo fu fatto Ripetitore E fano Rid'Anatomia, e l'anno seguenté, essent Notomia, e do morto quello di Pratica, dopo averne recitata una eloquente Orazione funebre, fu nominato al suo luogo, sicchè ebbe poi egli solo le due cariche di Ripetitore di Anatomia, e di Pratica:

ca con gram fervore, principalmente alla

poi anche di Pratica

che sogliono conserirsi a due diversi soggetti; anzi tanta era la stima, che si aveva del suo sapere, e della sua facilità nel discorrere con molta eleganza in Latino, che gli su anche conserita la carica di Ripetitore delle Instituzioni di Medicina, che si suol dare ai migliori fra gli Studenti Laureandi di Medicina, non mai a quelli di Chirurgia (a).

**E** delle Infiituzioni Mediche

Era il BERTRANDI debitore di tutti questi riguardi, e distinzioni al perspicace avvedimento del Dottor Collegiato Francesco CARAMELLI allora Presetto della Facostà Medico-Cerusica nello stesso Real Collegio delle Province, epperciò suo immediato Superiore. Era il CARAMELLI uomo dotto, e molto in-

gegno-

<sup>[</sup>a] Bisogna qui correggere un equivoco scappato al signor Louis (pag. 10 del suo Elogio), il quale dice, che Mr. BERTRANDI en moins de deux ans (dopo esser entrato in Collegio) dévint Préfet de sa Faculté, e ai signori Portal, ed Eloy, i quali, dopo aver copiato il Louis riguardo alla pretesa Presettura, soggiungono: Et bientôt après Répétiteur de pratique, quasi che l'impiego di Presetto di Chirurgia, o di Presetto del Collegio di Chirurgia sosse inferiore a quello di Ripetitore. Vuossi dunque sapere, non esservi presso di noi alcun impiego, che porti il-titolo di Presetto di Chirurgia, ma bensì quello di Presetto di Medicina, che è un impiego, che si conferisce dal Re nel Collegio delle Province sempre a un Medico già laureato, e che mai non ebbe il Bertrandi; bensì ebbe quello di Ripetitore, che si da dal Governatore di quel Collegio agli Studenti, che più si distinguono colla loro saggia condotta, colla loro applicazione, e riuscita nello studio.

gegnoso, assai versato nella Geometria; e in tutte le parti della Fisica. Già, prima che il BERTRANDI intraprendesse lo studio della Chirurgia, avea egli composto cinque ragionamenti, ne quali cercava di spiegare l'uso della milza, del timo, de reni succenturiati, e delle mammelle nell'uomo, e stava lavorando at- Ajuta il CAtorno diversi altri punti difficilissimi di Fisiologia, come circa l'uso della placenta, e circa la circolazione del sangue ec. Per quanto speciose fossero le conghietture del CARAMELLI, potevano però riguardarsi, come tante altre di belli spiriti, quai fogni d'un uomo, che vegghia, se non erano appoggiate sulla struttura delle parti. Il BERTRANDI, cui il CARAMELLI fece leggere quelle Differtazioni, le trovò ben ragionate, ma lo configliò a non fidarsi a quelle apparenze di verità, e di esaminar prima esattamente, se l'Anatomia niente diceva in contrario, e si esibì di fargli esso stesso le necessarie preparazioni. Si accinse all' opra il giovane, e destro incisore, e fra le cinque dissertazioni soltanto quella de lienis usu gli sembro fiancheggiata da fode, e vere ragioni anatomiche, ond' essa sola si mandò per le stampe a Pavia nel 1746. (a): Eam, in qua de lie-

polizione di

E principalmente uno full'ufo della milza.

<sup>(</sup>a) Eccone il titolo, che noi portiamo tutto insero, perchè di questo libricciuolo non fanno men-

ne agitur, delegi (dice il CARAMELLI nella Prefazione) ... hac præserim de caussa, quod hanc viro sapientissimo ( e intende parlare del BERTRANDI ) quique apud me plurimum valet, nuperrime probari intellexi. Già lo SCHEL-LAMMERO (a), lo STUKELEY (b), e il Duvernoy (c) aveano riguardata la milza quale scaricatojo del sangue; già il celebre Lieuteaud (d) avea fatto ofservare, com' essa, quando il ventricolo è disteso, resti picciola, e quando è vuoto, divenga turgida, e grossa; niuno però meglio del CARAMELLI, nè con più forti argomenti ha dimostrato, che quell' alterna turgescenza, e impicciolimento della milza sono prodotti dal fangue, il quale, nel tempo che il ventricolo è pieno, e dilatato, portasi in questo

Breve andlisi di quest' opuscolo.

> zione ne l'Allero, ne il Portal, ne alcun altro Bibliografo, che noi sappiamo: De lienis usu, & de mira phialarum quarumdam vitrearum diffractione Differ-tationes, Auctore Francisco CARAMELLI Taurinensi, Medicina Collegii Doctore, ejusdemque Facultatis in Regio Provinciarum Collegio Prafetto. Ticini Regii in 8. apud Joannem Benedictum Rovedinum in via nova sub signo Jesu, senza data di anno, ma che sappiamo dal BERTRANDI nella nota (c) pag. 11. della sua Disser-tazione de hepate essere del 1746.

<sup>(</sup>a) Introductio in Physiolog. pag. 224.
(b) In una sua Opera Inglese intitolata Anatomia
della milga Londra 1723. in sol.

<sup>(</sup>c) Academ. Petropolit. som. IV. pag. 162. (d) Histoire de l'Academ. Royale des Sciences de Paris

questo sacco in copia molto maggiore; che quando è ristretto, e contratto. Ora il sangue, che dall' arteria celiaca dovrebbe per mezzo delle ftomaciche essere spinto nel ventricolo, portasi per la splenica nella milza, che ne rimane perciò gonfia. Queste alterne dilatazioni, cui va soggetto questo viscere spugnoso, crede il BERTRANDI essere la cagione, per cui vi si osservano sì frequentemente tante incilure, e (a). Ella è stata veramente una gran perdita per la Repubblica Letteraria, che il CARAMELLI nel fiore della sua età. e nel mezzo de' suoi lavori scientifici siaci stato rapito dalla morte: il Bertrandi non cessa di compiangerlo in più luoghi delle sue Dissertazioni de hepate. & oculo.

Tra gli altri punti fisiologici presi a illustrare dall' acuto CARAMELLI uno era quello della vista; e conciossiachè nel 1745. dovesse egli pubblicare su ciò le sue idee col titolo di nuova Teoria sull' Ottica, il BERTRANDI compose allora, e lesse pubblicamente nel Real Collegio delle Province l'accennata sua Dissertazione sull'occhio intitolata Ophtalmographia

Compene, & pubblica una differe tazione full', occhio.

<sup>(</sup>s) Nella sua Dissertazione de hepate pag. 114

phia (a), la quale però non vide la luce, che nel 1748. Chi nol sapesse, mai non s' indurrebbe a credere, esser dessa lavoro di un giovane Anatomico appena giunto all'età di 22. anni, il quale solamente da due anni indietro si fosse addetto alla diffecazione de cadaveri umani, e de' bruti; vi brillano l'ordine non meno, che l'efattezza delle descrizioni, la varia erudizione, e il buon giudizio nel sapere scegliere i migliori fra i punti controversi. L'Allero (b), ed il Por-TAL (c) ne fanno grandi elogi, e il celebre Zinn (d) mostra non poco rammárico di non aver potuto proccurarfela per servirsene nella bellissima descrizione. che ci ha poi data dell'occhio umano, Fa il BERTRANDI offervare, che, quantunque la figura del bulbo si accosti nell' uomo a quella di un globo, suol effere

Analifi di questa disfertazione.

però

<sup>(</sup>a) Hac dissertatio (dic'egli pag. 66. nota \*) conscripta fuerat, ut antecederet novam Optices theoriam,
quam prope diem editurus erat ingeniosissimus, atque doAssimus Amicus meus Franciscus CARAMELLI, cujus
snortem adhuc lugent omnes boni-&c., e pag. 49. nota \*
Hanc dissertationem in Regio Provinciarum Collegio jam
recitaveram ab anno 1745., dum etiam ophtalmotomiam
peragebam.

<sup>(</sup>b) Method. stud. medici tom. 1. pag. 563. dell'edizione di Venezia, e Bibliotheca Anatom. tom. 11. pag.

<sup>(</sup>c) Histoire de l'Anatomie, & de la Chirurgie tom. V.

Pag. 434.

(d) In più luoghi del suo libro de ecule umane,

però quasi sempre alquanto più lunga, che larga; che nei capretti, nei buoi, e nei cavalli esso bulbo è meno convesso posteriormente, che anteriormente, che negli uccelli è piano anteriormente, e ne' pesci tanto anteriormente, che posteriormente; infine che nell'uomo medesimo è sempre più, o meno appianato nel sito della sclerotica, dove vengono a inserirsi i tendini de' muscoli retti. Dimostra, che, se nell' uomo la circonferenza della cornea lucida non è esternamente affatto circolare, ciò dipende dall' avanzamento irregolare sopra di essa della congiuntiva: fa vedere, ch' essa cornea è sempre più sottile centro, che verso la periferia, e ne descrive maravigliosamente l'elegantissima rete fibrosa. Degno di essere letto è masfimamente quanto scrive sulla moltiplicità, e sulla conformazione degli occhi ne' diversi insetti: sostiene, contro il sentimento di vari Anatomici, essere piana, e non convessa l'iride: nega l'esistenza delle glandule nella coroidea suppostevi dal MERY, e dice con molta probabilità, essere forse stati presi per glandule alcuni piccoli nodi, o varici di quella vascolosissima tunica, massime che in un cane mastino, cui avea allacciato la vena jugulare di un lato, trovò moltiplicate dette varici sull'occhio dello stef-

so lato, mentre non se ne osservarono dall' altro lato. Cosa v'ha di più esatto, e di più fino, che la descrizione, fa del corso, e dell' intreccio de' vasi sanguigni arteriosi, e venosi, che scorrono per la medesima tunica, e da questa passano nella sclerotica, e sull'uvea, formanti que' bellissimi cerchi vascolari attorno il ligamento cigliare? Chi non ammira la sua pazienza, e destrezza nell'aver faputo, e potuto feguitare il corso de' vasi pellucidi, ch' egli allora credea arterie, e vene linfatiche, i quali dice, che dalla coroidea, e da que cerchi si rislettono sulla retina, e sulla capfula cristallina? E acciocche ognuno potesse ugualmente scoprirli, e vederli, indica i mezzi, onde si è servito, per rendergli apparenti, accertandoci, effere così poco immaginaria la descrizione, che ne ha data, che anzi ella è molto inferiore a quel, che ha veduto: Nos certe singula, quæ vidimus (dice egli) minus luculenter; quam videre contigit, descripsimus. Basti questo piccolo saggio in prova della bontà di questo sucoso discorso, del quale inoltre il citato AL+ LERO (a) raccomanda la lettura a

<sup>(</sup>a) Method. studii medici pag. 417, della citata edi-

desidera d'informarsi delle principali distribuzioni de' diversi rami della prima branca del quinto pajo de' nervi; che quì il BERTRANDI è veramente originale, da che niente avea potuto imparare dalla descrizione dello stesso nervo, che nell'anno medesimo 1748. ne pubblicò il chiarissimo MECKEL (a).

Mentre con tanta affiduità lavorava pel suo Amico, pei suoi allievi, e pel pubblico, non tralasciava però di occuparfi intorno agli studi del rimanente dell' Anatomia sì istorica, che pratica, e di tutte le parti della Chirurgia, di esporsi con onore ai diversi esami privati, e pubblici, prescritti dalla Legge intorno tutte quelle materie, per ottenere il libero esercizio della professione. Non ignorava egli, che questi esami sarebbero stati a suo riguardo tanto più rigorofi, quanto maggiore era la fama, che già per tutta la Città correva della fua dottrina, fama, che in certi spiriti bassi avea eccitata gelosia, come dicesi, di mestiere, oltre che non avea egli pensato a cartivarsi l'animo de Cerusici. che doveano esaminarlo. Ma in que' diversi cimenti seppe egli con tanta

Prende con applaufo tutti gli efami, ed è aggregato al Collegio di Chirurgia.

<sup>(</sup>a) Joannis Friderici MECREL Tractatus Anatomicophyfiologicus de quinto pare nervorum cerebri. Gottingæ 2748. in 4.

cisione, e prontezza soddisfare a tutte le questioni fattegli, che l'invidia dovette tacere, e consumarsi dentro se stessi, e quegli stessi, che più erangli indisposti contro, acclamarso a voci unanimi. Così su aggregato al Collegio di

Chirurgia nel 1747.

Avea egli infatti bisogno di tutto quel capitale di scienza, per tirarsene decorosamente; poichè di que giorni avea avuto la disgrazia di perdere, come si è detto, per morte il CARAMELLI, e per dissensioni nate per le ragioni, che si diranno, la buona grazia del BIANCHI, i quali avrebbero potuto in quell'occafione proteggerlo, raccomandarlo, ed essergli di grandissimo aiuto. Appena il BIANCHI avea avuto notizia dell' abilità del nostro Ambrogio nell'arte di tagliare i cadaveri, che l'attirò a se con molte carezze, e regali: ne' tempi scolastici il volea quasi sempre in casa per commensale, e nelle vacanze seco lo conduceva in villeggiatura: dell' opera sua si serviva per preparare le diverse parti, di cui abbisognava per la quarta edizione, che meditava, della sua Storia epatica, e per le altre opere anatomiche, e fisiologiche, che stava lavorando. Furono d'accordo, ed Amici per alcuni anni; ma quando il BIANCHI volle obbligarlo a tradir la verità, onde

E' chiamato dal BIAN-CHI, acca-rezzato, e regalato.

Viene con effo in rottura, e perchè.

avere un appoggio in suo favore nelle note querele tra esso insorte, e il Mor-GAGNI, il BERTRANDI, cui era bensì cara, anzi lucrosa, e quasi necessaria. l' amicizia del BIANCHI, preferì da vero Filosofo la verità all'amicizia, e all' interesse, e si allontanò da chi cercava tiranneggiargli lo spirito, e il cuore: se ne allontano senza far motto, gnarsi, e continuò e in particolare, e in pubblico, e a voce, e in iscritto a mostrarsi grato de' benefizj ricevuti, sempre chiamandolo suo stimatissimo, e amantissimo Maestro. Sentasi ciò, che ne dice a pag. 88. dell' Ophtalmographia: Plura adhuc de lacrymalibus dudibus mihi superessent dicenda, quæ tamen prætereo, utpote Præceptori meo reservata; cujus certe opera de hisce ductibus historiam anatomico-pathologicam numeris omnibus absolutam habebimus cum iconibus, quæ certe non improbabuntur; mea enim diligentia, & industria, qua utebatur amantissimus Præceptor, non exigua, ni fallor, fuit in præparandis partibus ex optimis cadaveribus (a).

<sup>(</sup>a) Nè la quarta edizione della Storia epatica, nè la dissertazione sui condotti lagrimali qui accennata dal nostro Autore non sappiamo, che siansi mai dal BIANCHI pubblicate.

Terminarono col finire dell' anno scolastico 1747. i sei anni di stanza nel Collegio assegnati dai Regi Statuti, e dovea il BERTRANDI uscirne, e andarsi a procacciare il vitto coll' esercizio della sua professione; ma l'Abate di RICCAL-DONE de Marchesi di Melazzo, allora Governatore di esso Collegio, conoscendo il bisogno, che avea di un tanto foggetto per l'instruzione de Candidati di Chirurgia, facilmente ottenne dal Re la permissione di continuare a ritenervelo per Ripetitore di Chirurgia pratica, coll' obbligo inoltre d' instruirgli anche nella Geometria, e nella Fisica. Vi dimorò ancora per due anni, ne quali vieppiù si esercitò nella dissecazione umana, che comparativa, nelle operazioni Cerusiche sopra i cadaveri, e nella pratica col sempre frequentare lo Spedale. Nelle vacanze dello stesso anno 1747. egli compose la sua Dissertazione ful Fegato, che pubblicò l'anno leguente insieme con quella sull' occhio, amendue dedicate a S. E. il Cardinal delle LANZE allora Grande Limofiniere

Pubblica una differtazione ful fegato

> (a) Eccone il titolo: Ambrosi BERTRANDI dissersationes anatomica de hepate, sa oculo. Augusta Taurla-

> S. M., dal quale il BERTRANDI ricavava di tanto in tanto dei sussidi per se, e pei Genitori (a). Il ragionamento

Analifi di quest' opefcolo .

ful fegato fu dal Pubblico accolto cogli steffi elogi, che l'altro sull'occhio. Multa hic utiliter docet, dice l'ALLERO (a), come l'aver offervato sullo stesso soggetto, oltre la milza ordinaria, due piccole milze; l'origine dell'arteria epatica dall' aorta immediatamente: la mancanza della vescichetta del fiele in una donna: il folco fcolpito nella faccia posteriore del pancreate verso il suo margine superiore, per ricevere la vena folenica, di maniera che, quando il pancreate è scirroso, questa vena restando compressa, la milza acquista un grossissimo volume: le anastomosi non tanto frequenti delle vene spermatiche, e persino di quelle del pene, e della prostata coll'emorroidale interna: nega però affolutamente le anaftomofi delle vene dell' utero colla stessa emorroidale supposte dallo STAL, perchè favorivano la sua ipotesi, al qual proposito sa ottimamente riflettere, che per lo più s'ingannano, quando theoretici Scriptores ad sua theoria ideam humani corporis fabricam sine Anatome accommodant . Prova contro l' EISTERO, che dalla vena ombilicale, prima d'inserirsi nella

VCIIA

norum 1748. in 4., e non in 8., come per errore mette l'Allero (Biblioth. anatom. tom. 11. pag. 429.)
(a) Bibliotheca anatom. loc. cit.

vena-porta, anzi dallo stesso condotto venoso spargonsi nella sostanza del fegato non pochi rami: ci afficura di aver veduto più d'una volta le vene epatiche sboccare nella vena-cava, dopo che questa avea già oltrepassato il diaframma. Sostiene con moltissimi argomenti cavati dall' Anatomia comparativa, dai morbi, dall'autorità di non pochi valenti Anatomici, e dalla propria sperienza l'esistenza de' condotti epatico-cistici; dà un' esattissima descrizione mento sospensivo del fegato, e della sua capsula. Troppo secco però ci pare il giudizio, che ne dà il PORTAL (a). il quale dice, che la description, l'Auteur donne des ligamens du foie, est ce qu'il y a de meilleur dans cette L'ALLERO foggiunge, che BERTRANDI confuta la firuttura glandulosa di questa viscera, e il PORTAL, che vuole aggiungere qualche cosa all' analisi dell'ALLERO, che per lo più copia senz' andare a consultare gli oriqu'il y ait des ginali: Il nie (dice) glandes dans le foie, mais il ne le prouve pas. Ma il Bertrandi, dopo avere ne' tre ultimi paragrafi addotte le

Nonè vero, che neghi affolutamente la firuttura glandulofa del fegato.

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Anatomie, & de la Chirurgie tom. V.

ragioni del MALPIGHI, che credeva il fegato glanduloso, e quelle del Rutschio, che lo voleva semplicemente vascolare, non si mette di alcun partito, præcipue quum ( dice egli ) nondum tantam habeam experimentorum copiam, ut litem hanc solvere possim; poi in una nota contentasi di dire: ipse quidem hepatis substantiam granulis, seu acinis factam perspexi, Malpighianas autem vesciculas, aut folliculos, ingenuus dicam, numquam vidi . . . Profecto facile crederem in glanduloso systemate, non minus quam in vasculoso, de acinorum differentia cogitandum esse. non vede quì la savia ritenutezza del nostro Autore, e la sua prudente irresoluzione, non già un'assoluta asserzione fenza prove, come pretende il PORTAL?

Nel 1749. ai 27. di Marzo fu accet- E accettato tato membro del Real Collegio di Chi-nel Collegio di Chirura rurgia, alla qual accettazione erafi abilitato coll' aver due anni prima prefo l'esame, che dicesi di aggregazione, e lo stesso anno uscì dal Collegio delle Province, per esercitare la sua Profesfione per la Città. I Chirurghi Colle- sua condorgiati godono del dritto di esaminare i ta nell'esa-Candidati di Chirurgia, affine di giudicare dai progressi, che hanno fatto nell' arte, se meritino, o no d'esserne am-BERTRANDI TUM. TOM. I.

messi al libero esercizio. In questi esami il BERTRANDI come si mostrò molto sagace, ed oculato, così si acquistò la fama di giusto, e disinteressato, piuttosto propenso alla clemenza, che alla severità.

Incominciava egli ad avere un numero sufficiente di ammalati sotto la sua cura, e già i Grandi, conosciutane la dottrina, e l'onestà, cercavano di ottenergli dal Sovrano qualche onorifico impiego, quando al principio dell' anno 1752. essendo restata vacante la carica di pubblico Incisore Anatomico alla Regia Università, il Cavalier Ossorio Ministro per gli affari esterni, il quale era folito nelle ore di ritaglio fentir volentieri il BERTRANDI ragionare delle cose non meno di Chirurgia, che delle altre scienze, il propose al Re per quella carica. Ma CARLO EMANUELE, il quale era informatissimo del merito del Ber-TRANDI, io l'ho destinato, rispose, a qualche cosa di meglio, e fattolo da li a non molto a se chiamare, gli esibì il viaggio di Parigi, e di Londra, ove a spese Regie sarebbe restato tre anni per vieppiù perfezionarsi nell' Arte. Ammutolì, e turbossi all'inaspettata Reale offerta; ma l'affabile, e grazioso Monarca, interrogatolo della cagione del suo turbamento, ne prese un più alto

con-

Il Re lo manda a fue fpefe a Parigi, e a Lonconcetto, quando senti dal rispettoso Suddito ciò procedere dal rincrescimento di dover lasciare i Parenti, poveri, e attempati, privi del soccorso, che loro proccurava coll' esercizio della sua arte, nè esitò un istante a consortarnelo, con dire, ch' egli stesso ne avrebbe avuto cura, come infatti, sinchè il sigliuolo dimorò suori della Patria, surono dalla paterna generosità di quel gran Re lar-

gamente sostentati.

Arrivò a Parigi verso la fine del mese di Aprile dello stesso anno 1752., ove dal Marchese di San GERMANO, allora Ambasciadore del Re di Sardegna presso il Cristianissimo, fu raccomandato ai più celebri Cerufici di quella Capitale, e più particolarmente al signor MORAND Segretario perpetuo dell' Accademia Reale di Chirurgia, e Cerufico Maggiore dello Spedale degl' Invalidi, e al signor Louis, che poi succedette al MORAND nell'impiego di Segretaro; quest' ultimo sel ritirò in casa per ospite. Egli è indicibile, con quale assiduità, e premura frequentasse gli Spedali, e le lezioni di que' gran Maestri. Seppe egli colla sua docilità, e modestia talmente cattivarsene l'animo, che tutti andavano a gara per prestargli tutti gli agi da esercitarsi sia nella diffecazione, che fu sempre il suo mestier favorito, che nelle operazioni

A Parigi entra a pigione in safa del signor Louis,



E contrae amicizia coi più celebri Cerufici, e Filosofi di quella Capipale. Cerufiche. Ne solamente coi più samosi Cerufici contrasse egli amicizia, e sami-gliarità, quali erano, oltre il MORAND, e il Louis già nominati, il VERDIER, il GARENGEOT, il BORDENAVE, l'An-DOUILLÉ, ma anche coi più rinomati Fisici, e Filosofi, tra i quali non vogliono tacersi il WINSLOW, il d'ALEMBERT, il BUFFON, il MEYRAN, e il REAUMUR ec.; gli andava a visitare tutti almeno una volta tutti i quindici giorni.

Non tardò il Louis a conoscere l' estensione delle cognizioni possedute dal suo Allievo, sicche ebbe a dire all'Ambasciadore, che S. E. non uno scolaro, ma un maestro gli avea messo in casa. Egli stesso ci ha conservata la memoria d'una discussione letteraria avuta col BERTRANDI fin dal principio, che l'ebbe a pigione. Il BERTRANDI avea fovente in bocca il trito assioma, che le operazioni di Chirurgia vogliono essere fatte tuto, cito, & jucunde. L' eloquentissimo, e dotto signor Louis (a) rispondeva essere cosa malagevole il potere scoprire le ragioni, per le quali di queste tre condizioni siafene fatto un assioma; diceva, essere anzi una falsa massima di ASCLEPIADE, comunemente attribuita a CELSO,

Discussione avuta col Louis circa il tuto, cito, & jucunda di ASCLE-PIADE,

<sup>(</sup>a) Pag. 22. del già citato Éloge historique.

CELSO, il quale la cita soltanto per condannarla, e disapprovarla; che ASCLE-PIADE ne faceva bensì la regola della sua condotta nell' esercizio della Medicina interna, ma che mai non ha inteso di applicarla alla Chirurgia; e che CELSO medesimo ne parla nel cap. della cura delle febbri, e non dove si tratta delle operazioni Cerusiche, che anzi riguardo a queste CELSO biasima espressamente la celerità. Cette petite discussion (soggiunge il Louis ) servit à m'attacher Mr. BERTRANDI, en qui, malgré ses lumières, & l'étendue de ses connoissances, j'ai trouvé constamment la docilité, qu'on ne rencontre pas toûjours dans ceux, en qui elle n'auroit pas même le mérite d'être une vertu. Ella è veramente da lodarsi al sommo la prudenza del Ber-TRANDI, il quale, quantunque non restaffe appagato dalle apparenti ragioni, o piuttosto dai sossimi del suo Maestro, tuttavia s'infinse allora di averle per buone, e si tacque; e bisogna pure, che non l'abbiano soddisfatto, da che tanti anni dopo nell' Introduzione al suo Trattato delle Operazioni inserì, e inculcò la massima di ASCLEPIADE. È come mai quelle ragioni avrebbero potuto convincere un uomo così perspicace, qual era il BERTRANDI, se sono portate contro una verità patentissima, e san dire a

Riflessioni critiche intorno questa discussione.

CEL-

Celso, la cui lettura eragli famigliariffima, l'opposto appunto di quel, che dice? Chi mai potrà mettere in dubbio, doversi dal Medico, e dal Chirurgo, se iono uomini dabbene, e onesti, cercare la guarigione de' loro ammalati coi mezzi più sicuri, più pronti, e meno ingrati, che sia possibile, che è quanto intese d'insegnare ASCLEPIADE, quando al dir di Celso (a) lasciò scritto: Officium esse Medici, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet? Havvi egli un aforismo in IPPOCRATE tanto certo, così evidente, e soggetto a minori eccezioni? ASCLEPIA-DE, egli è vero, non ha applicato quella massima particolarmente alla Chirurgia, ma l'ha estesa a tutte le parti della Medicina; non sono però da condannarsi i Cerusici, se l'hanno singolarmente applicata alla loro arte, e se in tutt' i libri di Chirurgia antichi, e moderni da CELSO in poi trovafi ripetuta, e raccomandata? Se il Romano Scrittora ne parla nel cap. della cura delle febbri, non vuolsi già da ciò conchiudere, che intendesse, non doversi quel precetto estendere alla Chirurgia, ma sibbene doversi riguardare, come le riguardava ASCLEPIADE, qual precetto generale, e

<sup>(</sup>a) De Medicina lib. 111. cap. 1V.

comune a tutte le parti della Medicina. Ned è vero, che lo disapprovi, anzi si spiega a chiare note, che lo scopo del Medico debb' effere di potere nel medicare mettere in pratica tutte e tre quelle condizioni: id votum est (dic'egli); e perchè suol essere per l'ordinario pericolosa la soverchia prestezza, e giocondità, si riserba, quando parlera della cura de' morbi in particolare, di considerare, con qual moderazione dovrà il Medico regolarsi, affinchè, per quanto è possibile, quelle tre condizioni si possano ottenere, dando però sempre la preferenza alla ficurezza (a). Nè altrimenti la discorre GALENO (b), che dice: Danda in hisce ( parla delle Operazioni di Chirurgia ) semper opera est, ut tum brevi tempore, tum citra dolorem, tum quam tutissime cures: verum, ut tuto cures, tribus sis intentus oportet, unum, primumque est, ut omnino absolutionem operis consequaris. La ficurezza, e la salute dell'infermo vogliono sempre mai effere

<sup>(</sup>a) Sed fere periculosa esse nimia & sessinatio, & voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit, ut, quantum sieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit. Dalla qual espressione in ipsis partibus curationum ognum vede, che Gelso vi comprende anche la Chiturgia, che è una parte della Medicina.

essere la mira principale, e le altre due condizioni, cioè la prestezza, e la dolcezza esservi subordinate. Lo stesso As-CLEPIADE, il quale usava un metodo semplicissimo, e dolcissimo, nelle occorrenze, come nota nello stesso luogo CELSO, talmente se ne allontanava, che era riputato persino crudele (a). Tocca adunque al perito, savio, e prudente Cerusico (dacchè noi dobbiamo restringerci alla Chirurgia ) il combinare in modo i mezzi di fare le operazioni, che si accosti, quanto più si può, alle tre condizioni, se tutte non le può, operando, ottenere. Nessuno ignora, che il non mai abbastanza lodato IPPOCRA-TE LATINO tra le altre qualità da lui ricercate nel Cerufico, vuole anche, che sia intrepido, nè troppo compassionevole, sic ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus magis, quam res desiderat, vel minus, quam necesse est, secet (b); ma quì, come si vede, non biasima espressamente la celerità, come pretende

(b) Lib. VII. in præfat,

<sup>(</sup>a) Quo magis falluntur, qui per omnia jucundam ejus (ASCLEPIADIS) disciplinam esse contendunt. Is enim ularioribus quidem diebus (parla della cura delle sebbri) cubantis etiam luxuria subscripsu; primis vera toris vicem exhibuit.

il signor Louis (a), ma sì la soverchia celerità nociva al felice esito della operazione: Sat cito, si sat bene, dice il

proverbio (b).

L'anno 1753. addì 25. di Ottobre lesse il Bertrandi in un' Adunanza tlella Reale Accademia di Chirurgia di Parigi una sua Differnazione sull'idrocele. Gli Accademici decisero, que c'étoit une dissertation savante, & utile sur les causes, les symptomes, & les différences de l'hydrocele; qu'à l'histoire de la maladie exposée avec beaucoup d'érudition l'Auteur joint une pratique lumineuse sur les moyens de parvenir à la curer, & qu'en tout cet ouvrage étoit bien fait pour orner les Mémoires de l'Academie (c), come infatti fu poi essa stampata nel 111. Tom. pag. 84. dell' edizione in 4., e nel Tom. VII. pag. 357. dell' edizione in 12. Ella è scritta, come tutte le altre sue Opere, con chiarezza, con quest' Opemetodo, e con erudizione. L' Autore non riguarda per vere idroceli, che i raccoglimenti d'acqua in ampie cavità distinte: chepperò riduce all' edema il

Legge all' Reale di Chirurgia una Differtazione Jull' idrocele, la quale è approvata, e stampata.

Analisi di

tra-

(b) BERTRANDI Trattat. delle Operazioni nell' Introduzione.

(c) Conte BAVA Elogio storico pag. 49.

<sup>(</sup>a) Pag. 23. del suo Elogio: à ce sujet même (delle operazioni Cerusiche ) CELSE blame expressement la cellerité: Non magis, quam res desiderat, properet.

travasamento delle acque nel tessuto cellulare dello scroto, sia esso tra la cute, e il dartos, o tra questo, e il cremastere (a); e fa notare, non rompersi le cellule di quel tessuto per formare una comune cavità, se non quando per una violenza esterna si sece s' ematocele, a cui sia succeduta l'idrocele, o quando le acque travasate siano divenute acri, e corrofive pel vizio universale degli umori, come accade negli scorbutici, e ne' fifilitici. Nega affolutamente la spezie di idrocele, che dicesi aver la sua sede tra il cremastere, e il cordone spermatico, perchè quel muscolo, essendo composto di fascetti rari, e rilassati, lascia scappare le acque nella cellulare dello scroto, o se si raccolgono in quella del cordone, ne nasce l'idrocele, che dicesi della vaginale di esso cordone. E qui fa osservare, che quest' ultima spezie d'idrocele da principio è sempre cellulare, e fatta da un grappolo d'idatidi, perchè cellulare, e non membranosa è quella

<sup>(</sup>b) Il Portal (Histoir. de l'Anatom., & de la Chirurg. tom. v. pag. 434.) dice, che qui il Bertrandi stabilisce con molte osservazioni la natura cellulola del darros, mentre il Bertrandi si comenta di accemare di pussaggio, che il dartos non è un massocio, ma un semplice resento cellulare, e le osservazioni, che adduce, tendono a provare la possibilità, che l'inzuppamento cellulare divenga in certi casi circoscrizio e e saccato.

tunica, avvertendo però tanta essere la mollezza, e l'ampiezza delle sue cellule, che facilmente cedono, si dilatano. e si rompono, per dar origine col tempo a una vera idrocele ampia, scritta, e saccata, e ne adduce varie osservazioni. A torto adunque il PORTAL afferisce (a), che il BERTRANDI doute des épanchemens d'eau dans la tunique vaginale du cordon; egli è tanto lontano da questo dubbio, che fa anzi un'acerba critica al SHARP, perchè nega tale fpezie d' idrocele. Poteva piuttosto il PORTAL avvertire effersi il BERTRANDI ingannato, quando, narrando di averpiù d'una volta veduto simile idrocele u, în bambini, nei quali i testicoli uscivano con difficoltà dall' addomine, o si erano arrestati all' anello inguinale, suppone, che in effi la tunica vaginale propria del testicolo o si fosse fatta aderente al testicolo medesimo, o rottasi, volendo con ciò spiegare, perchè l'idrocele si trovasse nella sola vaginale del cordone. Ma siaci permesso, per amore della verità, di far riflettere, che le idroceli di que bambini erano congenite, BERTRANDI non le conobbe, perchè allora non si conosceva ancor bene

Non conobbe le idroceli congenite.

<sup>. (</sup>a) Loc. cit

Nè quelle dell' albuginea. vera origine, e la particolare conformazione della tunica vaginale del testicolo nel feto, e ne' bambini appena nati, come dimostreremo nel nostro Supplemento al Trattato delle ernie. E perchè ignorava anche la doppia lamina, o piuttosto la doppia tunica, volgarmente conosciuta sotto il solo nome di albuginea, dubita perciò della possibilità dell'idrocele, che gli Autori hanno descritta nella stessa albuginea, confermata dal Mor-GAGNI, e da altri, come in quello stesso Supplemento faremo vedere. Dopo aver data con molta esattezza la storia della malattia, passa a indicarne succintamente la cura. Per le idroceli cellulari del cordone loda il setone, o il metodo del MARINI, che consiste nell'uso della tenta spalmata di qualche cateretico. E quì dobbiamo notare non potersi da noi capire, su qual fondamento l'erudito signor SABATIER (a), e poi il DELON NES (b), che lo copia quasi dappertut-

(a) Recherches historiques sur la cure radicale de l'hydrocele inserite nel v. Tomo dell' Accad. Reale di Chirurgia pag. 670.

<sup>(</sup>b) Histoire de l'hydrocele. Paris 1785. in 8. Ecco le sue parole pag. 185. Mr. BERTRANDI, en parlant de la tente, en attribue l'invention à MARINUS. Son erreur est plus blâmable encore, que celle de Mr. HEISTER (l'EISTERO ne sa inventore il Ruischio, e il MARINI); elle suppose avec raison, qu'il n'a pas lú les œuvres de ce dernier, encore moins les œuvres de RUISCE.

to, afferiscano, che il BERTRANDI inventore il MARINI dell' uso della tenta per la cura radicale dell' idrocele, mentre, dicono essi, avanti il MARINI hanno proposto questo metodo e Guglielmo Saliceto, e il Pareo, e il Franco, e il Ruischio, ma il nostro Autore tanto in questa sua Dissertazione, che nel Trattato delle Operazioni dice semplicemente, che in certe idroceli può giovare il metodo del MARINI, cioè il metodo di servirsi della tenta della data figura, e grossezza, e spalmata dei tali, e tali rimedi con certe particolari attenzioni tutte proprie del MARINI, il che secondo noi non significa, che il MA-RINI sia l'inventore del metodo della tenta (a). Nelle idroceli del cordone an-

Abbaglio del SABA-TIER, e del DELONNES

qui écrivoit sur la fin du XVII. siecle. Les œuvres de RUISCH (segue egli), de MARINUS, ceux de FRANCO, de SALICET beaucoup plus anciens encore, sont néanmoins bien intéressans pour les Chirurgiens, qui, comme Mr. BERTRANDI, veulent arriver à une certaine célébrité. Noi crediamo inutile di abusar della pazienza del Lettore nel sar ofservare tutti gli spropositi, che si trovano in queste poche righe; condoninsi anche si grossolani sarcasmi a uno Scrittore, che dà suori un grosso libro intitolato Istoria dell' idrocele, e che ignora quasi affatto la struttura delle parti, che sono la sede della malattia; che ci dà per proprio il metodo di guarirla proposto anticamente da Celso, e rinnovato a' nostri di dal Douglass.

. (a) Il titolo del libro del MARINI è il seguente: Pratica delle principali operazioni, che riguardano il litotomo, e l'oculista di Girolamo MARINO. Roma 1723.

Metodo proprio del BERTRAN-DI di guarir radicalmente l' idrocele.

tiche, e piene di materie spesse, e glutinose vuole, che al setone, e alla tenta si preferisca l'incisione, e sa in esse notare certe macchie lenticolari, che dal cordone si propagano sin contro gl' integumenti dello icroto, le quali crede fatte dall' olio della pinguedine irrancidito, e per distruggerle vuole, che si usi la pietra caustica rotta, e mescolata col sapone. E perchè quasi sempre alla cura dell' idrocele della tunica vaginale del testicolo, o di quella del cordone, quando è circoscritta (facciasi essa cura coi caustici, col taglio, o con altri mezzi) fogliono succedere gravissimi accidenti, egli propone un metodo fuo proprio, che dice di avere più volte sperimentato esente da que pericoli, e che consiste nel fare col trequarti la paracentesi del facco, quando le acque vi si sono raccolte a una certa quantità, nel ripetere la stessa operazione, allorchè vi accumulate a una quantità minore, e poi una terza, o quarta volta, sempre lasciandovene raccogliere copia minore; egli ha provato, che con questo meto-

in 8. Quel, che v'è da norare nell' addotto passo del Delonnes, è, che configlia la lettura di quest'opera del Marino, dopo aver detto poché linee prima, full' autorità dell' Allero, che è un libro assai mediocre.

do il sacco si restrigne, e che allora si può poi fare l'operazione col taglio, e la cura radicale senza pericolo, facendolo suppurare, o consumare co' cateretici, o co' caustici. Avvertisce però. che questo suo metodo conviene ne' soli casi, che il sacco non è molto spesso. le acque sono limpide, e chiare, e il testicolo sano. Quando sia stato necesfario di fare la castratura, perchè esso testicolo fosse scirroso, canceroso, o in altro modo gravemente leso, vuole, che la ligatura del cordone spermatico si faccia nella parte sana, non già dov'è tumido, avendo egli non di rado osservato, che altrimenti operando, gliendosi poi per la suppurazione quell' inzuppamento, l'allacciatura si rallenta, e dà origine a una pericolosa emorragia, e dice potersi arditamente dilatare l'anello, e anche tagliare una porzione de' muscoli obbliquo interno, e trasverfale, qualora al di quà dell' anello effo cordone non fosse sano; Si enim funiculus in abdomine ( dice egli ) nullo morbo affectus est, nihil pertimescendum videmus .... Si vero morbus eumdem occupet per reliquam semitam, quod propius, aut longius injiciatur vinculum, morbum nec adauget, nec imminuit. Finalmente quando per qualche corrosione fattasi all'uretra l'urina si spanda nello icroscroto, consiglia, per impedire la cancrena, che presto vi si suole fare, le prosonde scarificazioni, e l'uso della tenta del RONCALLI, e del catetere del PETIT (a), per deviare l'urina da quel soro; che se molti sossero i sori, vuole, che si senda per lungo l'uretra da un foro all'altro, perchè soltanto in questo modo se ne può ottenere una soda cicatrice.

Legge alla fiella Accademia una Differtatione fugli aftefit del fegato, sopravvegnenti alle ferite di teffa.

L'anno seguente, cioè nel 1754. addì 16. di Maggio lesse alla stessa Accademia un altro fuo ingegnosissimo, e dotto ragionamento sulla causa degli ascessi, cha si fanno così sovente al fegato dopo le gravi ferite di testa, il quale fu anche approvato, e inserito nel Tom. 111. pag. 484. dell' edizione in 4., e pag. 130. del Tom. IX. dell' edizione in 12. Sempre difficilissima da spiegarsi è sembrata ai Fisiologi, e Patologi la formazione di simili ascessi, osservatisi sin dai più remoti secoli. Il BERTRANDI ne attribuisce la causa al sangue, che cala lora dal capo in maggior copia, e più impetuoso nella vena-cava discendente, il quale perciò pone argine a quello, che ascende per la vena-cava inferiore.

per

<sup>(</sup>a) Nel Trattato delle malattie veneree nell'articolo della dissuria, e dell'iscuria sono descritti gli strumenti, che qui si accennano.

per la qual cosa non potendosi il sangue, di questa ultima vena liberamente scaricare nell'orecchietta destra del cuore, neppur potrà essa ricevere quello, vi dovrebbero mandare i prossimi rami, ne' quali perciò dovrà arrestarsi, e maggiormente in quelli, che sono più vicini al cuore. Ora le vene epatiche essendo i rami della vena-cava inferiore più vicini al cuore, da che ad congiungono nel suo passaggio pel proprio foro del diaframma, e qualche volta medesimamente, dopo che è già entrata nel petto, queste vene non potendosi vuotare, si riempiono, e si dilatano oltre il consueto, quindi si sa stasi sanguigna nel fegato, a cui non tarda a sopraggiungere l'infiammazione, suppurazione. Questa assai verisimile conghiettura, che per tale l'ha data il BER-TRANDI, e non come una verità di fatto, è stata impugnata prima dal celebre POUTEAU nelle sue Mescolanze Cerusiche (a), e poscia anche dal David nelle sue Ricerche sulla cavata di sangue (b) a primo suppone, che per quelle ferite le arterie, che portano il sangue alla testa,

Spiegazide ne della formazione di tali afceffi.

L'ipotefi del BER-TRANDI è confutata dal POU-TEAU, e dal DAVID.

<sup>(</sup>a) Mélanges de Chirurgie. A Lyon 1760. in 8. (b) Recherches fur la maniere d'agur de la saignée. Paeis 1762. in 12.

cadano in una spezie di atonia, e che perciò vi si porti allora una minor quantità di sangue, il quale, soprabbondando nel ventricolo finistro del cuore, non lascia vuotare la corrispondente orecchietta, ne questa i polmoni, i quali perciò non possono più ammettere liberamente quello delle arterie polmonali; restano conseguentemente di soverchio pieni il ventricolo, e l'orecchietta destri, donde viene sopraccaricata di sangue la vena-cava inferiore, e per la vicinanza le vene epatiche. Il DAVID crede, che per le gravi ferite di testa que' vasi cangino di direzione, e vi portino perciò minor quantità di sangue, onde ne accadano gli stessi sconcerti nella circolazione immaginati dal Pouteau. Noi crediamo inutile il confutare le ipotesi di questi due valenti Cerusici, conciossiachè il BERTRANDI medesimo nel suo Tratt. delle Operazioni vi ha sufficientemente risposto, la quale apologia sarà da noi ristampata alla fine di questa stessa Dissertazione, che esaminiamo; ed è pur somma la gloria del nostro tore, chè, quantunque questi due Scrittori siano a lui contrari nella spiegazione di quegli ascessi, convengano però l'uno, e l'altro con lui nella pratica, cioè che nelle ferite di testa non si debbano fare così frequenti le cavate di

Sua apolo-

sangue dal piede, come si costuma dai Pratici.

- Pochi giorni dopo la lettura di questo E fatto So-Discorso egli è stato, in conseguenza favorevole relazione fattane dai Deputari, a pieni voti nominato Socio dell'Accademia, e addi 11. di Luglio fugli confegnata una Lettera del Conte d'Argenson Ministro, e Segretario Stato, colla quale lo ragguagliava, che il Re avea aggradito la nomina fatta dall' Accademia :

Nel 11. Tomo della stessa : Accademia edizione in 4. leggonsi alcune sue osser- sue osservazioni Cerusiche. La prima, che trovasi a pag. 2., è di un'ernia fatta dall' intestino ileon, che uscì dall'addomine per l'incavatura ischiatica sotto i ligamenti facro-ischiatici: questa spezie di ernia, che è assai rara, l'osservò due volte in due diversi soggetti sempre dal lato destro. La seconda trovasi a pag. 373., e insegna il mezzo di segare comodamente la porzione dell'osso, che non di rado dopo le amputazioni delle estremità, e principalmente dopo quella della coscia, sporge oltre il livello delle carni, si allunga, e si fa prominente. Perchè colle mani suol essere o impossibile, o molto difficile il sostenere quel pezzo d'osso, e di avere un punto di appoggio, onde poterlo segare, il BER-TRANDE

-ءم 'cio dell Chirurgia di

rufiche infe-

TRANDI propone, e se n'è servito con felice esito, una spezie di cavalletto fatto d'un pezzo di legno perpendicolarmente appoggiato con una larga base in tetra e incavato a mezza luna nella fua estremità superiore, nella quale incavatura vien ricevuto il pezzo d'offo, che si dee segare, mezzo quanto semplice, altrettanto utile. Lo stesso dicasi dell'altro suo mezzo rapportato a pag. 378., che tende a rendere immobili nel volerle fegar le due ossa della gamba, e dell'avan-braccio, legandole infieme per mezzo di un nastro: C'est de la réunion de plusieurs petites pratiques; qui ont une usilité marquée, que nous devons attendre la perfection de nos opérations, riflette giudiziosamente a questo proposito il Louis.

Parte per Londra. Verso la metà di Luglio dello stesso anno 1754. parti per Londra, ov' entrò a pigione in casa del Cerusico della Corte Guglielmo Bronfeilos: quivi dimorò quasi un anno, e le sue occupazioni erano, come a Parigi, il frequentare gli Spedali, il conversare coi più samosi Letterati di quella gran Metropoli, e l'attendere alle disseczioni anatomiche. Il Bronfeilos su in Inghilterra uno de più zelanti promotori dell'apparecchio laterale, e uno di quelli, che meglio il persezionarono. Sotto que-

Sue occupazioni, mentre ivi foggiorna.

Ro grande Operatore acquisto all: BER-TRANDI quell'animo fermo, quella ris folutezza, e quella speditezza nelle opes razioni, che da principio gli mancavano, attefo il suo naturale delicaso. e per un Cerulico forse trappo compassios nevole. Nel ritornare alla Patria muovamente si fermò per alcuni mesi a Parigi, dove intervenne affiduamente alle Adunanze della Reale Accademia di Chirurgia, dalla quale fu più volte nominato Commessario ad esaminare, é a far la relazione delle Differtazioni manda: tele, nel che fare ha mostraro una soigacità non ordinaria, è una finissimia arte critica imparziale. M. D. D. D.

Giunto a Torino, ovi era precorfa la fama della flima acquiftatafi me' Paefi esteri, su molto bene accolto dalla Corre; e dai Grandi, e perchè il Re allora non avea alcun impiego vacante, chè fosse di dua convenienza, per mostrargli il suo Reale aggradimento fi determino di creare a fuo riguardo and Professore -thaordinario di Chirurgia, e. di Anatomia nella Regia Università procoll'obblif go d'indirizzare i giovani Studenti male sime mell'Anatomia pratica. E perchèra tal uopo non eravi per anco un fito un Teatro abbastanza: comodo, l'iEccellentissimo Magistrato della Riforma degli Studi sece spostruire a sua sollicitazione, e a norma

Ritornaalla Patria, dov' è fatto Profestore straordinario di Chirurgia, e di Anacarrie

Fa costruire

Fa coftreir ;

F 1 12

d'un sino disegno nella Spedal Maggiore di S. Gioanni un bellissimo Teatro Anatomico colle necessarie stanze attique, che fervirono poi , ie fervono emttora mon folamente per fare a dovere le dissecazioni. . .e. per le pubbliche i dimostrazioni Anatomiche, rma anche per gli efami pubblici di Anatomia pratica, e delle operazioni che si danno ai Candidati di Chirurgia ... Ne possiamo tacere, che le stanze destinate per le diffecazioni esfendosi ritrovate troppo anguste pel gran numero di Studenti, che con grande zelo, ed emulazione vi attendono: S. E. ili signor Conte Lanfranchi Capo-Reggente di quel Magistrato, sempre intenta a proccurare tutt'i mezzi, che posfono contribuire all'avanzamento come di tutte le scienze, così pure della Chirurgia; ne ha a noftra istanza nello scorso Autunno faris costruire delle altre e ipiù larghe, e più comode . Stette tre annicia quest'impiego, pendente i quali seppe e col fuo esempio, è collectue le zioni talmente infinuare ne giovanic Allieviel'amore del taglio de' cadaveri, che riguardava con ragione come il fondamento della Chirurgia, che non si è più d'allora in pois illanguidito: ..... Accaddennel 1757: cofa, la quale merita di elleig narrata, perchè mel tempo stesso, che far viedere l'alta stima, in

CIII

cui era presso degl' imparziali conoscitori, di eccellente Anatomico, e buon dicitore, così dimostra, a che possa giungere l'invidia. Era in que tempi pubblico Professore di Notomia nella Regia Università il Dottor BRUNI, Membro della Reale Società di Londra, uomo quanto dotto, altrettanto onesto. virtuoso, e spregiudicato, amico, e ammiratore del BERTRANDI. Dovea Bruni secondo il solito fare pubblicamente il corso delle dimostrazioni anatomiche sopra un giustiziato, ma essendo in quel frangente caduto ammalato, non esitò punto di proporte al Magistrato il BERTRANDI per fare le sue veci; alla qual proposizione e il Magistrato, e la voce pubblica subito sentironsi applaudire. Alcuni invidiosi però secero opposizione, quasi fosse un disonore, che ne veniva al Collegio di Medicina, e niuno vi fosse di ciò capace, sopposiziotanto più che le leggi volevano espressamente non solamente un Medico Laureato, ma di più un Medico Collegia. to, e il BERTRANDI non era nè l'uno, nè l'altro. Ragioni sì frivole niente smosfero il vigilantissimo Magistrato unicamente portato pel pubblico bene, e si prescindette per allora dalle formalità. Non fuvvi mai tanto concorso di gente nel Teatro Anatomico della Regia Università.

pubbliche dimoûrazioni Anatomiche a Medici nella Regia Università .

ai inforte.

Numerofo concorfo di perfone di ogni ceto ad accoltarlo.

versità e tutti rimasero soddisfatti st della sua eloquenza, e latinità veramente CELSIANA, che delle non più vedute preparazioni anatomiche. Si seppe poi che quei, che fecero più forti le opposizioni, erano la maggior parte que' Dottori del Collegio, cui il BERTRANDI avea ajutato a fare le Tesi di Anatomia. da difendersi pubblicamente, per esservi aggregati. Imperciocchè non ha punto esaggerato, chiunque ha accertato il signor Louis, que dans l'espace de quinze ans il ne s'est presque point soutenu de Theses d'Anatomie aux receptions dans le College des Médécins, auxquelles Mr. BERTRANDI n'ait eû la meilleure part (a). Nessuno però ebbe la nobile ingenuità di confessarlo al Pubblico, come l'ebbe il dottissimo nostro Signor CI-GNA(b), il quale alla fine delle fue bellissime Tesi de Utero disese nel 1757. non arrossì di dire: Quas in hac Thesi anatomicas, aut physiologicas observationes protuli, eas partim ex fidelissimis Scriptoribus recepi, partim ex accura-

E' confultato per le Tefi Anatomiche da moltiMedici.

- Ingenuisà del Cignas questo proposito,

(a) Éloge historique pag. 17.
(b) Questo nostro Ragionamento è stato letto in tre Adunanze della nostra Accademia Reale delle Scienzze, di cui il CIGNA è uno de più ragguardevoli Secj.

rissima, ac sæpe iterata experimentorum ferie, que a Clarissimo BERTRANDI; Chirurgorum Parisiensum Socio, & in hac Academia Chirurgia, & Anatomes Professore extraordinario, indefessa opera instituta funt, atque ab Audore ipso mihi humanissime communicata. Non dobbiamo però stupirci della diversa condotta degli altri, perchè levia ingenia, quià nihil habent ; nihil fibi detrahunt (a):

Cresceva di giorno in giorno sempre Il Relonopiù per la Chra ; e già stendevasi per le Province'il nome del BERTRANDI, che si era anche fatto conoscere per la felice riuscita in molte difficili cure intrapresé, "quasido CARLO EMANUELE, che nol perdeva di mira, addi Marzo del 1758. l'eleffe nello stesso giorno con doppia onorevolissima Patente e in primo Chirurgo della Sua Sacra Persona, 'e' in Professore di Chirurgia Pratica nella Regia Università. Non è necessario di dire, quali sensi di gratitudine, e d'amore siansi all'inaspettato annunzio eccitati nel cuore del tenero Suddito; gli spiega egli stesso nella Lettera dedicatoria al Re medesimo premessa al suo Trattato delle operazioni, e al principio

mina nelle Resto gior-no e in Profeffaredi Chi Chirurgo della sua Per-

<sup>(4)</sup> GELS, de Medicina lib. VIII. cap. IV. pag. 519.

dell' Orazione per gli Studi della Ghirurgia, e se prima erast mostrato tanto zelanje del pubblico bene, qua al primo suo impegno si aggiunse quello della conservazione di un muto suo Benefatfore. Come siasi comportato nell'impiego di Professore, ne fanno ora nuova testimonianza gli eccellenti diversi Trattati di Chirurgia, che pubblichiamo, e più ancora la miova faccia, che prese la Chirurgia negli Stati tutti del Re di Sardegna. Era allora la Chirurgia Provinciale quati intieramente nelle mani dei Chirurghi Maggiori de Reggimenti: qualunque cura un po scabrosa, qualunque operazione un po delicata, che si presentasse da farsi, essi soli erano chiamati ad eseguirla, e per niente erano, per così dire riputati tutti gli altri Cerusici : la litotomia , l' erniotomia, la castratura, ta deposizione della cateratta ( che qui ancora non le ne conosceva l'eftrazione) appena v'erano nella tale due, o tre Chirurghi, che le facessero, i quali erano all' uopo chiamati dalle Province; meritano tra gli altri d'essere con onore mentovari i VERNA, nella cui famiglia, come già una in quella dei Color in Francia, passato come in retaggio l'esercizio quelle operazioni. Ma dopo che il BER-TRANDI e col praticarle egli stesso, e

CÓ'

Muova faccia'; che fa prenderealla Chirurgia. in Picmon-

co fuoi luminosi scritti rese quelle operazioni in certo modo familiari , esse si eleguirano, dappertutto, ottimi Cerulici se sparsero perotutte le Province, tutte le Cinè, anzi quali ogni terricciuola vantarono, e vantano ancora il proprio Cerulico asto ad eleguire ogni cola. Quando toccava al BERTRANDI il fare il pubblico corfo delle Operazioni ful cadavere nel Teatro Anatomico della Regia Università, numerosissimo mera il concorso non solamente degli Studenti îna ancora dei Chirurghi parentati, dei Medici, e dei Nobili, e persino dei Professori di Eloquenza, e delle altre Facoltà: Coloro, a quali più vanno a cuore i slanci filosofici. (. dice 3 questo proposito il signor Conte BAVA-(a).) gl' inaspettati passaggi, le prome allusioni di una scienza alle altre, che le fono sorelle, i generali prospetti delle umane cose, non rifinivan di esaltare ora il nuovo aggiunto al vecchio, e bellamente innestatovi sopra, ora i voli felici per gl'interminati regnì della Fisica, quando quel misto di tante dottrine, che bollivangli in capo, quando i chiári racconti di non più notati malori, di

Quanto fosfero applauditi i suoi corsi pubblici delle operazioni.



<sup>(</sup>a) Elogio Storico pag. 16.

più conosciuti casi, e di cure, il tutto a tempo, e luogo asperfo di sali adoprati con parsimonia, con riguardo, e con garbo: tutti poi ne lodavano il difinvolto maneggiar de suoi ferri, e la speditezza dolla mano. Sarebbe difficile il potere immaginarsi, come, dopo essere stato eletto in Chirurgo del Re, e Professore, abbia potuto compiere i tanti doveri portati da questi due cospicui impieghi, di dovere cioè tutt'i giorni almeno una volta al giorno andare alla Corte, di attendere alla composizione de diversi Trattati Cerusici, che dovette dettare, e spiegare nella scuola, di andare alla visita de malati nello Spedale, e agli esauni de Candidati, e inoltre di accudire con tanta esattezza al gran numero degli ammalati per la Città, che a lui ricorrevano, e di rispondere alle diverse corrispondenze, che da ogni parte lo consultavano, se non sapessimo, qual sosse la sua vivacità, e speditezza nell'agire, la sua facilità nello scrivere, l'immensa lettura, che già avea fatto prima, e la sua maravigliosa memoria nel ricordarsi di ciò, che avea letto. Del credito, che sempre ebbe in Corte, a principalmente presso il Sovrano, non si prevalse mai ad altro uso, che o per far soccorrere certi allievi poveri, ne quali conosceva particolari disposizio11:12

ni a divenir gran Maestri, o per promuovere quanto credesse poter riescire di avanzamento, e di lustro alla Chirurgia, e alle altre scienze utili. Erasi allora formata una particolare Società di Letterati, che radunavanh affai sovente nella Casa del signor Conte di SA-LUZZO, soggetto abbastanza cognito nella Repubblica Letteraria. Questa Socierà trattava in comune delle diverse parti della Fisica, e delle Matematiche; andava riperendo gli sperimenti dagli altri già fatti, e molti nuovi ne immaginava, e sostenevasi sotto l'immediata protezione dell' A. R. del Duca di Savoja ora felicemente regnante. Il BERTRANDI ne encomiava sovente le utili, e lodevoli imprese, e l'onore, che ne dovea ridondare al Paese, al Re CARLO EMA-NUELE, che molto si compiaceva nell' udirle. Diede poi essa fra non molto un faggio de' fuoi lavori colla pubblicazione nel 1759, del primo Tomo delle Min scellanea Philosophico-Mathematica Societatis privatæ Taurinensis (a), che secè tanto strepito nel Mondo Letterario. Il BERTRANDI v'inserì a pag. 104. un suo Opu-

Suo zela per la Soçictà privata di Torino .

<sup>(</sup>a) Ora questa Società è stata eresta in Accademia Reale delle Scienze, i cui due primi volumi sono sotto il torchio.

Sua Differtazione fulla placenta, full' utero gravido, e fui torpi gialli inferita nel primo Volume di detta Società.

Analisi di questa Dissertazione. Opuscolo intitolato: Observaciones de glanduloso ovarii corpore, de placenta, & de utero gravido.

Volchero Coiter (a) è stato per avventura il primo a offervare nelle ovaje della vacca un certo corpo bernoccoluto, ora rosso, ora giallo, più, o grosso, ora unico, ora doppio, ora manifestantesi in tutte e due le ovaje, ora in una sola, che fu poi chiamato dagli uni il corpo glanduloso dell' ovaja, da altri il corpo giallo. Lo stesso corpo è stato poscia offervato anche negli altri quadrupedi, e nelle donne medesime dal GRAAF (b), dal MALPIGHI VALLISNIERI (d), e da moltissimi akri Anatomici. Disputossi-acremente qual ne sia l'origine, e l'uso. Il GRAAF (e), e l'Allero (f), coi quali pare, che fia d'accordo il Morgagni (g), voglio-· no,

<sup>- (</sup>a) Nella sua Opera intitolata: Externarum, & internarum principalium humani corporis partium tabula, atque anatomica exercitationes. No imberga 1573. in fol. . (b) De partibus mulierum generationi inservient. Cap. ultimo.

<sup>(</sup>c) In una sua dotta, ed erudita lettera allo Sponi

<sup>(</sup>d) Della generazione cap. 3. 4. e 5. (e) Loc, cit.

<sup>(</sup>f) Prim. lin. physiolog. S. 835., a 837. della se-

<sup>(</sup>g) Come appare da una lettera scritta al Bin-TRANDI, e da questo citata a pag. 104. di questo sua Dissertazione.

no, che questo corpo mai non si trovi nelle vergini, ma solamente nelle femmine, che hanno partorito, e l'ALLE-RO (a) il crede formato nel tempo della concezione dallo staccamento, e dalla crepatura dell'uovo, che resta fecondato; epperciò vuole, che nella superfizie delle ovaje sempre vi rimangano nelle femmine, che hanno più volte partorito, tante cicatrici, quante sono le uova staccatefi, e cadute, cicatrici, ch' ei suppone corrispondere agli antichi corpi gialli. Il BERTRANDI all'opposto adduce varie osfervazioni fatte e sulle vergini, e diverse spezie di animali, che non avevano ancora conosciuto, il maschio, è ancor meno partorito, ne' quali tutti of servo il corpo glanduloso. Per la qual cosa egli è di sentimento, da che non I ha mai potuto vedere nelle fanciulle; nè nelle altre femmine di tenera età ma solamente in quelle da marito, e già atte alla generazione, che questo corpo si sviluppi soltanto, giunti che sono gli animali alla pubertà, e nelle figlie, quando incominciano a comparire i mestrui, e a sentire gli stimoli di Venere; ed è m-

<sup>(</sup>a) Elementa physiolog, corpor, humani tom. VIII, pag. 29.

inclinato a credere, che il suo uso sia di preparare il seme semminile, come nel maschio i testicoli preparano il virile; conciossiache ha osservato, che la sostanza del corpo giallo si approssima molto col suo colore, e colla sua tessitura filamentosa, e vascolare a quella de testicoli; vi ha non di rado veduto un piccolo foro in punta, continuato con un canale lunghetto stendentesi sino di là del centro dello stesso corpo. eloquentissimo signor Buffon nel principio del Tom. VIII. de' Supplementi alla sua Storia naturale (a) adduce queste ofservazioni del BERTRANDI, ch'egli stesso gli avea communicate in una lunga lettera, in prova del suo ingegnoso sistema sulla generazione. A noi non ifpetta il decidere una così astrusa questione circa l'uso, e l'origine del corpo giallo; trovandosi però questo corpo anche melle ovaje della mula, ella è una prova convincentissima contro l' Alle-Ro, che non è un prodotto della concezione (b).

Non meno interessante è la seconda parte della Differtazione del nostro Au-

tore

<sup>(</sup>a) Dell' edizione in 12.
(b) Vedasi il Trattato delle Ragge de' Cavalli di Gio.
BRUGNONE, dove trattà de' muli pag. 313., e 314.

tore, che tratta dell'utero gravido, della placenta. IPPOCRATE avea già parlato dei cotiledoni, che si osservano alla faccia interna dell' utero gravido ne' quadrupedi, e l'immortale ARVEO (a) avea detto, che questi cotiledoni si trovano non solamente nelle pregnanti, ma anche in tutte le femmine atte alla generazione, ma nè dagli Anatomici, nè dai Fisiologi non si fece alcun caso delle osservazioni di questi due grandi uomini. Il Bertrandi, per accertarsi, se erano vere, aprì l'utero di moltissime vacche, pecore, e conigli' non gravide, e in tutte trovò i cotiledoni più, o meno grossi, e rossi, attaccati alla superfizie dell'utero per una somilissima membrareticolare, e vellutata, compressione di que' tubercoli vide uscirne un umore tenue, e dilavato, qualche modo lattiginoso. Confessa di non aver mai potuto vedere nelle donne alcun' apparenza di veri cotiledoni, ma nelle di fresco ingravidate vide la superficie interna dell'utero turgida, e rossa, coi margini de' seni arteriosi descritti dal Morgagni (b), i quali sogliono dar uscita ai mestrui, più duri,

<sup>(</sup>a) Nel suo Trattato de generatione.

<sup>(</sup>b) Adversar. anatom. IV. animadvers. XXIV.

e più elevati, che non sono nell'utero vergine. I quali cangiamenti comparivano non già in tutta l'estensione di quella faccia interna dell'utero, ma folamente in alcuna fua parte, che crede esser quella, dove poi doveasi attaccare la placenta, dal che conchiude, che quelle mutazioni nell'utero si fanno già prima, ch' essa placenta siavi attaccata; e veramente in una donna, avea il feto nella tromba finistra, trovò le pareti interne dell' utero corrispondenti a quella tromba, più spesse, e più rosse coi detti seni molto più dilatati, che nel rimanente. Che più? In una porca trovò stesa su tutta la superficie interna dell'utero una tela roffigna, e mucilagginosa, la quale messa nell'acqua non vi si scioglieva, ma vi galleggiava a guisa di membrana: dentro questa tela non ha potuto vedere la menoma parenza di embrione. Senza volere pertanto con queste osservazioni pronunziare decisivamente della verità. e costanza di quelle dell' ARVEO, e massime di quella, nella quale dice, che nell' utero sempre si forma una simile tela, egli intende d'incitare con esse gli Anatomici a fare ulteriori ricerche; ma trattanto, ut ipse fatear, quod recogito (dice egli) postremæ, quas in ovibus, & vaccis institui, observationes a communi

muni sententia me non leviter deturbarunt, ut generationem multiplici partium
apparatu promoveri, soveri, & persici
crediderim: dubium observationes excitarunt, eædem aliquando sortasse absolvent, si porro operis modos sequamur.

gli altri importantissimi stabilimenti fatti dal Re CARLO EMANUE-LE di sempre gloriosa memoria deesi certamente annoverare quello della in-Aruzione delle Ostetrici, stabilimento, che è stato principalmente promosso dal BERTRANDI, il quale rappresentò all' augusto Monarca, quanto poco fosse conosciuta ne' suoi Dominj l'arte ostetricia, quante madri, e quanti bambini o appena nati, o anche prima di nascere morissero per mancanza del necessario soccorso; e che, quantunque ne' parti difficili, e contro natura all'esperto, e destro Chirurgo da ostetricante, siccome però le donne per la naturale loro verecondia fogliono avere maggior confidenza nelle altre donne, e di esse più volentieri servirsi nel parto, era giusto, che le Levatrici avessero, oltre il cieco empirismo, studiato almeno i principi dell'arte. Si diede conseguentemente ordine dalle Province si mandassero nell' Opera delle Partorienti stabilita nello Spedale di S. Gioanni delle donne oneste, pie, e capaci di

Stabififce tina fcuola per l'inftruzione delle Massimane qualche instruzione, le quali colla pratica imparassero anche un po' di teorica, e poi coll'esame dessero saggio de' loro progressi: il BERTRANDI stesso su incaricato di andarle ad instruire.

Pubblica un Trattato delle Operazioni di Chirurgia.

Nell'anno scolastico del 1760. al 61. dettò dalla Cattedra il Trattato delle Operazioni di Chirurgia, il quale poi alle preghiere del suo Amico il celebre Dottor GABER permise, che nel 1763. uscisse dai Torchi di Nizza in due piccioli volumi in 8. con figure alla fine del secondo. Il dedicò, come già si è accennato, al sommo suo Benefattore il Re CARLO EMANUELE, e nella Lertera dedicatoria premessa al primo, egsi espone in una maniera semplice, nobile, e tenera tutt' i benefizj, ond' era stato da quel Gran Re colmato. Viene poi subito l'Orazione sopra gli Studi della Chirurgia da lui recitata al principio dell'anno scolastico 1758., nella quale dimostra ai Chirurghi la necessità, che hanno, per riuscire nella loro arte, delle cognizioni Anatomiche le più minute: Una linea (dic'egli) di maggiore, o minore spazio ad uno de lati, oserei dire un punto, possono rendere un' operazione felice, e stupenda, o mortale. Fa poscia vedere, quanto giovi lo studio della Teorica fondata Teorica, ma di una full' Anatomia, sulla Fisiologia, e sulle altre

Sua Orazione sugli studi per la Chirurgia.

altre parti della Fisica sperimentale, e quì si scaglia addosso agli Empirici, i quali, senz'altra cognizione del corpo umano, e delle leggi animali, pretendono bastare una lunga pratica, ed esperienza: Se senza Teorica (così la discorre ) potesse l'arte giungere alla sua perfezione, perchè mai dopo tanti secoli di sperimenti non vi pervenne? Infiniti sono i Pratici, pochissimi i Teorici, e se qualche bene si è fatto, dicanlo i Pratici, se fu per loro soli, dicanlo, e ne diano pruova. Ed avea pure i suoi particolari motivi d'insistere principalmente su questo punto, poichè non pochi Cerusici dei più ricercati si ssiatavano nel voler dare ad intendere nelle private conversazioni, che i Trattati dettati dal BERTRANDI erano pure chiacchere incapaci di fare un buon Cerusico, che per riescir tale bastava il dere molti malati sotto un buon Pratico, e, malgrado le strepitose cure, ed operazioni da lui fatte, altro sentivasi dire per la Città, che il BER-TRANDI era un sommo Teorico, ma un infelice Pratico, solite cantilene dell' invidioso, ed ignorante empirismo, e che biasima in altrui quel, ch'esso dispera di poter mai possedere. Ella era così radicata, anche prima che partisse per Parigi, l'opinione della sua infelicità

cità nella Pratica, che l'Illustrissimo signor Marchese Morozzo suo sommo Protettore, allora Riformatore degli Studi, in tutte le Lettere, che gli scriveva, sempre gl'inculcava di attendere alla Pratica. Ecco ciò, che gli risponde il BERTRANDI in una sua datata di Parigi li 2. Dicembre 1752. (a): , derà forse V. S. Illustrissima, che io , ad arte non le abbia sinora parlato " de' miei studj teoretici, perchè Ella , non si pensi, che mi rubino del tem-,, po, ma nè essi sono così inutili, che ", io me ne avessi da vergognare, nè io ,, penso, ch' Ella pretenda, che gli ab-, bandoni affatto: diceva bene NE di Verulamio: Oui naturæ vias non noverit, quomodo illis occurrere ,, potest, eamque vertere? La vera Teorica è la cognizione degli effetti per le cause. L'Anatomia, la Fisiologia, ,, e le ben ragionate osfervazioni patologiche ne fanno la base, e non le immaginarie ipotesi, le quali rendono odiofi la maggior parte di quelli, che si vogliono chiamare Teorici. Ma , tutte quelle parti non s'imparano, e

<sup>(</sup>a) Comunicataci graziosamente con molte altre memorie originali relative alla vita del BERTRANDI dal dotto, e gentilissimo Cavaliere il signer Conte di Orbassano degli Orbini.

non si volgono in buon uso, se non , con una lunga serie di studi .... Io " lo vidi in Torino, e lo veggo continuamente in Parigi, che la maggior parte delle grandi guarigioni fatte da " certi Pratici accadono per una certa buona ragione, della quale per lo più non debbono avere il merito, ", perchè non l'hanno pensata, " ramente perchè mai alcuni, invec-" chiando negli Spedali, non divengo-" no mai migliori? " Noi non ci tratterremo davvantagggio nel far offervare le bellezze di quelt Orazione, perchè farà meglio, che il Lettore le gusti tutte da se, leggendola intera, facendola noi ristampare in capo di tutte le Opere del chiarissimo Autore, dove sarà certamente meglio collocata, che al cipio del Trattato delle Operazioni. Giova piuttosto, che noi ora passiamo all' efame di questo Libro veramente classico, e ricercatissimo, oramai divenuto raro, comecchè ristampato a Napoli in Italiano (a), a Parigi in Francese (b); e a Vienna in Tedesco (c): Pre-

(a) 1769. in 8. in due volumi.

<sup>(</sup>b) Anche nel 1769, in 8, in due vol. tradotto par Mr. Solier de la Romillais.

<sup>(</sup>c) Nello stelso anno 1769. in 8. I due Tomi di Operazioni Chirurgiche del molto esperto BERTRANDI dice il BRAMBILLA a pag. 3. del suo Ragionamento

Pregiasi in esso ( diremo col più volte lodato Conte di S. PAOLO (a) ) la chiarezza in descrivere, e quasi atteggiare all'occhio il processo manuale operazioni, e le delicate avvertenze da aversi in sul fatto, la padronanza soluta dell' Anatomia d'ogni genere, erudizione estesissima ec. Questo Trattato però suppone delle cognizioni nari intorno tutte le malattie Cerusiche, ed è relativo ai presenti Trattati dettati nella scuola. Noi ci riserbiamo di farne l'analifi da premetterfi alla nuova edizione, che se ne farà; quì però non possiamo non entrare in una Letteraria discussione col signor Louis, che immediata relazione a questo stesso Trattato, perchè per quel luogo sarebbe troppo lunga.

Breve digressione sugli scritti di CELSO. Aulo Cornelio Celso già tante volte da noi citato, Scrittore dell'aureo se-colo di Augusto, contemporaneo, ed amico di Virgilio, di Orazio, e di Ovidio, siccome con argomenti assai verosimili ha, non ha guari, provato il dottissimo signor Consigliere Bian-

CONI

premesso al Trattato del siemmone)... Sono i migliori Trattati, che abbiamo oggidi, e sono stati tradotti in line gua Francese, e in lingua Tedesca. (a) Pag. 69. dell' Elogio storico.

coni. (a), se per la purezza, l'eleganza, e la bella gravità latina, che in tutta la sua Opera de Medicina risplende, merito di essere chiamato il CICE-RONE Medico, e per la somma dottrina, e pratica dell'arte in quella contenute l'IPPOCRATE Latino, bisogna però con sommo nostro rincrescimento confessare, riuscire in molti luoghi così oscuro, che a mala pena se ne può indovinare il senso, ciò dipenda o dal suo dire troppo concilo, e laconico, massime in una materia così difficile a descriversi, oppure, ciò, che è più probabile, perchè que'libri ci siano pervenuti tronchi, malconci, e alterati dal tempo. Non poca obbligazione dobbiamo per conseguenza avere a quella numerosa schiera di valentuomini, i quali dotati di fingolare ingegno, e peritissimi dell'arte Medica, e della Romana favella, con esaminarne, e confrontarne i varj testi a penna, e le numerofissime edizioni, hanno cercato di spianarne le difficoltà, di correggerne i luoghi alterati, e di riempirne le lacune, nella qual' ardua, e molesta fatica ognun sa, per tacere degli altri, quan-

11

ï

7

Ţ.

k

le

e.

ed

ď

Tai

10

١.

<sup>(</sup>a) Veggansi le sue eruditissime Lettere sopra A. Cornelio CELSO al celebre Abate Girolamo TIRABOSCEI. Roma 1779. in 8.

to siasi segnalato, e distinto il gran Morgagni (a). Non possiamo con tutto ciò vantarci finora di possedere CELSO intero, e ridotto alla sua vera lezione, nè d'intenderlo dappertutto neppure là, dove non abbiamó motivo di sospettarne il testo guasto, o tronco. Niun però, che noi sappiamo, avea fin quì dubitato, che si fosse preso abbaglio nell' interpretazione di quel passo del cap. IX. del lib. VII., nel quale CELSO, trattando della cura delle foluzioni di continuità con perdita di sostanza, o no, congenite, o accidentali. che non di rado si offervano nelle orecchie, nelle narici, o nelle labbra, malattie chiamate dai Greci col nome generale di colombata (b), e dai Latini di curta (c), consiglia di fare in certi casi

(a) Epistolæ in A. Cornelium CELSUM ad Johan. Bapt. VULPIUM.

(c) Come dal nostro Celso, e da molti altri Scrittori antichi, e moderni, e tra gli altri dal celebre Gaspare TAGLIACOZZO, il quale l'anno 1597. pubblicò a Venezia in fal. la famosa sua Opera De cure conversioni per l'accessione del constitucione 
torum insitione per Chirurgiam.

<sup>(</sup>b) Il vocabolo Greco coloboma potrebbesi tradurre in Italiano morramento, troncamento, giacchè la parola mutilazione, che è assai significativa, non è italiana, e sorse neppure latina. GALENO (Methodi medendi lib. 11. cap. 2.) così lo spiega: Coloboma, idest mutilum, sive curtum. E l'Autore delle Desinizioni Mediche, libro attribuito anche a GALENO: Coloboma, idest mutilatio, desettus particula est in aliqua parte corporis.

delle incisioni semilunari., onde potere Incisioni secon maggiore facilità avvicinare, e far riunire le parti divise, e mancanti. Tutti hanno creduto volersi da CELSO, che tali incisioni si facciano esternamente alla pelle, perchè raccomanda espressamente, che con esse summa tantum cutis diducatur; così l'interpretarono il Guille-MEAU (a), il Thevenin (b), il Le CLERC (c), il MANGETI (d), il ROON-HUYSEN (e), il PLATNERO (f), e infine, per non annoverare tanti altri, l' amantissimo nostro Maestro (g). Ma il signor Louis in una sua Dissertazione sull'operazione pel labbro di lepre, che si legge nel v. Tomo dell' Accademia Reale di Chirurgia (h) pretende di dimostrare con lungo apparato di dottrina, e di erudizione, che niuno ha

milunari prescritte da CELSO nelle divi-fioni delle orecchie, del nafo, e delle labbra.

<sup>(</sup>a) Chirurgie Francoise Traite v. des Opérations chap.

<sup>(</sup>b) Opérations de Chirurgie chap. XIII.

<sup>(</sup>d) Nelle fue annotazioni alla Chirurgia del BAR-BETTE edizione di Geneva pag. 169.

<sup>(</sup>e) In una sua Opera Cerusica molto stimata scritta in Olandese.

<sup>(</sup>f) Institutiones Chirurgia rationalis §. 604.

<sup>(</sup>g) Trattato delle Operazioni di Chirurgia tom. 11.

pag. 147.
(h) Pag. 292. Pare però da ciò, che dice nella sua prima Differtazione sulla stessa Operazione inserira nel Iv. vol. della stessa Accademia pag. 385., che allora interpretasse questo passo di Cilso, come s' interpreta da tutti, e come vuol essere interpretato.

ni fiano pre**scritte** CELSO dentro la boc-

11 Louis capito CELSO a proposito di quelle incicrede, che sioni semilunari, ne sa intendere, onde da abbia potuto nascere un errore così massiccio, ed universale, il quale, se a hui prestiamo fede, è un assurdo in Grammatica non meno, che in Chirurgia, aggiungendo, che il BERTRANDI, quantunque versatissimo nella lingua Latina, e nella lettura di CELSO, non ha badato a questo punto di Chirurgia, e si è lasciato sedurre dall'autorità de' Moderni. Crede egli adunque apparire fuor d'ogni dubbio dal testo di CELSO, che dice chiaro, e preciso, che il tersissimo Romano Scrittore configlia di fare quelle incisioni non esternamente alla pelle, ma internamente dentro la bocca. Noi speriamo, che il signor Louis non avrà a male, se noi, non per voglia di contraddirlo, nè di gareggiare con lui, ma pel solo amore della verità ci accingiamo a provare, che CELSO ha veramente, e senza il menomo equivoco scritto le incisioni semilunari da esternamente alla sola pelle; ch' egli non meglio a questo proposito inteso CELSO di quel, che intendesse l'erudito Commentatore del VAN-HORNE Gioanni Guglielmo Pauli, quando ha creduto, che questi, appoggiato all'autorità del ROONHUYSEN, avesse consigliato di fare arditamente tali incisioni dentro

dentro la bocca (a); dal che si vedrà chiaramente, che il BERTRANDI non per inavvertenza, nè sedotto dall'autorità de' Moderni (che non era uomo da stare ciecamente alle altrui opinioni), ma bensì, per la somma intelligenza, che avea della lingua latina, e in particolare dello stile CELSIANO, ha su ciò persone alli altri

pensato come gli altri.

Egli è necessario prima di ogni altra cosa di tener bene a mente, che CELSO in questo capitolo da precetti comuni alla cura delle divisioni, non meno delle labbra, che delle orecchie, e delle narici, come appare dal tirolo, che dice: Curta in auribus, labrisque, ac naribus, quomodo sarciri, ac curari possint: tertium est ( avea detto alla fine del cap. precedente) si quid ibi (in auribus) curti est, sarcire. Quae res quum in labris quoque, & naribus fieri possit, eandem etiam curationem habeat, simul explicanda est. Celso adunque incomincia a dire, che, se poca è la sostanza mancante in alcun sito di queste tre parti, vi si può rimediare, ma se

Spiegazione del testo di Celso.

<sup>(</sup>a) Pag. 387: del quarto Tomo dell' Accademia Reale di Chirurgia. Il sig. VALENTIN (Recherches critiques fur la Chirurgie moderne dalla pag. 209. alla 212., e dalla 249. alla 269.) ha ad evidenza dimostrato, che questi Autori non hanno mai pensaro di prescrivere internamente le incisioni semilunari.

ne manca molta, il vizio o è irrimediabile, o, curandolo, vi si produce una deformità maggiore della prima: Curta igitur in histribus, si qua parte parva sunt, curari possunt, si qua majora sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint (a). Segue poi a dire, che la maggiore deformità è il solo male da temersi nel voler curare una grande perdita nelle orecchie, e nelle narici, ma che nelle labbra, se, per rimediare a un tal difetto, sonosi di soverchio raccorciate, se ne perde anche l'uso, e un uso necessario, potendosi poi men bene e mangiare, e parlare: Atque in aure quidem, & naribus deformitas sola timeri potest, in labris vero, si nimium contrada sunt, usus quoque necessarii jactura sit, quia minus facile & cibus assumitur, & sermo explicatur (b). Conciossiachè (soggiunge

<sup>(</sup>a) La traduzione del signor Louis ci sembra poco esatta, poiché sa dire a Celso, che, ogni qual volta havvi mancamento di molta sostanza, il vizio è sempre irrimediabile.

<sup>(</sup>b) Tutti gli Autori da noi letti, neppur eccettuato il Louis, interpretano questo passo, quasi che qui Celso parli della desormità, e dei mali prodotti dalla stessa divisione, e mancanza di porzione delle orecchie, del naso, o delle labbra; ma egli è chiaro da quel, che precede, e segue, e dall'espressioni medesime dell'Autore, che qui parla della deformità, e dei mali, che nascerebbero dalla cura di

egli) per rimediare a fimili difetti, non è già possibile d'ivì far crescere una nuova sostanza, ma bisogna tirarvela dalle prossime parti; la qual trasposizione di sostanza, se è piccola, può ottenersi, e senza che niente si perda dell' azione delle parti attratte, e senza che faccia deformità apparente, non così se ella è grande: Neque enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur. Quod in levi mutatione & nihil eripere, & fallere oculum potest, in magna non potest (a). Ecco quì data la ragione del perchè sia possibile guarire senza inconvenienti le leggieri perdite di sostanza, e non grandi. Quando il Cerufico siasi disposto a farne la cura, CELSO vuole, che incominci a tagliare i margini della divisione in modo, che lascino un'aja quadrata tra di se, e poi che con incifioni

quelle parti imprudentemente intrapresa. Il Louis traduce quelle parole: Si ( labra ) nimium contratta, sunt, si la retraction des levres est considérable, mentre all'opposto significano, se per avvicinare le due porzioni del labbro diviso, troppo si è raccorciato,

Aretto, contratto.

<sup>(</sup>a) Noi leggiamo in levi mutatione, e non mutilazione, tra perchè nel primo modo così si legge nelle migliori edizioni, e in tutti i testi a penna, la parola mutilatione essendovi stata intrusa a capriccio dal COSTANTINO, e dal Ronseo, e perchè così porta il senso: anzi deesi per avventura togliere dai Vocabolari Latini la parola mutilatio inseritavi sulla so-Ja autorità di questo luogo di CELSO. Vedasi il Mor-GAGNI Epist. 111. in CELSUM.

sioni trasversali tratte dai loro angoli interni finisca di separare la porzione di un lato da quella dell'altro lato, indi che faccia avvicinare a mutuo combaciamento quelle due porzioni in tal guisa separate: Ratio curationis ejusmodi est: id, quod curtatum est, in quadratum redigere: ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quæ citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea, quæ sic resolvimus, in unum adducere. Ecco come il Louis spiega questo passo.

Interpretazione del Louis. Il faut d'abord équarrir les bords de la division; puis faire intérieurement une incision transversale à chaque angle de la plaie, au moyens desquelles on puisse allonger la levre, & l'amener entièrement vers le bas .... E per render ragione di questa sua interpretazione, egli suppone, che Celso col suo modo di operare avesse in mira di correggere due disetti, che qualche volta s'incontrano uniti nel vizio di conformazione delle labbra, che su poi chiamato labbro di lepre (a): Celse savoit, que dans le

<sup>(</sup>a) I Greci da principio non aveano alcun termine proprio per denominare questo vizio di conformazione, il comprendevano sotto il nome generico di coloboma Il lodato Autore delle Definizioni Mediche è forse stato il primo a servirsi del termine lagocheilos, che significa labbro di lepre. Vedasi il capani. di detta Opera.

bec-de-lievre la levre est raccoureie par un défaut apparent de substance suivant deux dimensions: elle est trop courte à raison de l'écartement des bords de la division, & du vuide plus ou moins grand, qu'ils laissent entr'eux; elle courte par l'action des muscles, qui la tirent vers le haut, & lui font laisser la dent à découvert. Ora egli immagina, che colle incisioni trasversali, crede prescriversi alla faccia interna del labbro, così interpretando le parole ab interioribus angulis, CELSO cercasse di rimediare al difetto, che tira in su il labbro, e lascia scoperti i denti: D'abord pour allonger la levre du haut en bas, on pratiquoit intérieurement à la partie supérieure de la division, de chaque côté, une incision transversale. L'intention est marquée d'une maniere bien précise, , ut citerior pars ab ulteriore ex toto " diducatur.

Ma noi rispondiamo primieramente, conficazioche qui Cerso, come abbiam fatto ofservare fin da principio, da precetti non particolari per le sole divisioni delle labbra, ancor meno pel solo labbro di lepre congenito, che accade al labbro superiore, ma generali per le divisioni e congenite, e accidentali sì del labbro fuperiore, che dell'inferiore, come pure per quelle delle orecchie, e delle na-

BERTRANDI TUM. TOM. I.

ne di tale in-



rici. Veda egli pertanto, come sia posfibile di applicare alle divisioni delle orecchie, e delle narici il precetto di fare le incisioni trasversali nel luogo,

ch' egli fuppone (a).


In secondo luogo, quantunque da noi non si neghi, poter esser vero, che Celso sapesse, che qualche volta nel sabbro di lepre congenito le due porzioni, o una sola del labbro superiore diviso, oltre che sono scostate l'una dall'altra ai lati, sono anche tratte in su, qui però, nè in nessun altro luogo lo ac-

cenna,

<sup>(</sup>a) Che CELSO qui dia precetti generali, e comuni per la cura delle divisioni di tutte e tre quelle parti, non occorre addurne maggiori prove; che qui poi inoltre intenda parlare tanto del labbro superiore, che dell'inferiore, si vede da tutto il contesto di questo cap, nel quale sempre si serve del plurale labra; infine che intenda parlare si del labbro di lepre congenito, che dell'accidentale, si ricava da un passo del cap. xv. del lib. vi., nel quale dopo aver proposti vari medicamenti per arrestare il cancro della bocca, soggiunge: Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem æque adustum, atque excisum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Dalle quali ultime parole si vede, che CELSO si ri-ferba di parlare della cura dell'ampia divisione delle labbra rimasta, dopo l'amputazione di una loro porzione cancerofa nel libro seguente, ove tratta della cura delle malattie Cerusiche, in quibus vulnus facit Medicus, non accipit ( de Medicina lib. v11. in prafat.) Ma in qual altro luogo di questo libro tratta egli di quella divisione accidentale delle labbra, se non ne parla in questo nono cap.?

cenna, nè dice cosa, onde, non diciamo, apparisca precisamente, ma neppur si possa conghietturare, ch' egli abbia avuto l' intenzione di trarre in basso esso labbro con incisioni trasversali fatte alla sua faccia interna. Imperciocchè, per denotare detta faccia interna, Celso non avrebbe mai usato l'espressione ab interioribus angulis, ed è cosa ridicola il credere indicato di una maniera precisa quell'allungamento del labbro in giù con quelle parole: Quæ (lineæ) citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant.

Quanto è stiracchiata, immaginaria, e in nessun modo corrispondente al testo l'interpretazione del signor Louis, trettanto è naturale la nostra, e adeguata alle parole latine. La prima cosa raccomandata da Celso è id, quod curtatum est, in quadratum redigere, cioè di render cruenti, e ben uguali i margini della divisione con un taglio perpendicolare a ciascheduno, sicche, fatti esattamente paralleli, rimanga tra essi un'aja quadrata, in vece che prima, sia per le loro ineguaglianze, sia per la loro obbliquità, rappresentavano un triangolo, o una figura irregolare. Fatte le incifioni perpendicolari, i pezzi di fostanza recisi restano per anco superiormente attaccati in modo, che vi sono quattro



quattro angoli, due interni, che sono il termine dell'antica foluzione di continuità, e due esterni, uno destro, e l'altro finistro, fatti dalle estremità superiori delle incisioni perpendicolari. CELSO adunque vuole, che fi traggano due incisioni trasversali dagli angoli interni agli esterni ab inserioribus ejus angulis lineas transversas incidere, onde finire di separare la parte destra dalla sinistra, o, come egli si esprime, la parte di qua da quella di là, quae citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant. AVICENNA (a) descrive in poche parole, ma chiare, e precise il modo di preparare alla riunione il labbro, e il naso divisi, dalle quali vien maggiormente confermato il senso da noi dato al merodo di CELSO: Quum labium, & nasus sum diminuta (dice egli), oporset sunc, ut aperiatur membrana, & discooperiatur cutis ab utroque latere. incidatur caro, quae est in medio; nel qual testo si vedono indicate le incisioni si perpendicolari, che trasversali.

Fatte queste incisioni, se i due margini della divisione non si possono sufficientemente avvicinare, CELSO raccomanda allora di fare al di là delle già

fatte

<sup>(</sup>a) Lib. 1v. fen. VII. tract. 1v. cap. 4:

fatte altre due incisioni femilunari rivolte verso la piaga, le quali non oltrepassino la cute; conciossiache in questa maniera ( dice egli ) le parti da avvicinarsi più facilmente cedono, perchè questo avvicinamento non debb' essere proccurato con troppa forza, ma in modo, che le parti tratte si avvicinino con facilità, e lasciate in libertà di molto non si scostino: Si non fatis junguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. Sic enim fit, ut facilius, quod adducitur, sequi possit: quod non vi cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & dimissum non multum recedat. Il signor Louis è d'avviso, come già abbiamo detto, prescriversi in questo luogo da CELSO le incissoni semilunari alla faccia interna delle gote vicino agli angoli della bocca, e crede, che voglia, che con esse si tagli la membrana propria di essa bocca, e i muscoli, lasciando intera la sola cute, e lo prova con quest'argomento: le incisioni trasversali si facevano internamente ( ab interioribus angulis); le semilunari doveano farsi al di là delle trasversali (ultra lineas, quas ante fecimus): dunque anch' esse doveano farsi internamente. Fassa essendo la maggiore,

giore, come parci avere di quì sopra incontrastabilmente provato, falsa è anche la conseguenza, e le parole latine essendo affatto conformi alla inostra interpretazione, cioè da esse apparendo ad evidenza, che le incissoni semilunari sono da CELSO, proposte esternamente alla pelle, che sola si dee tagliare, lasciati intatti i muscoli, poi non ci artesteremmo davvantaggio intorno questa questione, se il signor Louis dopo aver voluto provare, che era un assurdo in grammatica il credere, che CELSO prescriva le incisioni semilunari esternamente alla pelle, non si affaticasse di dimostrare, ciò essere un assurdo maggiore in Chirurgia.

Il precette dato da Celso di fare quelle incifioni alla pelle non è contrario ai principi di Chirurgia, come presende il Lo-VIs. Dice egli adunque (a): Le génie de l'art n'a pas didé le conseil de faire ces incisions extérieures: ce n'est pas la peau qui forme l'obstacle à la réunion, & c'est elle que l'on propose de couper, pour favoriser le rapprochement des parties. Voilà l'absurdité, & l'on ne peut trop la faire sentir. Noi sappiamo, e prima di ogni altro ce ne ha avvertito il BERTRANDI (b), che la maggior resistenza, che incontrasi nel labbro di lepre ad avvici-

<sup>(</sup>a) Academ, Royale de Chirurg. tom. v. pag. 329.
(b) Trattato delle Operazioni tom. 21. pag. 156.

vicinare le parti scostate, nasce principalmente dalla contrazione dei muscoli delle labbra, dai quali pure viene la difficoltà di mantenerle a contatto, avvicinate che sono; sappiamo, che con quelle incisioni semilunari sagliandosi solamente la cute, pure i muscoli delle labbra non cedendo, quell' accostamento difficilmente si otterrebbe, o sarebbe men sieuro (a); neppure ignoriamo, quanto sia cedente, ed allungabile la sostanza delle labbra, di maniera che, quantunque ampia sia la divisione, pur tuttavia quasi sempre si possono ridurre a contatto le parti divise, e scostate, massime mertendo in pratica ne' casi difficili l'ottimo configlio di FABRIZIO d'ACQUA-PENDENTE di accostumarle a poco a poco all'approfimazione per mezzo delle collette (b). Per queste ragioni noi siamo lontanissimi dal eredere, che mai le incisioni semilunari proposte da CELso possano nella cura del labbro di lepre essere indicate, a recare un' utilità reale. Ma non vediamo, perchè CELso, il quale non poteva avere tutte le accennate eognizioni anatomiche,

<sup>(</sup>a) BERTRANDI ibid. pag. 147. (b) Ds chirurg. operationibus cap. XXIX.

logiche, e patologiche, debba essere tacciato d'imperizia nell'arte, se non conoscendosi allora altro mezzo migliore, per rendere seguaci le parti ritratte, uno ne propone, che in certi casi poteva essere di qualche vantaggio. Imperciocchè non v'ha dubbio, che per mezzo di quelle incisioni semilunari fatte alla pelle più facile riesca l'approssimazione delle parti divise. Chi nol crede, ne faccia l'esperienza sopra i cadaveri, e ne resterà appieno convinto. Tanto meno da sprezzarsi ci sembrerà questo mezzo, se si rislette, essere da Celso proposto non pel solo labbro di lepre, ma anche per le divisioni delle orecchie; e delle narici, nelle quali parti, tolta che si è porzione della cartilagine intermediaria, che potrebbe recare qualche impaccio, certamente le incisioni semilunari della cute potrebbero effere più vantaggiose, che alle labbra.

Bensi quel. lo, ch' effo gli affibbia. Ma allo 'ncontrario non sarebbe egli veramente un assurdo il mezzo attribuito dal signor Louis a Celso di fare nel labbro di lepre quelle incissoni dentro la bocca, tagliandone con esse la membrana propria, e i muscoli, lasciata intatta la sola pelle? E' egli vero, che cette sedion detruisoit l'adion retradive, & la peau seule dans ce cas prétoit sans

difficulté à l'extension nécessaire (a)? Ognun sa, quanto siano intimamente uniti alla pelle i muscoli delle labbra, massime in vicinanza degli angoli della bocca, dove tutti infieme fi confondono, e dove dovrebbonsi fare le incissoni semilunari; conseguentemente sarebbe cosa difficiliffima, per non dire imposfibile, il tagliare esattamente in tutta la loro spessezza que' muscoli senza offendere la pelle; e non tagliandosi in tutta la loro spessezza, chi non vede, chemaggiormente, e inugualmente si contrarrebbero, onde maggiore sarebbe la loro forza nello scostare nuovamente le parti avvicinate, senza parlare degli atroci dolori, e delle convulsioni, che non potrebbono non succedere. Egli è chiaro adunque, che poco, o nessun vantaggio, anzi forse un danno reale si otterrebbe da quelle incisioni interne, in vece che qualche bene si potrebbe ricavare dalle medesime fatte esternamente. Ecco adunque, che il signor Louis affibbia a Celso un precetto di Chirurgia, che è veramente un affurdo, mentre cerca di discolparlo da un preteso abbaglio, che in que' tempi era un pre-

<sup>(</sup>a) Academ. de Chirurg. loc. cit. pag. 334.



cetto assai buono, ed ecco che il BERTRANDI, e tutti gli altri valenti Cerusici di sopra nominati hanno benissimo interpretato il Romano Scrittore.

CELSO fi ferviva del gammautte per cruentare i margini della divisione.

Potrebbesi domandare, di quale strumento CELSO si servisse per fare le incisioni perpendicolari, e trasversali, se del gammautte, oppur delle forbici. Noi siamo di sentimento, che si servisse del gammautte, prima perchè l'espressione lineas transversas incidere sembra indicare uno strumento semplice da taglio, poi perchè nel cap, presedente, dove raccomanda di cruentare i margini della divisione dell'orecchio, nomina espressamente per tal uso il gammautte oras scalpello exulcerare. Noi pertanto non diremo, che il signor Louis, dove vuol provare, che il gammautte vuol essere preferto alle forbici, per cruentare i margini del labbro di lepre, avrebbe dovuto corredare la sua opinione dell'autorità di CELSO, perchè ci potrebbe rispondere, come ha già risposto a quelli, che gli hanno fatta la stessa obbiezione, che ce fut la crainte de donner trop d'étendue à ce Mémoire, qui m'empêcha de traiter historiquement ce point de l'art .... Les Anciens ne se servoient que du bistouri pour cette opération

ration (a); diremo bensì, che là, dove asserisce, che les Praticiens ont suivi assez aveuglement les préceptes donnés par les Auteurs sur la maniere de rafraichir les bords de la division; tous se servent de cizeaux, & aucun n'a pensé, que cet instrument formé par deux tranchans assez grossiers ne coupe qu'en machant (b), avrebbe dovuto eccettuare il BERTRAN-DI, il quale raccomanda espressamente il gammautte (c). Che se per difenderfi dall'accusa di plagiato, che con molto fondamento gli potremmo dare, uso delle forbici privolesse rispondere, che il BERTRANDI ha da lui imparato questo metodo, mentr' era suo ospite, noi gli risponderemo, che in quel tempo egli non avea ancora deposto il volgar pregiudizio dell'uso delle forbici; conciossiachè così si esprime nell' Enciclopedia all' articolo Becde-lievre: Pour rafraichir les levres de la division .... on se sert des cizeaux, ou du bistouri, senza spiegarsi, a quale di questi due strumenti debbasi dare la preferenza. E poi concedendogli anche tutto quanto vuole, qual'occasione più opportuna gli si poteva mai presentare,

ma del Lo-



<sup>(</sup>a) Academ. Royale de Chirurg. 10m: v. pag. 317, b) Academ. de Chirurg. tom. 17. pag. 392.

<sup>(</sup>c) Trattațo delle Operazioni tom. 11. pag. 149.

onde lodare l'indole docile, e seguace del suo scolaro, che là, dove con sì poco garbo declama, è fa tanto schiamazzo contro que' Maestri, i quali, quantunque avessero veduto la facilità di cruentare i margini della divisione col gammautte, e sentite le ragioni di preserenza, che dee avere sulle cesoje, continuavano tuttavia a servirsi di queste? Il Bertrandi almeno dovea essere escluso dal numero di que Professori, dei quali il signor Louis dice, qu'il est facheux, que l'enseignement soit consié à de pareils Maîtres, " mox daturos pro-", geniem vitiosiorem (a)?"

Noi finiremo per ora le nostre offervazioni sul Trattato delle operazioni del BERTRANDI, e ritorneremo alla sua vita, che si approssima al suo termine. Il meritamente rinomatissimo sig. Bour-GELAT avea nel 1761. ottenuto dal Re suo Padrone la permissione di aprire nella Città di Lione una pubblica Scuola veterinaria, a cui nel 1764. diedesi titolo di Reale. Appena il BERTRANDI ebbe notizia di un così utile stabilimento in Francia, che rappresentò al Re

<sup>(</sup>a) Acad. de Chirurg. loc. ultim. eitat. pag. 398. Si poisono anche leggere le riflessioni, che sa a questo proposito il signor VALENTIN pag. 315., e 316. delle sue Recherches sur la Chirurgie moderne.

CARLO EMANUELE, di quanto vantaggio sarebbe anche stato nel nostro Paese. Era memore quell'avvedutissimo Principe della orrenda strage, che l'epizoozia bovina avea fatto negli anni 1744., 45., 46., e 47. non solamente in Piemonte, ma anche per tutta l'Italia, anzi per quasi tutta l'Europa, sicchè poco mancò, che non fosse distrutta la spezie di quegli utilissimi animali. Il BERTRANDI conseguentemente, quale in quell' occasione era stato mandato più volte dall' Eccellentissimo Magistrato de Conservatori Generali di Sanità insieme col Dottor BRUNI a spararne i cadaveri, onde investigare la natura di quella mortifera pestilenza, non dovette molto faticare per persuadere quell'ottimo Re, il quale subito diede ordine al BERTRANDI medesimo di cercare fra i suoi Allievi un soggetto capace di secondarne le mire. Non sapremmo però dire, se per l'amore, che ci ha sempre portato, non siasi troppo ingannato nella scelta, coll'avere al Re proposto uno di noi, che scriviamo le presenti Memorie, il quale, malgrado tutta l'applicazione, e la buona intenzione, che ha sempre avuto, non ha certamente potuto corrispondere appieno all' aspettazione di quel beneficentissimo Sovrano, e di chi l'ha proposto. Men-

Induce il Re allo flabilimento di una scuola veterinaria.

jêts, & courageux dans la maniere de les proposer il n'avait d'autre bût que la gloire du Monarque, auquel il faisait l'aveu sincere de lui devoir presque tous son être, & le bien de ses concitoyens, qu'il aimait tendrement sans le paraître. Cet homme né pour sentir le vrai en toute chose n'avait paru s'en éloigner quelque peu dans plusieurs sujets les plus intéressans pour l'homme, & pour le Chrétien, que parceque il avait eté trop applaudi dans sa jeunesse, tems, où un désir mal entendu de frapper, & de plaire l'em-portait malgré lui à avancer des paradoxes, qu'il désavouait ensuite dans le silence de ses passions. Dieu ne voulut point, qu'un tel homme, qui avait tant fait pour le bien de ses semblables, fut perdu, & l'éprouvant par une maladie longue, & pénible il lui donna le tems de reconnaître ces mêmes vérités, pour lesquelles il était plus propre, qu'aucun autre à cause de ses grandes lumières. C'est à ses éleves, & à vous, Monsieur, en particulier, qui en étiez si fort estimé & si tendrement aime, de le faire revivre en l'imitant, & de dédommager notre Patrie par la renaissance de plusieurs grands Hommes, qui l'égalent. Ces sont, Monsieur, les vœux de celui, qui vous honnore, E qui vous est entièrement devoué.



## ORAZIONE

SOPRA GLI STUDJ

## PER LA CHIRURGIA

LETTA NELLA REGIA UNIVERSITA' DI TORINO
LI V. NOVEMBRE MDCCLVIII.

SE i Prencipi coll' armi difendono, e dilatano gl' imperj, colla coltura delle scienze, ed arti li rendono illustri, doviziosi, potenti, e sicuri, e quel Conquistatore, che da principio forse meno piacque, è poi amato come protettore, e padre. Non rammenterò Atene, e Roma, che allora ebbero più vasto, e possente l' impero, quando co' più valorosi Capitani siorirono nelle Repubbliche i più dotti Magistrati, ed i più industri Artesici; che anco il nostro secolo ha ve-

BERTRANDI TUM. TOM. I.

duto nazioni barbare, neglette, ed incolte essere pervenute a meritar estimazione, gloria, ed autorità fra le più colte d'Europa, dappoiche un ottimo Principe le trasse da quella loro ferina negligenza all' amore delle belle arti, e delle scienze, ed altre si videro cadere nell' oscurità, e nel disprezzo, quando per la barbarie de Principi le une, e le altre lor furono impedite, e tolte; e se veggiamo vasti, e doviziosi imperj, ove elleno sono in disprezzo, e in odio, ivi la tirannide ha il suo seggio, e non meno il comando è senza diritto, che l'obbedienza senza ragione; miseri sono i popoli nella stessa loro ricchezza, che appena possono con una sterminata moltitudine supplire al difetto di quelle scienze, ed arti, di cui son privi. Le scuole dunque, e le Accademie non meno de numerosi eserciti, e delle forti rocche servono alla sicurezza, ed alla felicità de Regni. Esse proveggono i Ministri del Tempio, e dello Stato, que della pubblica salute, e tutti gli altri Dottori, ed Artefici, che fervono ad istruire, a dilettare i popoli, o a rendere più comoda, é più sicura la vita. Ma fe in ciò la provvidenza de' Principi è d'ogni maggior laude degna, quale non debbe essere la sapienza, ed il zelo di quelli, che da essi sono scelti, e condotti ad ammaestrare la gioventù? Questa considerazione, SIRE, mi riempì l'animo di timore, di diffidenza, e d'irresoluzione, allorché in un giorno solo mi elevaste al sommo onore di Vostro Cerusico, e di Profesfore in questa Regia Vostra Accademia; che se io poteva certamente promettere un ardentissimo zelo per servire, ben conosceva, quanta perizia, e dottrina mi mancasse, perchè mia servitù fosse utile alla Patria, che nell' innalzarmi ad un sì onorevole magistero questa su la fola vostra intenzione, come dovrà essere certamente il mio solo dovere. Egli è vero, che l'arte, la quale io debbo insegnare, è così lunga, e difficile, che la mia età potrebbe scusarmi, se a quella dottrina, e perizia non fossi ancor pervenuto, e come questa mia presente insufficienza ingenuamente confesso, egualmente sento quel mio dovere, che non potrò giammai dimenticare. Per la qual cosa ho creduto di non poter far meglio stammane, che esporre, come sia per irvi dietro meco conducendo questi Ottimi

<sup>\*</sup> La Cattedra dell' Oratore nella gran Sala della Regia Università è dirimpetto al Trono del Ressotto cui evvi il suo Ritratto, e le Guardie a lato, colle Persone dell' Eccellentissimo Magistrato della Risorma, che sedono appiè del Trono.

ottimi Giovanetti, che con tanta bontà, e sollecitudine, CLEMENTISSIMO MONARCA, avete alla mia cura raccomandati; nè potrò mai con questo discorso, quantunque sosse di ragioni, e di consigli fervido, pienamente dimostrare quella aspettazione, che Voi avete di loro, e che tante volte mi avete significata.

Se i bisogni, i comodi, ed i piaceri della vita furono i Maestri, che infegnarono le arti agli uomini, trovatisi essi, dopo la lagrimevole caduta de' primi Padri, sprovveduti, deboli, e senz' armi in questa terra incolta, e dirupata, tra corpi rozzi, mal sostenuti, e spesso cadenti, tra il fuoco, ed il gelo, al furor dei venti, e delle pioggie, di bestie feroci, e velenose, inesperti a custodirsi, a difendersi, ed a scegliere gli alimenti, se stessi insidiando, ed offendendosi, cominciarono- ad aver bisogno di Medicina, tosto che da quel felice stato cadettero: Ipfa necessitas coegit homines, scrisse CELSO, medicinam inquirere, & invenire, e questa fu il non favoloso Apolline; le bestie stesse, non che le genti barbare, per un certo naturale istinto la cercano, e ne fanno prova: ma fe il corpo animato di tutti i creati dalla natura è il più capace di rimedio, questo egli è altrettanto difficile,

e sovente pericoloso; imperciocche come la stessa sottigliezza, e varietà del soggetto appresenta una gran facoltà di medicare, altrettanto porge una grande facilità all'errore: per la qual cosa la Medicina fu sempre mai un'arte di conghietture, ardua, e difficilissima, la quale quantunque dal tempo del divino IP-POCRATE mercè le scoperte dei Filosofi, e degli Anatomici fia finalmente pervenuta ad avere alcuni principj evidenti, nulladimeno nell'esercizio così difficilmente vi si appone, tanti ostacoli incontra, e tanti pericoli, che sono eterne le querele degli increduli, e indiscretamente le si niega, che al possibile sempre più si avvicini; ma quelle querele, e que clamori anco da più ostinati disprezzanti increduli della Medicina sempre sono terminati coll'antichissimo elogio della Chirurgia. Ea non quidem medicamenta, atque vidus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat, estque ejus effectus inter omnes Medicinæ partes evidentissimus; siquidem in morbis cum multum fortuna conferat, eadem sæpe salutaria, sæpe vana sint, potest dubitari, secunda valetudo medicina, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamentis maxime utimur, quamvis profectus evidentior est. tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe manifestum est ... at in ea parte, que manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere. E come quelli di questo elogio si servono per mitigare l'onta della loro incredulità per l'altra, egualmente fe ne servono per far sentire noi Cerusici, che non ci sarà perdonato ogni qualunque minimo errore. Pensate dunque, Giovani amatissimi, quale sia la vostra imprela una tal' arte stimatissima intraprendendo. Ma se quest' arte ha il prezioso vantaggio d'essere la parte di Medicina la più sicura, ella però non può avere quella tanto lodata ficurezza senza tutte quelle scienze, ed arti, per le quali è più stimato un Medico. E ciò essendo verissimo, quale speranza potranno avere quelli, che senza educazione, senza coltura, senza ingegno osano intraprenderla? Non l' infortunio, non la difficoltà dell'arte può scusare i nostri errori, che come appajono tosto fatti, perciò si pretende, che meglio se ne possano prevedere i pericoli per scansarli; ed intraprendere una tal' arte senza la necessaria provvisione, ella è tanta temerità, che se non con nostra outa, miseria, e disprezzo, se pure senz' altro castigo, si può rimanere a mezza strada, Come disse della Medicina

dicina (a) IPPOCRATE, così suol dirsi da alcuni a' nostri di della Chirurgia: ,, Ella è un' arte nobilissima, ma per l'insufficienza di alcuni, che la professano, e di que, che per essi di tutti gli altri giudicano, ella è divenuta infima ad ogni altra. Del qual errore questa loro pare la cagione principale, che a quest' arte sola non vi sia stata stabilita alcuna pena, fuorchè l'ignominia, della quale que' miferi non possono avere sentimento. Esti, dice IPPOCRATE, sono simili agli Auori delle Tragedie, i quali ,, rappresentano e per gli atti, e per l'abito quelli, che in fatti non sono. ,, Chiunque vorrà essere in quest' arte faccente, converrà, che il divenga ,, co' seguenti mezzi: natura, dottrina, " luogo arro agli studi, educazione, industria, e tempo. La natura debb' , essere la prima, la quale se ripugna, , ogni fatica è perduta, fina con quella ogni profitto è facile, e maggiormente se colla dovuta educazione siamo portati in luogo cómodo per imparare, e la prudenza ci conduca, ma ci vuol tempo, ficche colmi dottrina continuamente crescendo produ- ۋر

<sup>(</sup>a) Hipport. lex pag. 1., & 2. ex edit. Foefii.



., duciamo ottimi frutti. " Se quella natura avete; Giovani amatissimi, il tempo, il luogo, ed il comodo ve l porge la munificenza del RE, ficchè i voto d'IPPOCRATE sia appieno per voi soddisfatto; e se non v'è legge, per cui sieno esclusi dalle scuole gl'ignari, e privi d'ingegno, come dalla milizia i deboli, e mal composti della persona, la miseria, ed il disprezzo, in cui essi si vedono rimanere, dovrebbe dissuaderli, se alcuna volta potesse avere egual forza l'esempio, che la legge. Avendo dunque avuta la necessaria educazione negli studi delle lingue, e della Filosofia, dovrete poi con somma sollecitudine, e fervore intraprendere lo studio dell' Anatomia, principio, e base di nostr' arte, sicchè ne acquistiate una piena sodissima cognizione; una piena, dissi, e sodissima cognizione, imperciocchè una linea di maggiore, o minore spazio ad uno de'lati, oserei dire un punto possono rendere un' operazione felice, e stupenda, o mortale. Solamente pei morbi organici, e pei consensi giova l'Anatomia ai Medici, i Cerusici dovendo perpetuamente ricomporre parti scomposte, o toglierne le superflue, e dannose, e per lo più con mezzi forti, e violenti a traverso queste, e quelle altre parti, che si debbono ſmuo-

Anatomia.

fmuovere, o sfuggire, con quanta esattezza, e quanto minutamente non dovranno conoscerne l'ordine, e la composizione? Ogni parte conta nel corpo umano, se non per altro, almeno per evitare un maggior grado di dolore. Ignorantia eorum, disse pur bene GALENO (a), quæ per exquisitam Anatomen inveniuntur, in rebus quidem securis timidos, in periculosissimis autem maxime audaces quotidie reddit. E nell' operazioni il timore non meno, che l'audacia sono degni di riprensione, e pericolosi, quando dipendano da ciò, che s'ignora d' Anatomia. Se esaminiamo la ragione di alcune cose, nelle quali la Chirurgia degl' Antichi può sembrare ad alcuni meno instruiti della storia dell' arte, rozza, ed insufficiente principalmente pe raziocinj Teorici, vedremo ciò essere accaduto, perchè in que tempi l' Anatomia nè da' Greci, nè da' Latini, nè dagli Arabi era coltivata se non sui bruti. GALENO stesso, il Principe degli Anatomici antichi, confessa di non, avere mai inciso alcun cadavero umano, se non uno, che fracido, e lacero trovò appiè d'una montagna. Mondino, BERENGARIO, MASSA, VESALIO, FAL-

<sup>(</sup>a) De Anatom. administrat. lib. 2. cap. 3.

LOPPIA, EUSTACHIO, COLOMBO, FA-BRIZIO d'ACQUAPENDENTE, e CAS-SERIO avendo illustrata l'Anatomia co' loro rigorofi esami, e colle loro scoperte, accrebbero tanto lustro alla Chirurgia, che, vivendo essi tutti in Italia, da ogni parte d' Europa concorrevano gli stranieri per quivi apprendere, non si sapeva, se più l'Anatomia, che la Chirurgia, tanto queste due arti sono inseparabili; e sino verso il fine del Secolo paffato Pavia, Padova, Bologna, Roma, e Napoli furono di amendue quelle arti le scuole prescelte, e le più illustri, come per la stessa ragione sono pervenute alla stessa gloria in questo secolo Parigi, e Londra. Le azioni Cerusiche sono terminate e ne' modi, e tra gli spazj sopra una macchina composta di varie altre macchine con determinato ordine apposte, e distribuite; col lume dell' Anatomia vi si guata dentro, colla mano armata francamente vi fi penetra, oppure si ssugge il pericolo, se egli non è talmente inevitabile, che abbiano a deporsi l'armi, ed allora nemmeno si puote accusare l'insufficienza dell' arte, ma la gravezza del morbo visibilmente irreparabile, mancando pintetosto lo spazio, che il modo della operazione. Siano esempio del miglioramento, che acquistò nostr' arte coll' Anatomia.

tomia, i vari modi trerati per estrarre il calcolo dalla vescica, l'estrazione della cateratta, la cura delle fistole lacrimali. e dell'ernie, e la perfezione, a cui si è ridotta l'arte d'ostetricare, prima tanto insufficiente, e crudele. Il ricomponimento delle ossa slogate, ed infrante per le tante si composte, e voluminose macchine degli antichi era difficile, e faticoso; i celebri Petit, e Du-Verney ne' loro trattati avendo esposto esattamente secondo i dati scomponimenti le mutate direzioni de muscoli, le apposizioni delle parti resistenti e delle rilassate hanno insegnati modi più facili, e meno dolorofi per comporli, ed ora più giova la destrezza insegnataci dall'Anatomia, che allora la forza delle pesanti compostissime macchine. Dirollo arditamente, nón folamente le principali direzioni de maggiori vasi, e de' nervi, le apposizioni de' più grossi muscoli, la tanto comune descrizione delle ossa basta a' Cerusici; ma per non confondere i fintomi, e per non paventare d'essi, ove non debbono contare, e per non disprezzarli in altri, quando essi fanno la maggior gravezza del morbo, e porgono la principale indicazione, anco la più minuta Anatomia si debbe possedere. I morbi, che dobbiamo curare, sono perpetuamente

mente organici mè lo stesso organo per le stesse parti, e cogli stessi modi si può sempre racconciare, o incidere, che non a debbano variare i modi, e gli spazi. locchè non potrà mai intraprendere con un ragionevole coraggio il Cerufico, fe egli è incerto, e mal ficuro di quell' altra strada, per cui deve penetrare. Bisogna dunque, ch' egli veda cogli occhi della mente in tutto il solido, e per ogni lato, nè ciò si può, se non con quel vasto lume dell' Anatomia, col quale le parti tutte insieme nel lor ordine, e simmetria avvincolate, ed apposte pe'vari angoli, e per le varie superficie chiaramente al nostro spirito s'appresentano. schiette, e non confuse; altrimenti ne' casi difficili il nostro timore, e la nostra incertezza faranno alcuna volta reprensibili, o la nostra audacia pericolosa. Nè molto giova conoscere delle parti il sito, le connessioni, e la figura, se gli usi, le corrispondenze di meccanismo, e d'azioni s'ignorano, ma debbe essere, come dice l'ALLERO, l'Anatomia animata, perchè, non meno che il cadavero freddo, e senza azione, si conosca l'uomo vivente, che è di nostra arte il soggetto. Quanto le delicate persone inorridiscono veggendo i Giovani Anatomici resistere all'orrore, ed al lezzo de cadaveri, altrettanto gli uomini

Fisiologia.

capaci ne compiangono la spaventosa fatica, veggendogli anelanti, affaticati partire i cadaveri a brani, ed applaudirsi d'aver ripulite ossa, schiantate viscere, e sparti muscoli, nervi, e vasi, e lordi di fetente succidume, e d'atro sangue intrifi vantarfi Anatomici, quando pur pajono macellaj di carne umana. tanta differenza, oserei dire, tra l'incifore, che non combina, non conghiettura, e non sa animare le parti, che ripulisce, e divide, e l'Anatomico, che col lume delle meccaniche, della Fisica, e della Chimica i modi della vita ne fcorge, come fra quegli, che può contar l'ore d'un oriuolo, perchè su caratteri vede volgersi la sfera, e quegli, che potrebbe ridonargli, ritardargli, o accrescergli il movimento, perchè conosce delle ruote gli ordini, e le azioni, e tanto giova per l'arte di medicare una descrizione Anatomica, che non conduca ad intendere qualche azione dell' animal vivente, come le tante piante de' Botanici, delle quali, quantunque minutamente descritte, se ne ignorano gli usi. Per le une, e per l'altre vi abbifogna il Filosofo, che tragga profitto del creato da Iddio, ed esso merita la maggior lode, come lo scultore, fè la statua, più che il villano, che trasse dalla montagna il marmo. azioni

azioni dunque bisogna conoscere non meno, che la struttura delle parti, quelle sono tanto complicate, ed oscure, ma sostenute, e dirette per una tale indisfolubile, compostissima continuazione di macchine, e di forze, che, se lo spirito non le vede in tutta la loro vastità, e non ne comprende intero l' amplissimo sistema, poco capisce, dubita, si confonde, e stupido rimane nell' oscurità, principalmente allor quando dal morbo sono quelle macchine, quelle forze esse stesse pervertite, e confuse. Contemplationes naturae, & corporum in simplicitate sua, ci ammonì saviamente BACONE, intellectum frangunt, & comminuum, contemplationes vero natura, & corporum in compositione, & configuratione sua intellectum stupefaciunt, & solvunt .... Illa enim ita versatur in particulis rerum, ut fabricas fere negligat; reliquæ autem ita fabricas intuentur attonita, ut ad simplicitatem naturæ non penetrent; itaque alternandæ sunt contemplationes ista, & vicissim sumendæ, ut intellectus reddatur simul penetrans, & capax. Questa è la grand'arte di esaminare, e di comprendere la natura, in altro modo sarà misero, e scarso il profitto, quanto saranno state minute, ed umili le nostre fatiche; e la grand'opera di Dio guardata

ţ

a quel modo cogli occhi d'una mente limitata, e ristretta parrà tanto piccola, quanto poco si capisce; quindi mille errori non meno nel comprenderla, che nel regolarla vacillante, ed inferma. Ma quegli, che non potrebbe facilmente comprendere il volgersi delle ruote della più grossa, o meno composta macchina di legno, o di metallo, potrà presumere d'intendere l'economia del corpo animale, opera fovrana del fommo Iddio, macchina la più composta, la più meravigliosa, di squisitissimo senso, e di stupende azioni fornita? Ala che lo studio di tutta la natura, non che quello delle meccaniche, e della Chimica, come già dissi, appena può bastare per conoscere appieno una sì alta divina fattura, la quale pure pretendiamo colla nostr' arte difendere, e sostenere; Qui naturæ vias non noverit, disse ottimamente lo stesso BACONE, quomodo is illi occurrere potest, eamque vertere? Quanto dunque sono degni di riso quegli stessi, che pur ridono di coloro, che dall' Anatomia delle bestie, e delle piante proceurano di trar lume per meglio intendere l'economia del corpo umano! L'uomo è alla cima della catena delle cose create, su per questa si dee salire a grado a grado per meglio comprenderlo. Il dissi, ed il ridico,

vi vuole del corpo animale, e di sua economia per intraprendere la nostr' arte, imperciocchè con quelle cognizioni, de contrari, come si dice, la ragione è sempre la stessa, facilmente s'intenderanno i morbi, e meglio si potranno curare, cioè, vo' dire, si avrà più luminosa, più soda Teorica; perciocchè io per essa altro non intendo, se non quella scienza, per cui si dà ragione dei morbi, delle indicazioni, e de rimedi, e non que vani, tati, fastidiosi, e per lo più falsi ciancioni, che hanno fatto piuttosto l'obbrobrio, che la gloria, ed il vantaggio di questa per altro elegante, e nobilissima parte di nostr' arte, a modo tale, che da molti un Teorico villanamente fia ripreso come un ciarlone, ed impostore. Ma la Teorica non è, se non ragione, e la ragione non è, se non verità, e questa non può essere, se non nuda, semplice, schietta, immutabile, perpetua, e perciò la vera Teorica non può essere, se non colla maggior parsimonia di parole; ed è pure un martoro per i veri Teorici, che ne debban far molte per istruire alcuna volta quelli, che non hanno i mezzi di capire conseguenza, perchè mancano di principj, i quali sempre dipendono da una **ferie** 

Teorica.

serie di nozioni, che non si possono spiegare in poche parole. Non si può però negare, che l'una, e l'altra medicina abbiano ne' primi secoli tratto il maggiore vantaggio dail' esatta osservazione di ciò, che in certi dati casi giovava, o nuoceva; ma il bene, ed il male nella nostr'arte sono spesso equivoci, se sempre alle stesse cagioni si rapportano, e convien confessare, che come evvi un sistema di parti, e d'azioni, egualmente vi debba essere un sistema di morbi. Ho definita la Teorica ragione de' morbi per le loro cagioni, ed effetti; ragione delle indicazioni pei vari modi degli effetti presenti, e posfibili ad accadere; ragione de rimedi per le varie azioni efficaci, infufficienti, od anco perniciose, ch' essi possono produrre secondo le varie cagioni, modi, od effetti de' morbi; e questi. accadendo per ragione di una determinata struttura di parti, e di un determinato meccanico modo di azioni, e di morbo, si pretenderà sciogliere un tal nodo senza ragione di sistema, e di metodo? I gran Maestri sempre si lagnarono, che la vita fosse breve, l'arte lunga, l'occasione veloce, e precipitosa, gli sperimenti pericolosi, difficili i giudizj, e ciò perchè i morbi sono tanto, oscuri, e complicati, la natura umana

Bertrandi Tum. tom. 1.



sì delicata, debole, inferma, e ruinosa; come dunque in sì breve vita, con fuggiasche occasioni, con pochi, incerti, mal giudicati sperimenti potremo sperare di riescire gran Maestri, quando i nostri sperimenti non sieno tratti dalla profonda contemplazione della Natura fana, e morbosa, sicchè se ne conofcano i modi, ed i termini? Ma queste due nature gli hanno certamente i lor modi, e, come dissi, meccanici, incostanti però, fatti morbosi, vari, ed equivocamente appariscenti; bisogna esservi all'aguato, le regole variano come i casi, e bisogna variar con essi di pensiero, e di opra: insomma l'arte de medicare è tutta prudenza, e la prudenza è un' arte di accomodarsi al giusto, al congruo, al possibile, interpretando le circostanze di tempo, di luogo, e di persone; e l'empirismo; procede o con regole ristrette, perchè dubita della varietà del caso, che sorse non v'è, o che temerario intraprende sopra una falsa apparenza, qual ragione avrà di ergere sì orgogliosa la fronte, e disprezzare quelli, che si fanno un reli-gioso dovere d'impallidire sui libri, e fui cadaveri, d'affaticarsi, e spendere in esperimenti, di logorare la mente, ed il corpo in meditazioni, perchè l' una, e l'altra natura più chiaramente

conoscano? Dio immortale, qual cecità, qual orgoglio è questo! I giuochi stessi hanno le lor regole, e di quelle regole le ragioni, le quali secondo le varie combinazioni, e probabilità de' casi variano, e l'astuto intelligente giuocatore, che prevede i casi possibili, com bina, muta, ripartisce, e sollecita la sorte, se pure ve n'è alcuna, che possa sperare. Io non vò dissimulare che vi sieno casi terminati, limitatissimi, che in nessun modo possono variare, e forprendere, ed a' quali può provvedere chiunque gli abbia alcuna volta veduti, quanto egli zotico sia, purchè capace di senso; ma dirò loro ciò, che disse (\*) IPPOCRATE: Medicorum plerique malorum navium Gubernatorum mihi fimillimi videntur, qui, fi tranquillo mari navem regunt, nemo eos peccare deprehendat, quod 'si eos vehemens ventus, aut tempestas oppresserit, jam omnibus manifeste constat eorum imperitia, & culpa fuisse perditam; e se giungono a falvarla una volta fra la tempesta, neppure sanno, come siasi salvata, e se non per replicate disgrazie, e fortune giungono a capirlo, fe pure hanno acume d'ingegno per correggers,

<sup>(5)</sup> Lib. de prisco Medicina pag. 11. edit. Foesii.

durfi in somiglievoli casi; imperciocchè nemmeno io non vo negare effervi anco per la nostr arte una certa forza, e perspicuna d'ingegno, colla quale alcuni per mezzo degli esempi prima osfervati, e delle prove prima fatte sentono le minacce, ed i favori della natura, quantunque bene non ne conoscano il meccanismo, e come l'uomo capace, ed instruito vede cose, non può spiegare con parole; così essi sentono cose, le quali pure pienamente non capifcono, ed infine se un gran Pratico, invecchiando nell'arte, fi sostenne, e guadagnò applauso senza impostura, e senza audacia, egli fu certamente dotato di un grande ingegno, e può alcuna volta errare, non perchè non vi pensi, ma perche gli manca quella per così dire intuizione, che sola s'ortiene collo studio dell'una, e dell' altra natura. Ecco dunque provata la perpetua necessità del raziocinio, che pur viene in que Pratici, quantunque men sostenuto, e meno sicuro, ed essi per lo più ogni altro modo di ragionare non curando, oppure anco disprezzando, di quello vivono fastosi, esso non è, se non una muta ristretta Teorica. Quanto dunque dovrebbero essi lodare quell' altra tratta dalla cognizione della natura, e chi la possiede, quanto magmaggiori ottimi frutti non dovrà promettersi? E se la storia delle varie Teoriche è quella de più ridicoli, e de più temerari errori dello spirito umano, vi farà forse ragione di condannarle tutte come inutili, e perniciose? Ella è Teorica uno studio sublime, ed ampliffimo, una scienza di molte altre scienze composta, dai progressi delle quali essa dipende. Ne primi tempi, quando Maestri si applicavano a coltivare la Teorica sperimentale, che è l'una buona. le altre scienze, dalle quali si dovevano trarre i maggiori lumi, ed ajuti, erano fcarse, oscure, insufficienti; per le nuove scoperte degli Anatomici, de' Chimici, de Filosofi quella ofcurità fi diradò, si recò un nuovo lume, per cui molti errori sono stati tolti, e se altri sono stati introdotti, ciò avvenne per l'immensità, e somma difficoltà del foggetto; ma il vedere, che in tutti i secoli, in tutte le nazioni nomini savi, e d'alto ingegno si sforzarono di recarvi lume, e vel recarono, non è forse una prova della somma necessità di averne alcuma? E dirolla infine la massima prova della necessità della Teorica, quanrunque sia una prova, che ci avvirisce, e disonora: se alcun malato non men: tormentato, che curioso del mal, che fente, interroga certi Maestri sulla rav gione,

gione, e sui modi del suo male, quelli gli danno per contentarlo spiegazioni d' ogni forta, e per lo più vane, stravaganti, e ridicole, delle quali esso contentandosi mostra d'essere sciocco, e credulo; ma quelli non le darebbero pel loro onore, e per l'amore della verità, se potessero persuadere un uomo, quantunque sciocco, essere ogni Teorica, ogni raziocinio inutile; nè mai declamano contro la Teorica, ed i raziocini, se non quando un Competitore capace loro ne presenta, quantunque modestamente, una migliore, che non capiscono, o non vogliono capire, Infine senza Teorica potesse l'arte giungere alla sua perfezione, perchè mai dopo tanti secoli di sperimenti non vi pervenne? Infiniti sono i Pratici, pochissimi i Teorici, e se qualche bene si è fatto, dicanlo i Pratici, se su per loro soli, dicanlo, e ne dieno prova. Operare coll' esempio, e colla ragione non sarà più lodevole, e più ficuro, che col solo cieco inconsiderato esempio? Se siamo ciechi, sarà prudenza gettare il bastone, e correre una strada, che non si potrà conoscere, se non dopo aver provati con nostro danno mille pericoli, e se pure una volta se ne conoscano i viotoli, il primo palo, che vi fi pianti, ci: dia impaccio, e pericolo? Vedete. dun-

dunque, Giovani amatissimi, quale debba essere il vostro studio per intraprendere a curare la vita degli uomini; un' arte, che trae la sua difficoltà dall' eccellenza del foggetto, dalla moltiplicità, incostanza, e varietà de' casi, non puote mai essere un' arte di semplice inconsiderata sperienza, e se alcuna volta tuonerà alle vostre orecchie la voce di alcuno, che condanni i vostri studi, ch' esso crede inutili per la pratica, non lasciate la magnanima impresa, e rispondetegli con Celso: Quamquam multa fint ad ipsas artes proprie non pertinentia, tamen eas adjuvant excitando Artificis ingenium. Itaque ista quoque natura contemplatio, quamvis non faciat Medicum, aptiorem tamen Medicinæ reddit; profecto verisimile est, & HIPPO-CRATEM, & ERASISTRATUM, & quicumque alii non contenti febres, & ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem Medicos fuisse, verum ideo quoque majores Medicos extitisse. Il ripeto però (perchè non vò dissimulare le dissicoltà, e per così dire, la povertà del soggetto, che dovrebbe una volta essere ticchissimo), quantunque meglio si conoscano in questo nostro secolo i principi, i modi, e le forze della natura, nulladimeno tutto ancora non si cono-8 4

sce; nè v'è speranza, che si conoscerà, sendo dato a noi l'usufrutto piuttosto, che la scienza delle cose create, onde mai non si possa avere una teorica ad ogni caso, ad ogni questione pienamente satisfaciente, e come ciò egli è verissimo, tanto vi prego più, gentili spiriti, di studiarla con retto giudizio, niente abusando nè della natura, nè del vostro ingegno. Guardatevi dalla seduzione per il mirabile, dalla neghittenza, dalla presunzione; dopo certi studi, fatiche, ed applausi una certa persuasione, un certo orgoglio ne nasce, che di tutto presume, infinge, simula, e confonde; quindi errori, ed errori, pei quali l'arte si lacera, mal si torce, e fi disonora. Sentite del gran Cancelliere l' alta voce sui pregiudizi, e sugli abusi dell'ingegno umano in somiglievoli casi: Quod mavult homo, id potius credit, rejicit itaque difficilia ob inquirendi impatientiam, sobria, quia coardant spem, altiora naturæ propter superstitionem; lumen experientiæ propter arrogantiam, & fastum, ne videatur mens versari in vilibus, & fluxis; paradoxa propter opinionem vulgi, denique innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus affectus intellectum imbuit, & inficit. Meglio sarebbe non averne alcuna teorica, che averla tale, che conduca alla presunzione:

zione, all'impostura, alla temerità, agli errori. Inveniendum, non fingendum est.

quod Natura ferat.

Felici voi, se a quel modo istruiti pienamente dell' Anatomia, e della Fisiologia, con una luminosa, e schietta Teorica lo studio della pratica intra- Pratica. prenderete; ella vi riuscirà meno difficile, e meno lunga, voi maggior onore ne trarrete, e la Patria maggior vantaggio. Allora vedrete i morbi in un certo fistema, non ne confonderete le cagioni, e gli effetti, ed infine come meglio li conoscerete, con maggior siducia, efficacia, e prestezza potrete curarli. Ma infelici voi, se da que' lumi di scienza tanto orgoglio traeste, come alcuna volta accade, onde disprezzaste lo studio della pratica, e delle operazioni, studio, che pur troppo sovente agli spiriti pasciuti, e gonfi delle vaghe maestose idee dell'altra scienza pare fastidioso, arido, e di poco vantaggio, perchè tutto già si crede compreso, costrutto, e terminato, onde audacemente si presume. Eh no la moltiplicità, e la varietà de casi è pressocchè infinita, bisogna dunque leggere quelli, che gli hanno osservati, e descritti, e come un Capitano farebbe giustamente accusato, e ripreso d'ignoranza, e di negligenza, sendosi lasciato vincere dal nemico con



uno stratagemma, che poteva anch'esso aver letto nelle Storie, parimenti un Cerusico, il quale alcun caso abbia mal condotto, che potea pur leggere, istruito com' egli era, per distinguerlo, e conoscerlo, seppure non variava, confuso rimarrà, ed avvilito, e questo studio egli è tanto più utile, quanto egli vero esfervi casi, pei quali la Teorica sola pienamente non fornisce. Ma questo studio degli Autori quanto mai è negletto, e disprezzato! Per lo più pochi libri de' moderni formano lo studio d'un Cerusico, molti anco si stimano ricchi, se hanno le poche, lacere, maculate carte, che hanno tratte dalle scuole. Eppure se penetriamo con iscrupolosa, disappassionata diligenza nella Storia della Chirurgia, sciocca, ed odiosa ci parrà la presunzione di coloro, che, non avendo mai letto gli Antichi, lo studio ne abborriscono, e ne condannano. Certamente sarebbe affurdo, ed ingiurioso pretendere, che i Moderni abbiano niente contribuito alla perfezione della Chirurgia; ma però niente più ci umilierebbe, e ci dimostrerebbe il merito degli Antichi, come una fincera storia della Chirurgia antica, e moderna. Holla io fatta questa storia, ed attonito rimasi, umile, e confuso, veggendo in non molte pagine tutto

raccolto il nuovo, il bello de' Moderni, per cui alcune Nazioni vanno fastose, ed oso dire col celebre BER-NARD, che i Moderni, perchè ebbero maggiori lumi dell'economia animale. hanno solamente ornate, poste in miglior luce, e rese più facili le invenzioni degli Antichi, ma poco, o nulla hanno aggiunto di nuovo, e di forprendente. Sia che gli oggetti di nostr' arte, cadendo sotto i sensi, quelli gli abbiano tosto pienamente veduti, o che poi, fattasi la divisione de Medici, e de' Cerusici, la maggior parte di questi sprovveduta di scienze sia caduta nell' ignoranza, e nell' Empirismo, certamente il piccol numero di buoni Scrittori di Chirurgia paragonato al grandistimo numero, che v'è in ogni altra arte, o scienza, è una prova evidentissima del poco profitto, che vi si è fatto: Nulladimeno, secondo alcuni, troppo ancora abbondano i libri; imperciocchè dicono essi, in Chirurgia vi sono molti metodi, che non si possono comunicare, ne' quali ciascuno debb' essere condotto dal proprio giudizio, e fagacità; que metodi non si trovano appresso alcun Autore, ch'essi hanno forse veduto, quindi condannano ogni lettura, come inutile, e principalmente quella degli Antichi, I quali certamente

non hanno scritto per gl'ignoranti, e fcemi d'ingegno, che orgogliosi, pertinaci, e disprezzanti non vogliono sentir configlio, o autorità. Eppure chiunque avrà fatto studio degli Antichi, ed avrà occasione, e sagacità d'osservare nell' esercizio la lor dottrina, dovrà confessare, ch'essi piuttosto si debbano leggere, sendo più esatti nella descrizione de segni patognomonici, più attenti, e più precisi nella distinzione principalmente delle varie specie di tumori, ed: ulceri; e se la nostra età ha abbandonati alcuni metodi superflui, o disadatti, questi neppure si possono provare essere di quella maestosa antichità, ma de' barbari secoli inferiori, quando le arti, e le scienze erano esse stesse, come le genti, barbare, ed incolte; nè anco possiamo trar gloria di alcune operazioni novellamente introdotte, se l'onta ci rimane d'averne molte altre abbandonate utili, e di gran perizia, non che di ragionevole coraggio. Infine s'egliè certo, che la luce, che rischiarisce la: nostr'arte, è il frutto d'infinite offervazioni, ed esperimenti, come mai un sol uomo colla sola propria esperienza potrà sperare di chiaramente vedervi ? Bisogna necessariamente raocogliere le osservazioni sparse nelle opere de nostri; Predeceffori, e de nostri contempora-

nei, senza il quale studio l'uomo del più grande ingegno rimarrà un Pratico presuntuoso, che i suoi limiti non conoscendo, o disprezzando, correrà temerariamente qualunque sorte. È veraentrando nell'esercizio dell'arte senza conoscimento degli esempi, e de' precenti degli Autori antichi, e moderni, con qual presunzione potrà sperare in breve vita di elevare egli solo un edificio, che costò tanti secoli di osservazione, e di studio, se anco ei non potrebbe vivere tant' anni, ed in un così ampio esercizio da poterne vedere la millesima parte? Le rislessioni, le combinazioni, che hanno affaticato tanti fublimi ingegni, si presenteranno sorse tutte schiette, e non confuse ad un uomo di corta vita, ed occupato da infiniti differenti oggetti? Quale farà dunque l'arte nostra, se l'intraprendiamo sprovveduti delle ricchezze di tanti Maestri, e Scrittori ? Sarà un abbozzo disprezzevole, insufficiente, che la vanità, l'opinione, la seduzione, e la politica sole potranno coprire col nome di abilità, e di sperienza, di riputazione, e di talento. Gli oggetti, che bisogna intimamente comprendere, per esserne sicuri in pratica, passano sotto gli occhi con una velocissima successione; l'uomo non avvertito o non li vede, o li travede ofcu-. .

oscuramente, e rimane incerto; le varietà non distingue, dubita, e si confonde, infine dirollo

## Artem experientia fecit, Exemplo monstrante viam.

Ma questo studio debb' essere continuato; e sono pur degni di riprensione quelli, che tosto esciti dalle scuolè, ed avanzati con qualche fortuna nella pratica, lo studio tralasciano de nuovi libri; che, se l'arte ogni giorno si perfeziona con nuove scoperte, nello spazio di pochi anni essi ignoreranno notissime agli scolari, le altrui scoperte, e fatiche faranno fatiche, che dovrebbero ancora intraprendere, e senza un nuovo studio la sor dottrina una volta pienissima parrà poi scarsa, ed insufficiente, e dovranno averne rossore. spaventa forse, Giovani amatissimi, vi stordisce l'ampiezza degli studi, che vi proposi assolutamente necessari per un' arte, che da molti limitatissima si crede, femplicemente meccanica, vile, ed abbietta? Eppure il più difficile, ed il più importante ancor vi rimane, cioè l'osfervazione de morbi fui viventi; a questa tutti quegli studi si debbono re, e se una certà perspicuità d'ingegno, e fottigliezza: di sentimento non Vi

vi affiste, quelli saranno per voi ricchezze sovente inutili, e forse anco perniciose, perchè alcuna volta, sedotti da una certa illusione di sentimento, e di ragione, caparbj rimarrete pertinacemente in vostra opinione, che forse sarà poi îmentita dalla Natura, o vi troverete soventi tra una vana speranza, ed un vano timore, ed in alcuni casi rideranno di voi quelli, che non no altro merito, che di aver avuto prima di voi occhi per vederli. Un Pittore, quantunque abbia studiata l'Anatomia per fapere; quali sieno le proporzioni, e la simmetria de' membri, pure, se vuole sulle tavole pingere figure esatte per certi caratteri, ed azioni, convien, ch' egli abbia davanti gli occhi la pura, semplice, schietta Natura, nè giova, ch' egli conosca uomini, animali, piante, architettura, ed arredi, se facilmente puote errare, quando sua mente non sia fissata, ed il suo pennello diretto dalla presenza degli oggetti. Così un Cerusico dee osservare i morbi sui viventi, dopo che ne avrà lette le storie sui libri, imperciocchè sui questi tutto è in ordine, ed in limite, evvi un certo, sistema di descrizione, che fa la gloria dello storico perspicace, sincero, ed esatto; ma nel furore, e nella perturbazione di alcuni morbi, che do

vrete trattare, certi fintomi faranno confusi, o meno appariscenti tra la moltitudine di molti altri, o non vi saranno sensibili, o neppure ne dubiterete, quantunque sieno i più degni di osservazione, o di rimedio; vi vuole dunque un certo costume di vederli, e di sentirli, altrimenti se non dopo molti infortuni si comprenderanno ne' loro modi, ed accidenti; ed oh quanto sono questi varj, confusi, incostanti, suggevoli, e precipitofi, se non si agguatano con occhio cerviero, e con una perspicacissima attenzione di mente, che mai così bene non si saranno capiti sui libri, come ce li mostrerà, e farà sentire la natura vivente, sendo principalmente per la confusa, oscurissima storia di alcuni morbi più che verissimo ciò, che disse Orazio delle azioni di Teatro:

Segnius irritant animos demissa per aurem.

Quam quae sunt oculis subjecta sidelibus, & quae Ipse sibi tradit spectator.

Anzi il fanno tutti i Pratici, che vi un certo fenso, per cui le malattie si distinguono, e meglio si conoscono nella varietà, ed incostanza de lor sintomi, ch'essi pure non possono spiegare, non che comunicare; questo si sente, e per le ripetute successive sensazioni quel modo

modo di sentire ne nasce, da cui procede un retto giudizio, al quale per lo più succede ne' casi ardui una giusta forprendente, ma necessaria determinazione, che alcune volte tanto onora i gran Maestri: imperciocchè per inesplicabile sensibilità gli effetti oscuri, equivoci, varj, incostanti al lor ordine. e valore si riducono, utilmente si colgono, si rischiarano, e con ragione, e fiducia vi si provvede, perchè avvertiti una volta vi stiamo attenti, apparecchiati a provvedervi : da' passati pericoli le vere indicazioni si traggono, che all' importante varietà s'accomodino, rimedi già tante volte provati nè troppa fiducia, nè troppo timore: ferme, coraggiole, magnanime saranno le nostre determinazioni, o irreprensibile il nostro abbandonamento: lungi saranno i fantasmi, e le illusioni, ed opereremo per ragione, e per sentimento, da molti ben giudicati esempli animati, o ritenuti. E quest' autorità dell' esempio è tanto necessaria, che i Giovani nell' esercizio dell'arte, se sono onesti, quando qualche caso arduo abbiano a gere, con somma sollecitudine, ed ansietà d'animo volgono tutti i libri, ne' storie di morbi sieno scritte per trovare quello, che ora debbono trattare, il quale o meno capiscono, o

ne dubitano, perchè per la prima volta il veggono. Quanto dunque è condannevole, e perniciosa la negligenza di que', che, usciti dalle scuole gonfi di scienza, e di dottrina, questo esercizio negligentemente, e quasi con sprezzo intraprendono? Della dell'efercizio pratico per le operazioni della mano crederei di abusare di vostra pazienza, se volessi fare parola. Ognuno per se può capirlo, ed è pur tempo, ch' io finisca .... Avete dunque sentito, Giovani amatissimi, quanto studio, quanta fatica, quanto ingegno, e sentimento vi voglia per riuscire in quest' arte? Se ne paventate l'alta impresa, io ancor più ne pavento, che pur debbo condurvi, e solo mi consola, che viviamo in una Città, ove i Maestri fono molti, ed eccellenti, che si può dire essere tante le scuole, quante le lor case, e gli Spedali, sicché da loro possiate imparare quel, che io forse non potrei insegnarvi. Ma pria di terminare debbo ancora avvertirvi colle parole del celebre nostro Botallo di quella generosità, onestà, ed ingenuità d'animo, per cui l'arte tanto si onora. Siate pure di tutte le parti dell'arte istruiti, impedimento iis sunt, dice egli, soporosa desidia, vel præceps audacia, vel Sordida avaritia, vel quæ ab hac prodeunt;

deunt, nempe vel nefaria, virulentaque Invidia, vel inanis, tumidaque gloria; ignaviam, artisque imperitiam fovet desidia, artis limites temnit præceps audacia, in pecuniam, non in patientium commoda irruit avaritia, per fas, & nefas invisum perdere invidentia vigilat, fucata, ac inutilia veris, atque utilibus præfert ventofa gloria, Qui fieri igitur potest, ut rede procedat ars, ubi artifex horum alicui se dederit? Ed io oso dire essere non meno necessaria l'onestà, che la perizia. Egli è vero, che intraprendete un' arte, il cui esercizio è fastidiosissimo, perpetuamente tra gli orrori de' morbi, e le querele de' malati, sovente infastiditi da importune, indiscrete questioni, tormentati nell'aspettazione, afflitti dalle disgrazie inaspettate, e mal giudicate dal volgo, con interminabile fatica correndo dietro ad una qualunque forte, che forse non verrà mai felice. Ma qual farebbe la vostra pretensione, se IPPOCRATE, il grande IPPOCRATE, a cui Serse Re della Persia aveva una volta proposti vasti tesori, e sommi onori, ebbe anch'egli ad esclamare negli ultimi suoi anni (\*): Ego sane quantumvis senex plus reprehensionis, quam honoris ex arte mihi consecutus videor; ma come

<sup>(\*)</sup> In Epist. HIRPOCR. DEMOCR. pag. 127, ed. Foesii;

scrisse Galeno: ne illud quidem præclarum est ex arte parare divitias, sed talem potius artem scire, quæ fracta navi simul cum Domino enatet. Consolatevi colla perfuasione di vostra coscienza, che vi afficuri d'aver fatto vostro dovere. Non fiate orgogliofi nella prospera fortuna, nemmeno paventate dell' avversa, ed ove nessuno interno sentimento vi riprenda, ricordatevi di ciò, che scrisse BACONE: Medicus, & fortasse Politicus vix habent adiones aliquas proprias, quibus specimen artis, & virtutis suæ liquido exhibeant, sed ab eventu præcipue honorem, aut dedecus reportant iniquissimo prorsus judicio; quotus enim quisque novit agroto mortuo, aut restituto, item Republica stante, aut labante, utrum sit res casus, an consilii? Fit itaque sæpissime, ut Impostor palmam, Virtus censuram referat; quin ea est hominum infirmitas, & credulitas, ut sæpe Agyrtam, aut Sagam docto Medico præponant. Siate studiosi, ingenui, e forti; non mancate alla volontà del CLEMEN-TISSIMO MONARCA, nè all'aspettazione della Patria con una negligenza degna di ogni riprensione, e castigo; e se alcuna speranza dovete avere, ponetela in questo Eccellentiffimo Magistrato, il quale, come dee proteggere i vostri studi, egualmente difendera il vostro merito. HE-



## HEPATIS

## DESCRIPTIO.

Ì.

Viscus, qued mole maximum, mox sub diaphragmatis fornice pendulum, dextrum abdominis hypocondrium occupat, ultra cartilaginem enliformean, per epigastrium, in lævum fere hypocondrium quoque productum, hepar, aut jecur vocant; in homine colorem rubrum, plus, aut minus obscurum habet (a); exterius magna ex parte convexum, interius aliquomodo concavum, variisque crenis, & soveis, tum etiam extantiis exasperatum, & inaequale observatur (b). Cl. Glissonius (c) totam hujus visseriis

(a) Verum, præterquam reliqua viscera, variat hujusce color in brutis; nonnullis enim est nigricans, aliis viridescens, slavum, cinnabarinum &c. Vid. Blas. Anat. Animal. Perrault Discours Anatomiq. de pluseurs animaux, ex Tom. primis Acad. Paris. Valent. Amphit. Zootom.

<sup>(</sup>b) Extantiarum, atque crenarum numerus, præfertim in brutis animantibus, multiplex magis, quam
in homine, occurrit. Continuum porro, & fine extantiis observabatur in Alce, in Rangisero ex Vol.

1. All. Med., & Phil. Hafniens...in Bubalo Perrault. op. cit. Elegantissima autem est Hepatis in
spyras convoluti sigura in cochlea operculari, seu
vinearum, hortensi, atque agresti, seu viar. vid.
Svyamerdammii Bibl. nat. Tom. II. Tab. IV. sig. Vl.,

sceris figuram hand inepte comparari posse, existimat, segmento obliquo albuminis ovi indurati, quod nempe fit per ellipfim excifum. Non femper tamen ad eumdem modum adamussim fa-Etum esse videtur; exterius enim eam partem. qua dextrum hypocondrium adimplet, seu majorem, vut vocant, lobum, in cujusdam quasi hemisphærii modum plurimum elatum habet, ac protuberantem, ejulque superficies, quando ad suspendens ligamentum ( S. 36. ), seu ad anticam partem pervenerit, in longe humiliorem, atque planiorem alterius partis, seu lobi minoris superficiem subsidet, atque deprimitur, ita ut major lobus natiformem protuberantiam costarum camerae accommodatam referat, alter vero vix extuberans planitiem fere habeat. Quod ad ejus ambitum, seu peripheriam, si a finistro hypocondrio, seu ab epigastrio, quando non omnino illuc protracta sit læva hujus visceris pars, incipiamus, lingula, seu tamquam elatiori ishmo cesophago ut plurimum adsito, vel-etiam cum superiore, anteriorique lienis ora aliquando connexo, diaphragmati propius protendi, non raro observatur, illiusque isthmi interius latus eo modo incurvum evadit, ut quae sequitur fere media hujus superio-

<sup>&</sup>amp; VII., Tab. VIII. fig. V., Tab. IX. fig. II. Longas appendices habet in Salamandra apud Vurfbainii Salamandrologiam, item Bianchi Praceptoris mei zestimatissimi fig. IV. Tab. VII. Hist. Hepat. At de reliquis jecoris differentiis inter hominem, & bruta vid. eruditissimi Fantoni elegantissimam Dissert. VI. zlum. edit. In hoc enim postremo opere Anatomico Zoo:omiam diligentissime pertractavit: quapropter in hisce rebus nos multum in posterum non immorabimur, misi Zootomica observatio nostris argumentis confirmationem addat.

<sup>(</sup>c) Anet, Hepat. cap. 10.

ris limbi pars, sensim minus elata, fere inde protensa, sed tamen glabra, & convexa videatur; hinc factus in hypocondrio dextro naziformis major lobus verticem pene elatiorem habet, propioremque diaphragmati: ab eo vero loco ad spurias costas, plus, minus inferius, puta ut plurimum ad eam partem, quæ umbilico respondeat, dextra jecoris pars producta limbum arcuatum habet, quem ex parabola factum diceres, ad memoratum isthmum ex nostra circumscriptione inde terminatum, ita ut si ab extrema ora natiformis lobi linea ducatur recta ad umbilicalem regionem, angulum magis, vel minus acutum cum hoc anteriori arcu. qui ut plurimum cartilagines spuriarum costarum excedit, præstet. Postremus hie limbus. præterquamquod ut plurimum ex omni parte non æque in sua convexitate ordinatus sit, duplici persæpe in loco plus, aut minus incisus, atque deficiens notatur, altero nempe, seu magis anteriori ob umbilicalem venam, cavam jecoris partem penetrantem, alteroque ob felteam vesiculam, suo, ut ajunt, fundo, visceris oram excedentem; quae ab umbilicali vena incifura fit, minor est, & magis longa, utraque porro aliquando abest.

I I.

Interiorem, seu simam jecoris saciem multiformem dicam; lobus enim dexter interius quoque plenus, atque pene extans est, in inseriore autem parte magis, magisque gracilescens,
duas soveas habet, quarum quæ magis posterior, renis dextri superiorem, exterioremque
arcum adcumbentem habet, alteraque magis anterior a cysti fellea occupatur, ibi quoque aliqua intestini coli ab ileo exsurgentis parte innixa. Sinister porro lobus, qua parte proximins ventriculi partem cooperit, aliquomodo

quoque excavatur, ut commodam ei aptet sedem; hos autem inter lobos interius alter protuberat, maxime minor, Spigelianus a Spigelio perperam dictus; nam præterquamquod in Euftachii Tab. X. Fig. 4. fistat, Vefalium quoque, Vidum Vidium, Sylvium, & Riolanum ita non latuit, ut scriptis, aut iconismis non indicaverint. Hic figuram, ut plurimum, habet prope quadrangularem, trigonam, aut aliam quamcumque multilateram, alteroque extremo, seu anteriori, quum trigonus est, bisidus non raro observatur, & in diversam longitudinem protractus: huic ex altero latere alia persæpe adjacet extuberans hepatica apophysis, quæ triangularem fere semper figuram habet. Ruffus Ephesius (a) ab Haruspicibus, quatuor interioribus hepatis extantiis Gladii, aut Cultri, Auriga, Foci, Mensa, vel Unguis nomina data fuisse scribit; verum, quum Haruspices brutorum jecinoribus, quæ ut plurimum multos in lobos discreta sunt, uterentur, si quis ex Gente Medica, ut Theophilus (b) scribit, haec nomina humani hepatis extantiis adtribuisset, nugas, figmentaque dedisse cum Vefalio (e) diceremus, idque eo magis, quo ob peculiares, sed commentitios, quos præstare usus credebant, haec nomina imposuisse constat. III.

In dimidia, finistraque parte lobus hepatis dexter fossa transversali dividitur, quæ in alterius lobi dextram partem continuatur, eamque loborum convexi parietes ita circumeminent,

, ut

<sup>(</sup>a) De corpor. human. part. appel. l. 1. c. 28. (b) De corpor. human. fabric. lib. 2. cap. 21.

<sup>(</sup>c) De corpor. human. fabr. c. 7. lib. 5. alteram nempe hujus visceris extantiam liquores exscindere, alteram devehere, coquere, adparare scribebant,

ut convallem ultra quatuor transversos digitos persape amplam claudere videantur: in eam porro soveam ex sinistro latere ad angulum pene rectum sissua pervenit, quam ab transcunte umbilicali vena imprimi dicebamus, eaque modo ab hepatis particula, tamquam ponte, magis, aut minus cooperitur, alias vero sulci adinstar aperta est, tum recta continuata videtur ad exterius minimi lobi, vulgo Spigeliani, latus, usque ad summam oram hepatis, in eaque ductus vernosus in socius in socius jacet.

IV.

Hosce sinus cum maxima transversa sovea quæ ut plurimum vario modo per latera, & fines dehiscit, hepatis portas dictos fuisse a Veteribus, non uno de nomine suspicamur. Græci enim pulas, Urbis, aut Domus aditum, Atrium, vel Convallium Fauces, Regionem, Coronam, Insulam, & Sinum identidem nominabant. Henricus autem Stephanus (a) pulas hepatos ( ex Gorr. sententia, imo ex Tullio lib. de Nat. Deor. ) universam simam hepatis partem significare interpretatur. Nos vero exemplo Geographorum, qui portas vocant vias angustas, quas alti circumstant colles, ut sunt Porta Caspia, Syria, Cilicia, Caucasia, aliaque plures, a nostra superius allata sententia de hepatis portis non recedimus. In dextro vero. superiorique hepatis recessu, in sima facie, magnum inter lobum, & Spigelianum fovea quoque apparet, quæ fere recta linea paullulum tamen dextrorsum descendit, eique cava vena pars diaphragma mox subeuntis adcumbit, modo per majorem, modo per minorem longitudinem, ut modo vix duos transversos digitos æquet;

<sup>(</sup>a) Thefaur, ling. Graca tom. 3. pag. m. 611,

equet, modo usque quatuor, & interdum etiam adeo levis est, ut potius quam fovea, jam deficientis foveæ vestigium videatur; neque prætereunda quoque est transversa sovea, in superiori parte inter utrosque lobos incisa, qua hepar vertebris, & cesophago subjectis accome modatur.

V.

Restat nunc demum, ut de jecoris figura illud ex parte fareamur, quod generatim Riolanus scripsit (a), hepatis nempe figuram plurimum variare, quemadmodum os, vultus, nasus variant, ut allatam etiam descriptionem pro-Polychti tegula non tradamus. De cattero non etiam tacere possumus, quod præter memoratas foveas, & finus aliæ persæpe occurrant, quæ aliquando satis profunda, & ubi oræ diducantur, extremi pollicis fere capaces funt, inter quas totus condi minimus digitus possit, easque foveas, & sinus, etsi quoad situm vagas, Malpighius tamen natura filias fortasse perpetuas vocat (b), elique in dilatationibus, compressionibusque hepat aliquomodo juvan nonnulli existimant; revera quot non habet lien, viscus dilatationibus adeo obnoxium (c)? Genninum hepatis fitum, aliifque cum partibus habitudinem modo non memoramus, namque de his aptius alibi, ubi de ejus tanica, & ligamentis. Methodo ergo finthetica hujusce visceris descriptio-

<sup>(</sup>a) Animadvers. in Laurentium cap. 19. lib. 6. (b) Exercit. de hepat. cap. 1.

<sup>(</sup>x) Riolan. Eticheria. Anat. lib. 2. edp. 26. Litutud. Eff. Anatomių. pag. 312. Du Verney Acad. Petrop. tom. 4., ex quorum observationibus opinionem suam de lienis usu sirmabat cl. Franciscus Caramelli amicus, heu! quondam meus carissimus; vid. ejus desenta an 1746. Bus.

ptionem prosecuturi transimus ad ex, quibus hepar componitur, vasa, & merito primum de vena portarum dicimus.

VI.

Summo studio, & improbo pene labore in accuratissimam hujus vasis descriptionem desudarunt egregii viri, & in arte periti Franciscus Glissonius (a), Marcellus Malpighius (b); & Kerkringius (c), nec omnia potuerunt omnes. Fregit hanc itaque glaciem doctissimus Bianchi cujus de hac re, plus quam lyncais oculis instituta, observationes ( ait admiratione percitus Cl. Albertus Nicolai Anatomicus Francofurti ad Moenum (d)) sedulam merentur attentionem. Statim nempt in oculos cadit, vel superficie tenus tantum intuensi, egregia hajus Viri icon ( 11. Tab. VIII. Hist. Hepat. 2. edit. ), que prototypo adamustim respondet (e), quaque inter omnes, quas hactenus videre licuie, accuracissima mihi videtur; nec quidem adhuc tantam elegantiam in Chefeldenniana, quæ laudatur hujus vasis icon, adnotare potuimus, ut Bianchiana, quod præfiscine dictum accipiatis, ullo pacto com-

(d) Diatrib. mechan. Anatom. da dirett. vasor. pag.

<sup>(</sup>a) Oper. cit.

<sup>(</sup>c) Spicileg. Anat. observ. 96, tab. 29.

<sup>(</sup>e) Exceptis iis, que Auctor in explicatione ipfe monet, & melioris folummodo distintionis gratia ita sissuatur. Id. ibid. vid. Hist. hep. tom. 2. pag. 1061. Verum si laudandæ quoque sunt Eustachii siguræ de vena portarum ventrali, quas habemus in tab. 27. fig. 2. 6 4., ubi præcipue elegantissima sunt utriusque mesenterii vasa, non ita quidem esse judicamus de vena portarum hepatica iconem, quæ est sig. 1. ejust. tab. De parte ventrali non est etiam contemnenda Vesal. icon ad cep. 5. lib. 3. eper. cit., & elegans præcipue est quod ad vasa superiora.

comparandam esse judicemus, tum præcipue cum hepaticas solum ramisicationes designet. Nos vero hanc venam descripturi cum præstantissimo Winslowio (a) in ventralem, & revera hepaticam dividimus.

### VII.

Ventralis majores ramos nanciscitur a splene, ventriculo, omento, pancreate, intestinis omnibus &c. A splenis nempe sulco rami venosi prodeunt, quì, postquam a proxima parte ventriculi ramusculos, vasa brevia dictos, exceperint, in unicum truncum evadunt (b), splenicam venam dictum, atque mox in serpentis modum aliquomodo inslexus per inseriorem, posterioremque pancreatis limbum transcurrit usque ad posteriorem duodeni partem (c), ubi in maximum vena portarum ramum eva-

(a) Expos. Anatomiq. trait. des veines §. 229., & alibi.

(c) Non raro in pancreatis substantiam per aliquod spatium hanc venam traductam observavimus, eaque non prodibat, prius quam ad ejus summum caput pervenisset; semper vero sulcus in eo pancreatis limbo observatur, per quem hæc vena transcurtit. Hinc in cadavere, cui splenica vena in skirroso pancreate erat intercepta, splen in mire ingentem molem excreverat, nec tamen skirrosam: vid. a Meckren, & Tubjii observationes &c.

<sup>(</sup>b) Rarissime ipsi trunco splenico majori vasa brevia adjunguntur, quemadmodum non satis bene designant plures Anatomicorum icones, numero autem sunt minus constanti, modo enim 2., aut 3., interdum plures observantur, & cum jam a ventriculo irrepterint, ramusculis intermediis anastomoses invicem persape ineunt, ubi varices non raro vidimus in lienosis, tum ipsis aliquando etiam nonnulli rami adjunguntur a succenturiatis, exiguis globulis, colore, atque structura parvos emulantibus lienes, qui in interiori lienis sacie circum ejusdem sulcum persape occurrunt.

dit, atque cum vena mesenterica superiore conjungitur: per hoc iter venosos pancreatis surculos excipit, atque a sinistro, majorique ventriculi arcu gastricam, vel gastro-epiploicam sinistram; nam hæc ab omento, quod a ventriculo pendet, ramulos quoque excipit, & descendens, inita cum gastrica dextra luculenta anastomosi, in splenicam non valde longe a duodeno aperitur, & quoque ex eadem serme parte, sed sinisterius venam ab omento ascendentem recipit, epiploicam sinistram dictam.

VIII.

A superiore autem ventriculi orificio ( cardia ) vena fat infignis per minorem, superioremque ventriculi arcum transcurrit usque ad pylorum, minoris omenti venulas per iter excipiens, acceptaque illic majori vena, desuper extremam ventriculi partem convolvitur, aperiturque etiam in splenicam venam, alias in mesentericam, aut truncum ipsum venæ portarum, atque præterea ab intestino colo transverse per ejus mesenterii aream colica vena dicta confluunt, quarum aliquæ cum alterutra, aut etiam utraque gastrica vena inita anastomosi, gastrocolica vocantur; quo tandem loco summum pancreatis caput duodeno adnectitur, cum splenica angulum magis, aut minus acutum facit adjecta major meseraica vena, in quam mox confluit a media intestini duodeni parte vena duodenalis dicta, & mox alia ab adcumbente illic intestini coli segmento, ideo colica, cui ex latere finistro alia subsequitur, in duos ramos divisa, quorum superior a ventriculo, & proximiore omenti parte ramos excipit, & gastrica, vel gastro-epiploica dextra vocatur, quæ memorata anastomosi gastrica sinistra adnectitur, & cum epiploica ejusdem lateris pluribus quoque anaftomofibus adjuncta, desuper omen-

tum elegantissimos meandros, & plexus, aut polygonas areas comparat, & hæc aliquando etiam in maximum venæ portarum truncum implantatur; ex dextro adhuc latere venam aliam colicam habet, tum a ventriculo, atque omento ramusculos excipientem, quos ideo gastroepiplo-colicos nominant, quibus etiam ab intestino caco cacalis ramusculus adjungitur, atque tandem a mesereo alii, atque alii prodeunt rami, qui ex ordine in mesentericam ex dextro latere jam incurvatam terminantur. Eorumque implexus femicirculares desuper mesenterium videri possunt apud Eustachium (a), & Bianchum (b), & desuper intestina divisiones summæ, & minimæ apud Ruyschium (b), & Albinum (d).

## IX.

A finistra tandem, & ima intestini recti parte meseraica alia parva, quam hæmorrhoidalem internam vocant, exsurgit, quæ primum circum internam podicis partem ramusculos advolvit, cum hamorrhoidali exuerna per anastomosim adjunctos (e), atque illic non solum vario modo

im-

<sup>(</sup>a) Fig. Tab. cit. (b) Fig. Tab. cit.

<sup>(</sup>c) Thefaur. Anat. 10. Tab. 3. (d) Opuscul. de vas. intestinor., & icon. (e) Vid. Saltzman. Differt. de vena portarum §. 26., ejusque Cognatus Albertus Nicolai op. cit. 1. c. Nos vero & adjunctam vidimus peculiaribus ramusculis, per latus, infernamque partem vesca urinanæ repentibus, cum vena a pene ad prostatam glandulam per superiorem arcum musculorum obturantium femoris producta. Imo, quum aliquando in finus Santorini, qui circum prostatam glandulam describuntur, inquireremus, inextricabilem quoque vena hamorrhoidalis utriusque cum iisdem sinubus plexum observabamus. A vesiculis quoque seminalibus in hamorrhoidalem internam venam ramusculi venosi. breves, at fat ampli accedunt.

implexi funt hi rami, verum etiam in folliculos inæquales hic, illic persæpe elevati, inde vero hæc vena finistro intestini recti lateri adcumbens, a quo in rhombos vasa implexa recipit, ad hypocondrium finistrum pervenit, ubi per finistram mesocoli alam ramum ab intestino colo obtinet, atque tandem per dextram ejusdem intestini partem unico trunco in mesentericam, aliquando in splenicam, alias in angulum, quem ex venx se se adjungendo przstant, aperitur, accepta etiam illic vena duodenali inferiore; quod vero præcipuum, cum vena, quam colicam nominabamus, cum gastroepiploica finistra, & proximiore epiploica anastomoses quoque init, atque magis inferne cum spermatica quoque ejustem lateris vena ramulos adjunxisse, aliquando vidimus, qui præcipue in homine nephritide denato elegantissime apparebant (a). Sthalius (b) quoque ab utero in mulieribus in hamorrhoidalem internam venam, proptereaque in portarum venam non paucos furculos deferri scripsit, quos tamen nondum videre potuimus, atque ita fæpe est, quando Theoretici Scriptores ad suæ Theoriæ ideam humani corporis fabricam fine anatome accommodant.

X.

Sub pancreatis capite ab adjunctis utrisque venis

(b) Differr. de vena portarum malorum porta, ubi quidem nullam observationem anatomicam adtulita

<sup>(</sup>a) Non femel in hominibus cacalem quamdam venam inferiorem, quæ subter laterali ejustem lateris intestinorum ligamento, quod a peritonæo est, in hypocondrium reptat, ramusculis retro slexis, aut etiam versus lumbarem regionem descendentibus, cum adscendente vena spermatica anastomosin iniisse elegantissimam observavi.

venis mesentericis, & splenica vena (a) unicum vas conficitur, quod non nihil oblique adscendendo, in memoratam hepatis foveam (III.) adpellit, hoc itinere quatuor transversos digitos ut plurimum æquans; quamproxime autem ad finum hepatis a latere externo, & inferiore venas, quæ a cystide sellea exsurgunt, excipit, cum jam in unicum truncum coaluerint, etsi aliquando & ad portas gemellæ perveniant; ab intestino etiam duodeno vena alia, duodenalis ideo dicta, ascendit ad maximum venæ portarum truncum, cui & alia adjungitur a pancreatis summa parte, eaque, quam parvum panoreas dicunt, per exteriorem ejusdem superficiem exorta. Quas autem interdum excipiat. ex tribus posterioribus paragraphis videre est (a). Quando vero ad majorem hepatis foveam

(a) Aliquando reperiuntur rami venarum a portæ trunco per hepar disseminati, qui ab extremo apice sinistra sibræ ( lobi ) ex hoc viscere egrediuntur, & per ligamentum, quo in illo latere hepar aliquando septo transverso jungitur, repentes, atque ipsi septo communicati descendunt per posteriora ad dorsum usque, ibique junguntur sub pancreo cum quibusdam alies venis ab eodem portarum trunco extra hepar obortis . . . Adde quod aliquando ab eadem

<sup>(</sup>a) De amplitudine venæ meseraicæ majoris, splenica disputant inter se Anatomici. Cl. Bianchi fig. cit. Tab. cit. splenicam minorem secit. Laudatus autem Nicolai 1. c. splenicam ordinario ampliorem deprehendisse, ac mesentericam, imo triplo, est ne nimium! eadem capaciorem existere scripsit, & consentientem pene habet Eustachium fig. cit. Nos vero ad unam, alteramve observationem rite habitis mensuris ex methodo Nichols, & Keill, mesentericam majorem reperiebamus; aliquando :: 327. : 316., alias folummodo :: 327. : 309. Interdum mesentericam etiam insigniter minorem observabamus, sed quid mirum, quod modo una, modo altera major sit, si modo in unam modo in alteram plures adfluunt rami? Vid. superior. §§.

pervenerit, ad angulum maxime obtusum, aut pene rectum in transversum truncum aptatur, seu sinditur in duos magnos ramos (a), trunco tamen minores, quorum sinister, minori ideo lobo propior, longior fere semper est, in alterius lobi substantiam altero mox penetrante. Sinum quamplures Anatomici ad hanc divisionem essinxerunt, qui tamen nullus est; namque nullo pacto illic hacc vena alveum majorem habet.

#### XI.

Quilibet horumce ramorum, cum fibi proprium visceris lobum penetraverit, in alios minores, quatuor, quinque primum dividitur, arque hinc in alios, atque alios adhuc minores, & minimos, per omnem visceris differentiam productos, adeoque multiplices, ut ex opti-

fibra extrema sinistri lateris egressi per ligamentum quodam intermedium in lienem deslinant, atque per ejus substantiam disseminantur, veluti saciunt illi, qui a vena caudicis per mesenterium dusti in eundem lienem inseruntur. Gabriel. Falloppius obser. Anat. ad Petr. Mannam contra Vesal. ex edit. Boerh., & Alb. Harum autem observat, primam aliquando contingere, experientia edocti sumus, imo aliquando, cum hujusmodi Falloppii venam primam ad dorsum inquireremus, illic per laterales quosdam ramusculos una cum vena axygos desuper emulgentes venas exoriente, anastomosi adjungi, satis bene observabamus. Not. sorro, quod sub peritonaeo repit. Alteram Falloppii observationem cum summa diligentia ex cadavetibus Humanis rumquam consirmare potuimus. Semel autem in Fele quidpiam hujusmodi videbatur.

(a) Id perpetuum observavimus. Quam ideo male Eustachius cit. Tab. figg. 1. 2., 6 4. hanc venam in tres ramos per jecoris substantiam dispersos, aut disperdendos delineat divisam? Non semel longiorem

ramum altero minorem observavimus.

optima hujusce visceris susi glutinis injectione particula nulla sit grano sabuli major, qua mieroscopio lustrata innumerabilibus vasculis obsita non appareat, quemadmodum ex Ruyschianis præparationibus vidisse asseverat Boerhaavius
Testis ingenuus, & side dignissimus, sed de
his plura ad sinem dissertationis.

XII.

In Foetu ab umbilico vena umbilicalis dicta. quæ a Placenta in utero exoritur, retrorfum ascendit, & propriam hepatis sissuram (S. 1., & 111.) subiens, in parte sinistra sinus vence portarum inde aperitur, cum eo finu aliquo modo inflexa, & angulum antrorfum fere obversum præstans. Cl. Heisterus, umbilicalems venam, quæ quidem fimplex, & uniformis ab ambilico ad Hepar fertur, in propria quoque Hepatis fissura ramos jecori dare nullos, contendit, & Verheyennum secus opinantem acriter redarguit, aliique eos, qui ramos venæ umbilicali ex ea etiam parte adscribunt, errasse quam maxime affeverant (a); verum, præter quam quod non contemnenda fint de hisce venæ umbilicalis ramusculis Spigelii (b), Casserii (c), Riolani (d), Arantii (e), Kobokeni (f), ex Veteribus testimonia, tum ex recentibus, quæ habemus ab Hardero (g), Cheseldenno (h), Le-

<sup>(</sup>a) Ephem. Nat. curiof. cent. v., & vi.

<sup>(</sup>b) Corp. human. Fabr. pag. 11. (c) Fig. 1. Tab. ad lib. v111. Spigelii.

<sup>(</sup>d) De Fætu p. 377. (e) De Fætu pag. 40.

<sup>(</sup>f) Secundum virulos Fig. 27. adde Euftachium Fig. 11. Tab. 10. & Fig. 1. Tab. 27.

<sup>(</sup>g) In Apiar. num. 8. (h) Anat. Corpor. Humani Tab. 24.

mery Filio (a), Monroo (b), & Hallero (\*), eos quisque apud nos videre potest Quid! Cl.

Trevv, qui eos ante venam portarum negavetat, citra ipsam negare non audet; at quis etiam non videt, illos potius, quam istos, in ejusdem iconibus repræsentari? (c) Resisenda quo-

(a) Acad. Parifical. an. 1739. (b) Societ. Edimburg. Tom. 4. pag. 82. ad explical scon. de Intestin. duoden.

(\*) Descript. Fat. bicipu. p. 8. Adde Euftach. Tab. 10.

Fig. 11. Edit. Rom.

(c) De Differentiis inter Hominem natum, & non natum, Fig. 22. 23. 29. 55. 56. 74., &c. Blasius in Anatom. Animal. pag. 112. ex Drelincurio vernam umbilicalem describit in simia foemina, surculos in peritonæum reco musculo substratum immittentem. Ego porro in Rana venam vidi a pelvis cavitate duplici ramusculo prodeuntem, quæ inde sumplex sub peritonæo per abdominis altitudinem progrederetur, donec per ligamentum Hepatis salcisorme ad Hepatis portas per loborum sissuras pertingeret, illicque non solum in simam jecoris saciem ramusculos exporrigebat, verum etiam ad proximum ven-

triculum, omentum, intestinum, &c.

Mense Augusti an. 1748. quum in Theatro Anaztomico Taurinensi Monstri Bicipitis, cui simplex, &communis erat insimus venter, publica Anatome institueretur, Hepar, quemadmodum, &creliquae partes, per spectatorum turbam circumferebatur; Illud autem erat sat ingens, sexque habebat lobos, atque vena umbilicalis ab umbilico simplex, priusquam in intimam visceris substantiam penetraret, in duos primum ramos dividebatur, hinc in plures alios minores, neque ex directo in portarum venam aperiebatur, sed in visceris substantiam, nullo tunc spectatur, sed in visceris substantiam, nullo tunc spectaturis sinvenit Riolanus de monstr. sat. Lutet. Ex Fœtu desormi Cl. Petit, Acad. Scient. an. 1726., venam tumbilicalem observavit, desuper convexam Hepatis

faciem, in venam cavam, dum diaphragama jam esset

quoque non est Cl. Ruyschii observatio de vena umbilicali in vitulo duplici, quarum altera multo tenuior porta propago non erat,
seu in venæ portarum, ut ajunt, sinum ex directo non committebatur, ast in dextra Hepatis parte ramulos plurimos ubique distribuerat,
qui cum cateris porta extremitatibus uniebantur
per anastomoses (a). Cæterum umbilicalis vena
in Foetu sat insignis est, ut cava venæ quasi
comparari possit, dum ab utrisque multum decedit

penetratura, apertam, & pene idem describit ex avibus Gualter. Needham Diss. Anat. de Fæt. format. cap. de vas. umbilicalib. Simplex erat vena umbilicalis in Fœtu Bicorporeo Mazzuchelli ad Vallisner. Epist. an. 1719., eaque ex media, interiorique Hepatis regione, unico, & recto trunco in venam cavam continuabatur, per hane semitam respondentis vena portarum ramos duplicans. In quodam monstroso Fœtu vena umbilicalis ex inguine sinistro in abdominis cavum ingrediebatur, hinc per latus ejusdem cavitatis dextrum desuper musculum Psoas progrediens, ad ultimam dorsi vertebram, per diaphragma in pectoris cavitatem progressa, in cavam descendentem venam aperiebatur (Littre Acad. Royal. 1709.). Per hunc ascensum umbilicalis vena Iliacas, Lumbares, Emulgentes, Renunculi, Diaphragmatis venas excipiebat.

Ex feptem vitulis, quos uno, eodemque die aperiebamus, in tribus vasa nonnuila omphalo-mesenterica tenuissima in venam ambilicalem retro umbilicum implantari, observabamus. Cæterum adnotandum proponimus, proprios vena umbilicalis ramusculos per Hepatis substantiam ita terminari, ut in acinosam penitus intromitti non videantar, repunt veluti interejusem substantia loculamenta, ejusque superficiem exornant, non admodum implexi, plane directi, non multum ramosi ecc. perpetuo autem visum maximum truncum hujusce vena in portarum venam continuari, in quo errant plures Anatomici.

(a) Observat. 7. cap. 4.

cedit vena portarum Hepar ingredientis amplitudo. Non nulli vena portarum, & umbilicalis amplitudinum rationes faciunt:: 400: 729., modo etiam:: 400: 900(a), & quidem laudatus Trevv utrisque eas adsignavit diametros, qua memoratis rationibus respondeant (b): præter hanc amplitudinem, qua insignis est umbilicalis vena, tunicarum quoque crassitie, præ reliquis Humani corporis venis, insignitam in Foetu reperimus.

ХШ.

Citra sinum venæ portarum, sere ex eadem venæ umbilicalis linea, aliquando extra eamdem, in sulco jecoris proprio (S. 111.) propius internum minimi lobi latus per extimam Hepatis carnem ductus in Foetu conspicuus est, quem canalem venosum vocant; ut plurimum non nihil oblique jacet, non nihil incurvus aliquando est, aperiturque in venam cavam, posteriori jecoris parti adnexam, quamproxime diaphragmati, ubi hujus rami ex jecore accedunt (c). Hic tubus in maxima ratione minor est vena umbilicali; ad eam enim se habet : : 196, vel 121:900. vel 729. Ad finum vero venæ portarum ratio persæpe est :: 121 : 400, atque Ridleyus (d) quartæ parti illius finus æqualem facit.

XIV.

(d) Observ. Anat. Prast. pag. 200.

<sup>(</sup>a) Consul Præstantissimi Anatomici Alberti Haller. not. ad sin. Tract. de concep. Tom. 4. Inst. Boerh. Edit. Taur.

<sup>(</sup>b) Passim in fig. 1. 2. 4., & 5. Tabb. op. cu.
(c) Canalem venosum proximioribus Hepaticis Apophysibus surculos impertiri non semel observavimus.
Duplicem invenerunt Kulmus, & Salumannus.

### XIV.

Nonnulli ad offium vena umbilicalis, ubi committitur cum finu, ut ajunt, vena portarum, & ad initium, finemque duitus venofi, valvulam adjectam esse scribunt (desunt enim per reliquas horumce ductuum partes, dum de vena umbilicali eam solum partem consideramus, quae ab umbilico desumitur). Vidimus quidem ex utroque ductu commissorum vasorum oras aliquomodo protrahi, valvulam vero non diceremus, vix rugam, & iis parum tribuit Trevv (a). Nato inde Foetu modo citius, modo magis sero utraque nune descripta vasa occluduntur, & serme exarescunt; Cl. autem Haller in adulto dustum venosum semel apertum vidit (b), quod omnino rarissimum non ita porro de vena.

Cum ramusculis, quantumvis minimis, venas portarum ramusculi alii, quamtumvis etiam minimi, & pene dicam numero infiniti, copulantur, & adcumbunt, quos Biliarios vocant, propterea quod bilem devehant, qua propter interius lutei coloris sint; hi ab Hepate egredientes, magis, magisque crassi, & ampliores evadunt, & numero minores, ita ut quando Hepatis portis proximi suerint, pene totidem evadant, ac vena portarum Hepatica adjuncti rami, quibus perpetuo adjacent, & illic magni-

(a) L. c., & in Commer. Norimberg.
(b) Omnium primus clauditur canalis venofus, imo dicam disparet omnino, ut neque vestigium in adultis videatur. Garengeotus vero tom. 1. Splanchn. Tab. 9. vena umbilicali omnino aqualem facit, vix minorem. Heister. 1. cit., aliique Anatomici tum in adultis, quod omnino falsum.

gnitudine calamo columbino, plus minus, acquantur, indeque extra Hepatis portas, primum in duos majores ramos, quorum dexter alius. alius finisterior, latus semper legunt vene portarum, tandemque in unicum trencum majorem evadunt, qui Hepaticus porus, seu ductus dicitur (a). In so postremorum horumce dustraim confluxu plures Anatomici transversam quamdam amplitudinem, quam finum nominarunt. descripserunt, que tamen tam saro repersur. ut ab ortu factam non esse cum Cl. Mongagnio existimaverim. Horumce dustinum interior facies villosa est, & fere reticularis, magis vero in majoribus ductibus, ut inferius describemus; primum enim, ut vesicula fellea describatur, operæ pretium esse videtur.

In propria itaque fovea lobi dextri (S. 1.) Sacculus membranaceus, figura pyriformis, residet, quem Veficulem, Folliculum, aut Cystim Felleam nominant; fundo sue non nihil angustiore Hepatis oram, quæ & illic hinatain aliquando incissonem habet, persape excedit. hinc in ampliorem ventrem evade, qui sensim fine sensu imminuitur, ut pyri conum, seu veficulæ cervicem comparet, illicque in gracilem meatum contrahitur, quem cyfticum ductum nominant; quum vero Hepatis crassities ab extrema ora verfus portas major sit, hinc est, quod vesiculæ fundus in erecto homine anterior sit, & leviter inserior, cervix vero posterior, & paullulum superior, seu ascendenti plano inclinato adjecta. Illic, ubi cervix in dustum evadit, in posteriore parte, seu ea, quæ

<sup>(</sup>c) Consul. Hist. Hep. Tab. 2. 4. 5., & 8.

ab Hepate libera est, finulum habet, quem Jasolinus (a), & Bauhinus (b), ante Ruyschium (e), & Heisterum (d), verbis, & iconibus exhibuerunt, qui vero, etsi sæpe adsit, perpetuus tamen non est.

#### XVII.

Membranam exteriorem habet vesicula Fellea ab Hepatis tunica, quæ porro deficit, ubi Hepati ipía adjacet, ejuíque interior cellulofa structura pinguedine persæpe farcta est, ad fundum præcipue, & collum; Intermediam autem tunicam habet texturæ sat firmæ, quam nerveam dicunt, cui exterius a cervice radiofi carnei pennicilli per longitudinem adponuntur, quorum vix ulli in obliquum producuntur, transversi vero nulli sunt, nulli circulares. Interior inde vesticulæ facies villosa est, atque reticulata, eamque nonnulli crustam villosam cum Piccolhomineo (e), appellant. Ruyschius ita inaqualem, & reticulatam vesicula faciem non inepte comparari posse, ait, cum superficie mellonis reticulati (f); dicerem potius cum quibusdam holosericis pannis ex altera parte villosis. & adinstar telæ Damascenæ ad angulares quascumque areas impressis; secundis porro curis, superstratum tenuium filorum reticulum esse sentie-

(a) De Poris Cholidocis cap. 5. (b) Theat. Anat. lib. 1. cap. 45., & Tab. 38. (c) Epist. Problem. Anatomica 5. Tab. 5.

<sup>(</sup>d) E. N. C. Cent. 6. observat, 28., atque etiam in Compendio Anatomico.

<sup>(</sup>e) Prælett. Anat. p. 130. (f) L. c. fig. 3., hunc reticulum etiam exhibent Bianchianæ figg. Tab. 5. fig. 1., 6 2., & quidem perbelle reticuli areas, quemadmodum villos laudata Ruyschii figura,

tiebam, utpote calami apice facile fepararetur, tenuium inde filorum humillimo musco areolas occupante.

XVIII.

Ductus a cystide productus exigui calami anserini amplitudinem, magis, vel minus, æquat, & cum superius memorato ductu Hepatico coit, qui mox a vesicula exsurgens, imo jam ipse folliculi collus, tamquam in plicam, aliquando re vera, duplicem adigitur, aut inflectitur eo modo, ut collo anserino inflexo a nonnullis comparetur (a); Quum primum ita inflexus fuerit cysticus ductus, hinc ad latus ductus Hepatici continuatur, eique ad parallelam ita ex latere adcumbit, ut cum ipso angulum ullum, tum in eo loco, in quo adjunguntur, præstare non videantur (b). Quando hic ductus, desuper maximum venæ portarum truncum descendendo, trium transversorum digitorum spatium compleverit, cum Hepadico duda tandem coit, seu potius in alterum ductum majorem Choledocum dictum continuatur, usque ad intestinum duodenum, per semitam ductum Hepaticum recipiens, tamquam fistulæ ex uno latere in obliquum excise adjectam alteram fistule oram. Cyfticus ductus Hepatico paullo minor est, & rite observatus angustior quoque videtur quo fini 🗎

<sup>(</sup>a) Cystis felleæ cervix prope portas quasi duplicata reflectitur. Fallop. l. c. vid. Maur. van Reverhass Tab. ad Differt. de circulo Bilis, itemque Garengeot Tab. to. Splanchnologia.

<sup>(</sup>b) Winslovy Trait. du Bas-ventre §. 103. Acutifimum hujusmodi concursus angulum jam observaverant Bauhinus op. cit. Vidus Vidius, Falloppium undique rescribens Tab. 64. Vid. Bianchi Progymnasma de jecoris, ejusque ligamentorum sabrica, usibusque §. 6., & 7.

fini propior. Ab his continuatus chotedocus duitus pone primum duodeni arcum descendit, subitque pancreatis posteriorem partem illi intestino adnexam, inseriturque posteriori faciei mediæ secundæ partis duodeni, ox, obliquo ductu ejus sunicas penetrando, in ejustem cavum aperitur (a).

(a) Osculo oblongo, superius arcuato, inferius acuto, adinitar dentiscalpri Winslow p. 533. Edit. Paris. in 1V., quam ut piurimum adinitar sessim oblonge ani corrugatam observavimus, dircumduciis Peyeri villis, qui porro ad aliquam distantiam rugosi producuntur, & sensim inde evanescunt, eosque frenula, aut ligamenta appellavit Santorinus observat. Anat. cap. 9. Sat bene expressam carunculam non vidimus, quam papillarem eminentiam vocat Blanchardus cap. 23. part. 2. Anat. Reformat., wit lanam quam-dam membranosam eminentiam Munits. Anat. Nov. p. 44. vel duas membranulas, utrinque ad orificii latus laxe propendentes, quas describit Vesalius I. 5. c. 8. Non-hulli vero scribunt, illic intimas intessini tunicas cor-. rugari, implicarique in modum valvula deorfim pendentis, & clitoridis praputium quodam modo referentis. Memoratas autem rugas adeo faris laxas, ut hance comparationem admitterent, vix in uno homine diffenteria denato vidimus. Jounnes Muralsus Epiff. 5. ad Peyerum, diroum hec orificium in Bove, plexus duos glandulosoc notavit longitudine pollicem enquantes, qui quidem minores in Homine occurrunt. Cum Cholecoco ductu aliquando etiam pancreaticus aperitur, unius vero osculum ab alterius osculo per dimidiam unciam diffitum vidit Brunnerus Exper. Nov. Pancreat., ad minorem distantiam alii, semper vero aliquam idem Brunerus, quod omnino falfum in Homine. Duttum cholidoeum droplicem in intestinum duodenum describit Falloppius l. c., eorum alterum in ventriculum Vefalius ex Pontificis reiremium Romige lib. 5.

cap. 8. pag. 436. Edit. Boerh., & Atbin.

Abraham Vizierus Differt. de Divertioule tilis amplitudinem quandam ee in loco, ubi hac vala in late
Emon divodenum aperiuntur, deforibit. Vid. Kulm.

Tab. Anat., nec quidem aliud esse videnur shus nevus in hac parre a Banhelino descriptus pag. 79. Anat.

Reformat, perpetuus Brunnero l. e., non perpetuus insi Vatero l. c., & solum in Ascite visus a Peyero Parer.

### XIX.

Villosæ, aut reticulatæ cystidis felleæ tunicæ, itemque ductuum Hepaticorum majorum, cystict ductus, & cholidoci, glandulæ subrotundæ, miliares substernuntur, quas in vesicula suilla, & ovilla post diutinos labores detexit Malpighius (a), in Homine inde Ruyschius (b), at admodum exiguas (c). Sparsæ hic, illic sunt, & solitariæ (d), itemque persæpe duriusculæ (e), atque

(a) De lien. cap. 6. Barthol. de Diaphragm. cap. 11. (b) Epift. eit. Tah. ex.

(c) In nimium turgente, & obstructa vesica lenticulares

vidit Santorinus 1. c.

(d) Majores ut plurimum observavimus ad cystidis cervicem; tum recordamur aliquando earum racemulos illic vidisse post longam macerationem. Fatemur tamen aliquando omnino desiderari, esti summa diligentia in bene præparata vesica tum microscopii ope perquirantur, aut etiam diu in aqua

contineatur vefica.

(e) Aliquando etiam molles, & pressioni codernes occurrunt, & forte hujusmodi vidit Vvinslovv, qui lacunas potius, quam glandulas vocat. Trait. du basventre §. 296. Vid. Bianch. Tab. 5. & 7. Skirrosas vidimus in aliquibus Bobus, quos per proxime elapsam pestem aperiebamus, imo earum racemum durum, & obstructione turgidum in quadam vacca invenimus, ob quem certe ita obstructione variatione collus, ur in cysticum dustum bilis dessuere non posser, hinc cystis bile maxime turgebat, istiusque sucus ad proximiores partes ultra nasurus ordiaem intensus, atque perfusus videbatur.

<sup>3.,</sup> atque mumquam a nobis bene perspectus; vidimus quidem aliquando Choledocum ductum versus inferiorem duodeni part m flexuosum, & per intestinitunicas ali aliquam longitudinem serpentem; Interdium vero hujusmodi ductum, quo propius ad intestinum accederet amplificari, & aliquomodo pelviformem evadere observabamus, in eamque pelvisormem cholidoci ductus amplitudinem pancreaticum apeniri constabat, in ipso autem intestino nihil hujusmodi.

atque non semel harumce glandularum oscula nudo vidimus oculo, detinendo in limpida aqua vesiculas, prius bene expurgatas a bilis suco.

XX.

In extrema parte cervicis vesicula specialen annulum membraneum, interius instar pylori circumquaque eminentem, tamquam sphinderem Glissonius, at quidem immerito describit musculosum, nam in plicam planam, & tenuisfimam evadit in exficcatis vesiculis, fine ullis bene conspicuis musculosis sibris, imo ille annulus ita humilis perfæpe est, ut pene nullus videatur, aut vix ruga sursum versa. Præter reticulum, vesiculæ reticulo pene similem, aut crassiorem, infignes quoque rugæ, seu valvulæ, vario modo productæ, & implexæ occurrunt in Hepatico ductu majori, itemque per aliquod spatium in choledoco, sed præcipue in cystico ductu. Hæ factæ sunt ab contracta, corrugataque mirabilem in modum interiore tunica, ex iisque plicis aliæ, plus minus, obliquæ sunt, transversæ nonnullæ, tum etiam alternis angulis ital invicem fecantur in cyflico præcipue dudu, ut in cochleæ modum implexæ aliquo modo appareant, numero, & perspicuitatis gradu, ut plurimum, variæ (a). Cl. Segerus eas rugas in cyftico ductu a ligamento proprio fieri describit (b), quod ex fibris, an carneis?

<sup>(</sup>a) Vid. Ruysch. 1. c. Heist. 1. c. Bianch. 11. cc. Malpighius vero easdem quoque recensuerat cap. de Hepate, itemque Caldesius ad cochleæ modum (accartociate) delineaverat sig. 10. Tab. 2. offervaz. Anatomiche interno alle Tartarughe pag. 40., quæ quidem ad naturæ normam mihi elegantissima videbatur.

<sup>(</sup>b) Dissert, de motu bilis cystica pag. 10.

vesiculæ collectum producatur per meatum cyflicum, & eum ea ratione contrahat, uti colon intestinum stringunt tria ejustem longitudinalia ligamenta, & idem pene etiam descripserat Riolanus (a). Noverant enim has valvulas, ex aliis Veteribus, præcipue Spigelius (b), & Bawhinus (c). Per ductum tandem cyflicum, itemque per Hepaticum, tum non nihil etiam in choledoco foraminula plurima observantur, quibus nullæ certe respondent glandulæ, atque omnino in fundo cœcæ videntur. Id quidem præmonstrante Caldesio loco citato. XXI.

Ab interioribus, aut majori proximis ductibus Hepaticis, vel etiam ab ipso ductu Hepatico, mox ab Hepate egrediente, canaliculi admo-· dum tenues prodeunt, qui per Hepatis substantiain àd vesiculam properant, in eamque aperiuntur eum ad modum, quo inferius dicemus. Hos ex Anatomiæ Proceribus Cl. Viri Vesalius

(d), Jasolinus (e), Bauhinus (f),

(f) Ibidem .

<sup>(</sup>a) Antropograph. pag. mihi 132. Collum habet ists folliculus, în quo dominantur fila longitudinalia propter attractionem fortem. Anat. vivor. liber, qui Galeno tribuitur .

De cætero flexiones duclus cyflici, quas superius memorabamus (§. 17.), tamquam nervosis, fibrosis, aut membranaceis quibuscumque aliis retinaculis præstari constat, utpote issdem dissectis, eas flexiones omnino aboleri videamus. Tum etiam iis dissectis nonnulla adhuc frenula observantur, quæ *dučiui cy*spico adnexa eumdem corrugant, quemadmodum a opriis imple xis frenulis ductus sperma deserens.

<sup>(</sup>b) Human corpor. Fabric. p. 278.

<sup>(</sup>c) Loco citato . (d) Icon. ad lib. cit., & cap. citat. 13.

<sup>(</sup>e) In figur. ad opufcul. cit.

lius (a), Bartholinus Thomas (b), aliique affabre deseripserunt, aut etiam iconibus illustrarunt. Hinc nescio quo fato, neglecti jacuere, donec Am-Relodamense Medicorum Collegium (c), Blasius (d), & Eruditorum Lipfiz Ananymus (e) eos experimentis, & observationibus vindicarunt. & extra dubium posuere; Hinc Ghssonius (f), Blanchardus (g), Bohnius (h), Molinetus (i), Munniks (k), Dyonisius (l), Caldesius (m), Verheyennus (n), Gheseldennus (o), Palfynus (p), Bidlos (q), Noguez (r), Theychmeyerus (s), Senacius (s), aliique plures, quos figillatim recensere nimis longum esset, eosdem suis in scriptis non prætermiserunt; Cl. inde Bianchi

<sup>(</sup>a) Cap. 13. lib. 8 sp. cit. Nihil porro habent hujulmodi Casserii icones, quæ tamen Spigelianas demonstrationes insequentur.

<sup>(</sup>b) Cap. 15. lib. 1. Anat. Reformat.

<sup>(</sup>c) Vid. Manget. Biblioth. Anst. t. t. (d) In Anat. Veslingii . (e) Vid. eorumd. acts an. 1682. pag. 20.

f) Op. cit.

<sup>)</sup> Op. cit. pag. 52. part. 2.

<sup>(</sup>g) Op. cit. pag. \2. p-... (h) Circul. Anat. Progym. 13. (i) Lib. 6. cap. 3. Differt. Anat. Patholog. (k) Op. cit. pag. \2. (k) Op. cit. pag. \2.

<sup>(</sup>m) Osserv. Anat. intorna le tartarughe.

<sup>(</sup>n) Tractat. 2. cap. 17. o) Anat. 14b. 18.

<sup>(</sup>p) Anat, tom. 1. cap. de hepate. (g) Tab. 38. Covvperus vero ad eamdem Tab. hos ductus negat; in Agnino autem jocinore ductus biliosos ab hepaticis in cysticum ductum productos obfervavit.

<sup>(</sup>r) Abreg. de l'Anat. p. 163. (s) In Anthropograph.

<sup>(</sup>t) Essais Physiq. sur l'Anat. d'Heister. Adverte porro ab hisce Anctoribus ex brutis animantibus præcipue hosce ductus describi, etsi in hominibus adesse non negent.

chi in Hist. Hepet. 2. edit. eostdem peculiari diligentia pertrastasse videtur: videamus jam ergo an re vera demonstrari possint.

XXH.

;

5

:

::

Ċ

Riolanus hoc habet experimentum. Intrusa fiscula, fint ejus ipsissima verba, in canalem biliarium hepaticum junta hepar ab infustate spiritu potius intestinum, quam vesicula distenditur, vicissimque cum per alterum hujus canalis extremum prope intestinum idem praetatur, pars opposita, & vesicula incumoscia, compressant vesicula, spiritus portio in hepar confinit gargelismum excitans; hime exiles fibrillas effe dixezat , per quas vesica suam traheret bilem (a) . Cl. Segeras impulsam in veticulam flatum, & per duodenum, & per ductus hepaticos effluxisse narrat, alii vero addunt aquam quoque; vel urinam, idemque Verheyennus evenire adfirmat, tum ligaso foreiter means cystice. Hæc autem qua ratione contingerent, nifi illis partibus patula interponerentut vafa? Atque unde cystica bilis in brutis animantibus, quorum cystis neque cum hepatico ductu, neque cum cho-Iedoco coit i Ita porro est in corvo, gallo, anate, tarda, nec. quidem, quemadmodum vipera, a ductu hepatico perpendiculariter descendentem cystim felleam habent. Quid autem? Eos vidit in tigride Blasius (b), in catopardo Du-Vernoy (c), in simia Parisini (d),

<sup>(</sup>a) Anthropograph. lib. 2. pag. 126., & pag. 12. Plura hujuscemodi experimenta vid. apud Caldesium op. cu. pag. 38. &c., quorum testem ut plurimum habet celeber. Franciscum Redi.

<sup>(</sup>b) Anat. Animal. tab. 19. passim in alijs animas, bus Valent. Amphit. Zoptom.

<sup>(</sup>c) Ast. Acad. Petrop. tom. 1. (d) Obsery, des Animaux discours.

lius (a), Bartholinus Thomas (b), alique affabre deferiplerunt, aut etiam iconibus illustrarunt. Hinc nescio quo fato, neglecti jacuere, donec Amstelodamenie Medicorum Collegium (c), Blasius (d), & Eruditorum Lipfiz Anonymus (c) eos experimentis, & observationibus vindicarunt, & extra dubium posuere; Hinc Gessonius (f). Blanchardus (g) , Bohnius (h) , Molinetus (i), Munniks (k), Dyonifius (l), Caldefius (m), Verheyennus (n), Gheseldennus (o), Palfynus (p), Bidloo (q), Noguez (r), Theychmeyous (s), Senacius (t), aliique plures, quos figillatim recensere nimis longum effet, eolden fuit in scriptis non prætermiserunt; Cl. inde Bias-



<sup>(</sup>a) Cap. 13. lib. 8 op. cit. Nihil poero habent hajulmodi Cafferit icones, quæ tamen Spigelieres de monstrationes insequentur.

Vid. Manget. Biblioth. Anat. t. t.

In Anat. Veslingii.

Vid. corumd. alla an. 1682. pag. 24. Op. cit.

Op. cit. pag. \$2. part. 2. Circul. Anat. Propyra. 13.

Lib. 6. cap. 3. Differt. Anat. Patholog.

Op. cit. pag. 52

Demonstr. Anas. 3. par mini ast. Offere. Anas. enterne le autorigie.

chi in High rigge and diligentia pertradiale was a series and the Rightness hoc large and the series are series and the series are series and the series are series and the

Riolanus noc met fiscale, funt eus males biliarium tepaticum constitue a constitue (pirite pacies unissues ditus , vici fimque une per extremum prope until opposite, & sessessite vesicule, spiritus portes in lane lifaun excitors, tere ene rat, per ques refies feux minus me Cl. Seguras ampillam in visiting per duodenum, & per miles xiffe narrae, alir vern animur vel winam, idenque Fintagement and firme, ram ligum fortier name and autem qua ratione dominiperent. tibus patula interponerentur ----cyfica bills in bruta managar this negree care legacion with ledoco cost è les passo est es survey, suiteanate, tada, est come pera, a della legacia segmenta tem? Eos tide is to a line and the line and topardo Da-Versey (4) = == 2 -

-

in urso Trev (a), in bove porto plutes (b), Cl. autem Malpighius (c) viam regiam vocaverat .

(a) Commerc. Liter. Norimberg. an. 1934. (b) Vid. Fol. inscriptum la Menghina Gobba. Celeber. Fantonus, cujus auctoritatem plurimum valere credimus, eos admittit in homine Diff. 6. ed. ult. pag. 249. Ductum cysticum nulla communicatione cum hepatico per peculiarem aperturam in duodenum insertum viderunt ex testudine Parificuses . Moulinus in Hift. Anat. elaphanti an. 1681.. In fine " primi intestini . . . investigavit ductum communem ad jecur ad videndam vesiculam felleam. Sed , illam defuiffe scribit: ejus loco invenit, porum " billarium exire a jecore veluti ductum hepaticum; " notavit etiam, quod bilis illic reperta differret co-, lore, & consistentia ab ea, quam invenerat in " ductu heparico.

Hanc Moulini observationem in gratiam dustuum hepati-cyflicorum nonnulli accommodandam offerunt. at Georgius Christophorus Petrus ab Hartenfelk in Elephantographia curiosa vesiculam felleam non omnino defiderari in hujulmodi animantibus afleverat: An Moulinus non satis diligens, & industrius fuit, ut exiguam pro tanto animante veficulam, atque etiam in hepate immersam ab eo dustu, forsan ey-stico, ulterius prosequeretur. Id quidem indicat ab eo repertæ bilis discrimen. Galenus felleam vesiculam in elephanto a se Romæ dissecto observavit.

Inter lobos in aliquibus animantibus vesicula fellea reconditur; omnino autem deesse in alce scribunt Parisienses, & Londinenses, quod confirma-tur a Joanne Friderico Leopold. Lubecensi in De-Script. Anat. alcis Basil. an. 1700., in cerva Volckamerus, Ephem. N. C. An. 6. Parifiens. in cervo Canadensi, & cerva e Sardinia, In Tajacu, seu Apro Mexicano Moschisero Eduard. Tyson. transat. philosoph. num. 153., atque in Struthione Paristens. At in horum animantium aliquo proximius ad hepatis portas majores hepaticos ductus maxime distentos, inquam, varicosos, invenerum, bile isic restitante, atque turgente, quod quidem, uti vesiculæ selleæ necessitatem demonstrare videtur, ita & dustuum kepaei-cysticorum; at in ratiocinationibus, atque commentis immorari nolumus.

(c) De hepat. structura cap. 7.

verat, qua bills ab hepate in felleam vesiculam per eos certe ductus deveheretur, ejusque verba hic describam: Pennatorum vesicula fellea altero capite exortum trahit a cavo hepatis, a quo bilem recipit, altera autem extremitate oblongum collum promit; quod in duodenum inferitur, atque in iisdem pennatis biliarius porus ab hepate exortus, nullo habito immediato cum cysti fellea commercio, ad intestina excurrit us plurimum supra colli cystis insertionem. Adsunt itaque in brutis, & eumdem usum in homine præstante vesica aberunt? Prosecto credat Judæus Apella, non ego.

: Quos ipse vidi hujusmodi ductus, non semel autem vidi, fimplices ab alterutris hepaticis du-Aibus prodibant, quemadmodum superius dicebamus; hinc in aliquos minores ramusculos, quorum constans non est numerus, sæpius duos, - aut tres divisi. & versus vesiculam oblique incedentes, qua parte hæc jecori adjecta est, in eam obliquo quoque tramite aperiebantur (a), quam proxime ad ejus cervicem, setamque, aut tenue æneum filum vix admittebant, eorumque osculis neque extantem membraneum circulum, neque valvulam vidisse dicam, in partibus enim adeo exiguis perlustrandis non satis lincæus fui. Addam vero peculiarem obfervationem, quæ an ad horumce ductuum negotium facere possit, vobis dijudicandum relinquam . In Nosocomio Divi Joannis Puella ob diutinam dyssenteriam moriebatur, atque in

eorum

ejus cadavere invenimus hepar pergrande, & ultra naturæ ordinem in plures lohos divifum.

<sup>(</sup>a) Amstelodamenses in bove ad modum uretherum hujusmodi ductus aperiri scribunt.

corum autem sima facies plurimis obsidebantur vesiculis acinosis, & lutea materia, inquam, bile farctis, quarum quæque duos habebat ductus, ingerentem unum, & ab hepatis penitiore substantia productum, externum alterum, & egerentem; iique postremi, etsi pro vesicularum numero plures essent, ad senarium inde numerum, hincque ad unicum ductum calami amplitudinem excedentem redacti fuerant, hicque cum hepatico ductu, qui ex naturæ ordine erat, non uniebatur, priusquam ab intestino duodeno vix per decem lineas distaret (a). Defiderebatur porro vesicula fellea. Vestrum modo ferte judicium: Zambeccarii observatio de perfusa bile desuper intestinum canis, cui coaluerat hepar, a quo folliculus felleus fuerat dilaceratus, profecto nullius est momenti, si experimentis constat per hepatis ligamenta sub proxima diaphragmatis parte circum venam cavam jecori proximam, & vesicam selleam biliosos ductus produci, atque serpere, quemadmodum contendit Cl. Ferrein (b).

XXIV.

C1. Gusmanus Galeatius (c) cysti-hepaticos ductus observavisse narrat, qui a glandulis cyfsicis (XVIII.) enati in hepar bilem devenunt; verum, etsi a glandulis meatus auditorii liquor habeatur ad bilis naturam accedens, a glandulis tamen cystis selleæ mucum ex albo subsuscum nullo pacto biliosum secerni, certo certius scimus. Cæterum nostros superius descriptos ductus ab hepate in vesiculam ingeren-

<sup>(</sup>a) Pene eamdem observationem habet Senac. loc. vii. Sed qualibet vesicula proprio canaliculo in intestinum aperiebatur.

<sup>(</sup>b) Acad. Royal. des Scienc. anno 1733. (c) Acad. Bonon. com. 2. part. altera pag. 336.

tes esse judicamus, ideoque hepati-cyflicos vo-

### XXV.

Postremis hisce annis Cl. Lieutaud. (a) hos ductus refellere nitebatur, propterea quod obfervaverat inanem vesicam felleam in quodam cadavere, cui in vesiculæ cervice calculus inerat, verum præterguamquod calculus in eo loco consitus esset, in quo ductus hepati-cystici ex nostris observationibus aperiuntur, unde eorum oscula obstruerentur, præter id, inquam, quot vesiculæ sine hoc impedimento prorsus inanes in cadaveribus quandoque occurrunt? Atque, quo majore jure pro nostra sententia observationem Blassi de solliculo selleo, copiosissima bile ita distento, ut per tunicas exsudaret, cujus tamen cysticus ductus coaluerat (b), insumere liceret? Atque, si admitti potest obfervatio Cl. Tacconi (c), ab unico parvæ olivæ nucleo tota facile occupari poterat, & erat calculis obstructa vesicula fellea, hepati-cysticis ductibus sat conspicuis nihilominus pertusa.

XXVI.

Tandem, ne plures de hac re adeo certa paginas impleamus, Cl. Verheyennus (d), illum & natura, & veritatis derisorem existimat, qui de viis (seu ductibus), per quas belis ad vessiculam est translata, adhuc disputat, dubitat-

que:

(b) Miscel. Anat. pag. 397., at fucus folliculi bilis, quo proxima coli intestini pars tingitur, perpetuus est. Vid. Stuart. in transast. philosoph. num. 414.

<sup>(</sup>a) Esfais Anatomiq. cap. de hepat.

tuus est. Vid. Stuart. in transatt. philosoph. num. 414.
(c) Vid. ejusdem Epistol. ad Cl. Bianchum script.
an. 1720. Histor. hepat. tom. 2. pag. 962., itemque ejus observationes de raris quibusdam hepatis, aliorumque viscerum affectibus pag. 21. 22. Acerrima Jani Planci censura parum tribuo.

<sup>(</sup>d) Loco cuat.

que: quatuor enim hujusmodi ductus, occasione. lectionum publicarum, Auditoribus, Spectatoribusque demonstrasse addit, distinctis orificiis in vesiculam hiantes, atque per illos ligato meatu cystico flatum immisit in eamdem vesiculam. Nos vero tanto convisio non est, cur eos. qui hos ductus negant, si quippiam tamen adhuc funt, irrideamus; nam postquam, Garengeotio teste (a), Verdierum hos ductus cera repletos Parisiiis demonstrasse scimus, accedente VVinslovvii auctoritate, quod in homine revera præsto sint, quempiam amplius futurum non esse credimus, qui de hac re tantis testimoniis fidem denegare velit; alioquin, si quisque experiens Anatomicus ad observationes diligentissimas accedat, æqua ratio erit, ut suismet fenfibus credat.

Qui nisi sint veri, ratio quoque falsa sit omnis.

# XXVII.

A dextro latere arteriæ caliacæ arteria prodit, calami scriptorii amplitudinem non omnino æquans, quæ ad hepar inde progrediens hepatica vocatur. Hæc non valde longe ab exortus loco, retro ventriculum, arteriolas persæpe duas emittit, quarum prima, quæ major, dextræ ventriculi parti adtensa, gastrica vocatur dexera, astera vero minor, & nonnihil insetior pylorica, propterea quod pylorum, & ventriculi

<sup>(</sup>a) Splanchn. tom. 1. p. 296. "Attamen Verdierus ipse, in Epitome Anatomica iterum a se edita minime declaravit ejusmodi tubulos per injectionem, aut, alio quolibet artificio a se detectos, & publice, demonstratos suisse "(adnotat perspicacissimus Fantonus p. 251. op. cit.). At præter Garengeotium alii prostant testes oculati.

triculi partem pyloro proximam ambiat, ex eaque ramus aliquando producitur ad intestinum duodenum, quem ideo duodenalem nominant; truncus ideo caliaca hepaticus, hisce propaginibus emissis, magis, magisque ad hepatis por tas progrediens, venæ portarum maximo tamo adsociatur, eique ante sinistram partem adcumbit, in duos ut plurimum illic ramos partita, qui sæpe sæpius crassinie dispares sunt, majorque majori hepatis lobo, retro biliaria vafa, prospicit, minori alter minor, Uterque vero, priulquam hepatis substantiam per maximam ejus foveam penetret, in alios ramos, puta tres, quatuor, & ultra, dividitur, qui invicem intersecantur vario, & inconstanti modo, & ab inforum alterutro, dum extra hepar adhuc sunt, ramus emittitur, qui mox bisidus gemella arteria cystica vocatur, propterea quod duabus arteriolis utrumque latus vesiculæ, qua parte hepati adfigitur, percurrat; hæque tantos vesiculæ ramusculos largiuntur, ut aciculæ cuspis extra ipsos applicari non possit, tum etiam pennicillos aliquos proximæ hepatis parti, quæ quidem pene totidem vesiculæ restituit, contribuunt, ut videre est apud Ruyschium (a). Has arteriolas anatomicorum nonnulli duplici quidem principio progigni scripserant, quod tamen adeo rarum est, quam quod rarissimum. XXVII.

Memorati arteriæ hepaticæ rami, quando hepar penetraverint, mirum est, in quot ramos, atque ramusculos indefinite multos, & minimos dividantur, qui singulas, & omnes venæ portarum divisiones ad quælibet visceris puncta insequuntur. Ruyschius in Thesauro Anatomico

1114

<sup>(</sup>a) Loc. cit. fig. 4., & 5.

maximo eum habet hujus arteriæ archetypum ceracea injectione paratum, ut ex hac folum arteria hepar effictum videatur (a): arteriolarum harumce quamplures surculi ab ipsa jecinoris substantia emergunt, qui inde subter ejus tunicam, perque ejus etiam ligamenta pulposas suas extremitates protrahunt, imo etiam fuper tunicam eosdem ramusculos continuatos observavit Cl. Loquet (b); itemque ab exterioribus ramis hujusce arteriæ ramusculi prodeunt, qui, nullo pacto penetrata hepatis substantia, ad ejus tunicam protenduntur, in sima jecoris facie, ad glandulas illic adfitas. tum etiam ad lateralia ligamenta, & usque per totam umbilicalis venæ longitudinem, latumque ligamentum (c).

XXIX.

Ab arteriis quoque diaphragmaticis ramusculos describit Ruyschius ad hepar productos, quos aliqui per latum etiam ligamentum usque ad umbilicum repentes vidisse asseverant, imo & subclaviarum soboles nonnulli viderunt, quæ, per latus pectoris dextrum ad diaphragma protractæ, per ejus inde foramen in convexam hepatis regionem expanderentur. Viderunt alii etiam a vasis renis succenturiati dextri ramusculos ad hepar pervenisse, imo etiam a messenterica superiore ramum sat insignem, qui restro duodenum intessinum ad portarum hepaticam venam primum, hinc in hepatis substantiam progrederetur. Nos vero ex pluribus cadave-

<sup>(</sup>a) Ultimos ramos in pulposas maculas in stella modum ramulos spargentes habet idem Ruysch. Th. 9. 59. T. 4. fig. 1. &cc.

<sup>(</sup>b) Disput. de arteria hepatica, Ruysch. fig. 5. tak.
3., Thesaur. 10. tab. 6. Epist. problem. 5.
(c) Vid. Bianch. tab. 2., & 8.

daveribus aliquando vidimus arteriam calia; cam in gastricas, & splenicam omnino infumptam, exiguo solum, vel etiam nullo ramo ad hepar emisso, proveniente inde alio sat insigni ramo ad hepar ab ipsamet aorta intercaliacam, & mesentericam arteriam superiorem. An hujusmodi erat duplex hepatica arteria a Cl. Fantono sapius reperta (a)?

۲.

Ξ.

ت

:.

11. 11.

12

3

3

3

è

î

XXX.

Vena cava, quæ primum per lumborum vertebras recta adscendit, ab eo fere loco, ubi venas a renibus excipit, emulgentes dictas, in dextrum latus deflectere incipit, in idque magis, magisque, donec hepar per propriam soveam, quæ in ejus superiore, & posteriore parte est insculpta ( IV. ), attingat, eigue adfigatur, inclinare sic, ut non minus priorem fuam directionem, quam magnæ arteriæ primum quamproximæ, deserat, mox inde per dexteram partem tendinei centri diaphragmatis in pectoris cavitatem penetratura (b) pene ad libellam summæ, mediæque partis jecoris. Ex ea autem parte, qua vena cava memoratæ foyeæ adjacet, alios, atque alios ramos fat infignes ab hepate recipit, quos venas hepaticas egredientes vocant. Ab omni nempe jecoris puncto, ad quod venæ portarum, & arteriæ hen patica (c) quilibet rami pertingunt, ramusculi

exo-

مستجهان والمتحدث

(b) Vid. Eustach. tab. 25., Casser. tab. 3. ad lib. 5.

<sup>(</sup>a) In Differe. 2. editionis.

Spigel.

(c) Segerus arteriæ hepaticæ aliquos ramusculos in portarum venam absumi scribit op. cis. Ravius inseriores egredientium hepaticarum venarum ramos arteriæ hepaticæ adtribuit, superiores vero venæ portarum, hujusmodi autem discrimina nondum videre potuimus. Vid. Ravii Splanchnologiam, quæ prostat amquam appendix ad som. 2. Amphieheasri Zvotomick Valentini.

exoriuntur venosi, qui sensim per adfluentes alios ramusculos majores facti, numero majori, vel minori, puta tres, quatuor, quinque &c. in illam cavæ venæ partem alii post alios tandem aperiuntur, ideoque magis, minusve adscendentes, superioribus pene ad eam illius venæ partem, quæ in pectoris cavitatem jam jam penetrat adsitis, imo interdum etiam observatum suit, horum aliquos in cavam non aperiri, priusquam & ipsi quoque nerveum diaphragmatis centrum perforaverint.

### XXXI.

Ab utraque vero hepatis facie aliæ præterea hepatis venæ perfæpe occurrunt, quarum aliæ venæ azygos, diaphragmaticarum aliæ soboles funt, at quemadmodum primum memoratæ venæ ab interiore hepatis substantia prodeunt has solummodo hepatis tunicæ subrepentes vidimus. Caldesius ( op. cit. pag. 35. ) omnes hepaticas egredientes venas per extimam jecoris superficiem in testudine serpere scribit, atque alibi ( pag. 64. ) venæ cavæ ramum describit in eodem animali, qui ex jecore surgens ad dextrum pulmonis lobum, itemque ad renes properat duobus ut plurimum ramufculis. Ad oscula venarum hepaticarum egredientium, qua parte in cavam aperiuntur, Fabricius ab Aqua pendente (a), aliique valvulas descripserunt, quæ tamen nullæ sunt, nisi valvulam nominare velimus alterutrum magis productum venæ oblique perfæpe terminantis parietem, extantem arcum pene effingentem (b).

XXXI,

<sup>(</sup>a) De valvul. venar. tab. 3. Sylvius Isagog. Anas. lib. 1.

<sup>(</sup>b) Dollifs. Boerhav. Instit. vol. 2. Edit. Taur. pag. 241. Pelliculam peculiaris ingenii vere valvulam sive libellum membraneum versatile describit, quod siub dia-

### XXXI. \*

Ab ea parte sinistri nervi vagi, quæ mox sub diaphragmate assophago anterior est, per minus omentum in superiore parte, qua id jecoris

phragmate ita contra hepaticas egredientes venas ad-arum fit, ut ab adfcendente per cavam venam fanguine ad earum oscula applicetur, ne in hepar hic irruat. Quis autem hanc valvulam vidit? Non quidem VVinslovvius ab ipso perperam citatus, quemadmodum bene animadvertit eruditissimus Haller ibid. not. cit., at error profecto est ab Eustachii valvula usque illuc aliquando pendente, nec quidem valvuke Eustachiana adeo producta libelli membranei nomen facile concederemus; nam hæc valvula ex paucis etiam cadaveribus amplitudine varia, aut etiam nulla (vid. Cl. Morgagni Epist. 15. ad scripta Valsalva), tunc solum satis producitur in cavam adscendentem venam, quando libero suo anteriori limbo, vel in universum reticulata occurrit, neque tunc etiam usque ad hepaticas egredientes venas, nisi hæ supræ diaphragma in cavam aperiantur, quod semel vidimus in homine quidem octuagenario; si porro plena sit, utroque cornu suo ex lateribus auriculæ cordis dextræ, & venæ cavæ adfirmara, nulla vi usque illuc adigi potest. Hepatis autem œconomiæ hujusmodi valvulam inservire scribunt Parisienses ex castore. Sub vena, inquam, coronaria valvulam mirabilem distam invenerunt, que integrum vene cave truncum occupabat, & sic disposita erat, ut sanguis facile ab hepate in cor per venam cavam transire, ast nequaquam a corde in hepar per eamdem venam, obstante hac valvula, restuere potest. Ex iisdem Valent. amphitheatr. Zootom. part. 1. pag. 172. Nihil porro hujusmodi asserit, qui de castore scribit tom. 3. part. 1. Mém. de l'Acad. Royal. des scienc. ab an. 1666. ad 1699., & Cl. Sarazin an. 1704. ejusdem Acad. pag. 59. Mémoir., Valvulæ Eufachianæ facculum in eo venæ loco cum tribus sigmoideis valvulis substituit, quem sacculum cum simplici, carneaque valvula fere omnibus avibus alii attribuunt, vid. ex ea, quæ Ottis dicitur p. 109. tom. 3. part. 2., ex gallo Indico p. 231. tom. 3. part. 1., ex parafita Numidiæ pag. 13. tom. 3. ejufd. Acad. ab an. 1666. ad 1699.

coris simæ faciei adnectitur, ramuli nervei sat multi ad hepar protenduntur, quorum magna pars per fossam ductus venosi versus portas progrediens, in visceris substantiam penitus continuatur (a), sparsis vero etiam, ex superiore hepatis parte, nonnullis ramulis non multis divisionibus convexam ejus faciem perreptantibus. quibus non semel additos observavimus, præcipue ex dextera parte, aliquos proximorum inzercostalium nervorum ramusculos, qui diaphragmatis carnem, & aponeurosim jecori superiorem alicubi perforaverant; ex dextro autem, seu posteriori, nervo vago nervei ramusculi ad hepar provenientes cum arteria hepatica sinum porsarum, & dextram hepatis sedem adeunt. pluribus in implexum hepaticum insumtis ramis. cæterisque in hepatis carnem penetrantibus. XXXII.

Ille vero nervus, ab intercostali in dextre latere exortus, quem VViltisius (b) mesentericum nominat, quum alios post alios inde etiam ab eodem intercostali ramusculos per descensium acceperit, ob quos cum ventriculo, pancreate, liene, ex intestino duodeno commercium aliquod hepar obtinet, in plexum evadit, quem gangliosormem describit Vieusennus (c), ad quem a memoratis visceribus, varisque corum plexibus, ex gangliis alii accedent, quum superius memorati ad eadem accesserint. Ex eo, inquam, maximo plexu gangliosormi hepatica superius memorati ad eadem accesserios describitados de construcciones de construccio

<sup>(</sup>a) Hos nervos aliquando oriri vidimus ex peçuliari ganglio illic adfito, ubi a cæliaca arteria priores rami ad ventriculum abfeedunt, pene ad lans illius arteriolæ, quam describir Cl. Huller in descrips, diaphragm. 1. edit.

<sup>(</sup>b) Cerebr. Anat., & nervor. defcrips. cap. 25. (c) Passim in tab. neurograph.

Mbræ primum nonnulkæ nerveæ ad vesiculam felleam producuntur, aliæque per hepatis extantias demittuntur, reliquis inde circum vasa ab hepate egredientia, vel in idem viscus ingredientia inextricabili, arctissimoque implexu adjectis, quæ inde profundius in hepatis portis, cum antea expositis nervorum conjugationibus conjuncta, fasciculos adaugent, iterum vasa hepatica biliaria, & sanguinea, per sinum ipsum hepatis robustæ circumdantes, & scandentes, eaque lusibus variis, atque reticulis in modum hederarum amplectentes, ubique inde & in ipsam visceris penitiorem substantiam, ita ut etiam a convexa facie sub tunica nonnulli prodeant, educuntur, reticulo pene dicam alveolari vasa visceris fulciente, & ordine quodam intertexente (a). XXXIII.

Circum, & per hepatis portas glandulæ ovatæ, colore rubro, subobscuro, aut etiam livido, tum ob persusam bilem aliquando pene luteo, adsident, quas conglobatas describunt, magnitudine variæ, ad sabæ crassitiem aliquando sine morbo accedunt, imo etiam superant, numero sunt vario, & inconstanti, textura peculiari, & aliarum conglobatarum glandularum non omnino simili, lanuginosas, aut muscosas diceres, si abscissas, aut parumper aqua solutas consideres; has non raro omnino abesse jamdudum notavimus, hinc non mirum, si pauci Scriptores easdem memorent.

XXXIV.

<sup>(</sup>a) Nervuli quoque interdum a visceris substantia exsurgunt, & per ligamenta inde protrahuntur, usque etiam ad umbilicum per ejustem ligamentum saleiforme.

### XXXIV.

Per utramque jecoris faciem sub ejusdem tunica vasa quoque lymphatica reptant, hic pauciora, vix ramosa, pene solitaria, illic plura, varioque modo implexa, & distributa. Ouum elapía æstate in Regio Provinciarum Collegio canes pene quotidie inciderem, lymphatica vasa præcipue in loborum fissuris, & quibuscumque exterioribus caveis perreptantia vidi, quorum pars circum venam portarum jam jam hepaticam implicabatur, alia vero plura per superiores fiinæ vifceris faciei fulcos venæ cavæ adfcendenti advolvebantur, pene in fasciculos illic collecta (a): ascendunt quoque per hepatis ligamenta contra vesiculæ selleæ latera. Lymphaticorum cum lymphaticis a nonnullis celebratas anastomoses non vidimus, vidimus quidem horum aliqua a proximioribus abdominis partibus accedere, alia ab intima visceris substantia exsurgere, quo vero principio adhuc ignoramus. Cl. Vieussennus (b) ab extremis arteriæ hepatica radicibus hujusmodi vasa exsurgere scribit, alii ab acinis jecoribus glandulosis (c), neutrum vero constat; constat quidem horum

(b) Vasorum nov. sistema pag. mihi 180. erat autem hypothesibus nimium facilis, neque opus hoc probaverant Academici Parisienses.

<sup>(</sup>a) Erant variæ magnitudinis, variæque pelluciditatis; Cl. Bianchi in Prodromo tabul. 54. tab. 31. Figuris duabus novum inventum perhibet vasorum ventriculi lasteorum, qua per omentum utrumque in cavas venas ab hepate egredientes traducuntur. Vid. Pauli Hieronymi Biumi opusculum: Esamina di alcuni canaletti chiliferi, che dal fondo del ventricolo per le tonache dell'omento sembrano penetrare nel segato. Milano 1728. 8.

c) Videantur Courtial. observ. Anat. oper. Cl. Petit de morb. off. adject. ex 1. edit. Arterias hepaticas, aut ductus biliarios instando, plerumque lymphæ ductus vento distendi observabat Covvper tab. Bidl. 38. fig. 24

aliqua in chyli cisternam terminari, aliorum sinibus non bene perspectis, longioresque vias ipsis adtribuunt Rudbeckius, Svvamerdamius, Nuckius, alique, hanc vero materiam ultra hepatis fines nobis pertractandam non insumimus.

#### XXXV.

Ex eorum omnium vasorum, nervorumque implexu jecur compositum in peculiari membranacea capíula continetur, cujus longius protensæ partes ligamenta vulgo vocantur. Albida est hæc capsula, pellucida, satis pro sua tenuitate valida, cellulosamque substantiam ex interiore parte infignem habet, quæ per universam hepatis massam longe, lateque diffunditur. Cl. Douglassius (a) viscera pene omnia abdominis in peculiaribus peritonæi capsulis, quæ corumdem figuris respondeant, contineri describit (b). Facite itaque in earum una hepar contineri, cujus tamen capsulæ superior pars ad hepatis fornicem elliptica, longeque producta ora protensa sit; hinc facite etiam anteriorem capsulæ partem inter utrosque lobos in plicam falciformem elevatam, & tunc cum visceris capsula duo lateralia ligamenta, & suspendens, aut latum dictum habebitis. Sed inajori perspicuitate rem pandam peculiari encheiresi.

XXXVI. Plica ea anterior, & maxima a suo principio, quod anterius ad venæ cavæ ab hepate exfurgentis locum infumimus, plus, minus in

trian-

<sup>(</sup>a) Descript. Peritonai.
(b) Sunt enim extra peritonai cortinam renunculi, renes, vasa plura lymphatica, vena cava, aorta, vafa spermatica, intestinorum pars aliqua, vasa alia, musculi, quemadmodum perbelle demonstravit Douglassius op. cit.

trianguli formam eidem venæ adfita videtur (a); hinc invicem accedentibus lamellis, neque tamen deficiente finu, sed in sulcum longe minorem, at etiam triangularem evadente (b), primum minus alto arcu, hinc, sub magis concavo diaphragmate, longe majori, tandemque per interiorem abdominis faciem, extremam ultra hepatis oram, vix arcuata bene acuta appendice umbilico terminatur, ex quo venam recipit umbilicalem ( XII. ) adusque hepatis portas in inferiore hujus plicæ parte conclusam; hanc ipsam plicam, si per longitudinem usque ad hepatis superficiem dividamus, videbimus & cum ipla continuari hepatis tunicam, quæ a subjecto viscere quoque facile dividitur, sursumque producta divisione, in duas laterales membranaceas appendices, tamquam elliptici oris anfulas, continuari perspiciemus, eæque una cum altera posterius adtensa peritonzi, seu hepatici marsupii appendice, ligamenta lateralia comparant, quorum dextrum in hypocondrio fat profundum, magis amplum, in eodem hypocondrio dextro peritonzo costas viciniores obvestienti continuatur (c); si-

(a) Vinculum hoc suspendens indumentum dat venæ cava Oribasius Anat. ex Gal. p. 119.

(b) Suspendens ligamentum cavum describitur in mele, seu taxo, ut & criceto, e Miscel. S. R. I. Acad. Nat. Cur. dec. 11. an. 5. p. 55., & 376.

<sup>(</sup>c) Homini robusto ob capitis vulnus cum cranii diacope, & late sparsa fissura, post factam cranii trapanationem febris adaugebatur, sitis, calor; ictericus devenerat cum dolore, & æstu quammaximo ad hy-pochondrium dextrum, ibique oborto tumore post irritam resolutionis, & discussionis curam ab expertissimis Chirurgis Andrea, & Joanne Baptista Verna. ut tumor aperiretur, consultum suerat, eoque duas desuper hypochondrii costas inciso, quin cultrum

nistrum longius, & trianguli formam magis referens ex angulo superioris appendicis finistri lobi ( I. ) trans cesophagum, non raro ante caput lienis elongatum, peritonæo diaphragma convestienti in ala sinistra adjungitur; capsulæ autem velum posterius diaphragmati verticaliter adtensum, quum utpote continuum cum ansularum partibus, que quidem summæ jecoris parti tamquam verticales confiderari etiam posfunt, eamdem partem circumclaudant, id, quod coronarium vocant ligamentum, cum iisdem anfulis præstare videtur. Universa porro jecoris pars, que hisce marsupii productionibus intercipitur, tamquam ad aperti marsupii oram sub diaphragmatis fornice nuda, & fine tunica est, cellulosa solum, aut etiam pinguedinea substantia perfusa, quæ quidem per ligamenti lati laminas continuatur (a).

XXXVII.

In sima autem jecoris facie capsula hæc vario modo plicatur; plicam primum habet a sulco ductus venosi verticaliter continuatam in peritonæum, dextrum diaphragmatis crus investiens; pone Egamentum laterale sinistrum cum

omen-

in abdominis cavum penetrasset, multa puris copia quotidie per dies 6. ab ipso abdominis cavo prodibat, quum inde æger convulsionibus ob capitis vulnus enecaretur, cadaver ego incidendum insumpsi, atque observatum suit puris materiam, qua vertex dextri hepatis lobi exesus suerat, in ansulæ sinu contentam suisse, quin in abdominis amplam cavitatem penetrasset, qua parte vero hæc ansula proximis costis adnectebatur, dehiscere ab adhæsionis punctis incipiebat.

(a) Hunc tunicæ hepatis defectum ad ligamentorum præcipue lateralium loca Eustachii diligentiam non effugifie videtur ex tab. 11. fig. 4. num. 32. 54.

edit. Rom.

omento minori continuatur, inferiusque a transversa hepatis sovea, cum tunica exteriore intestini duodeni producta, integumentum dat ascendenti venæ portarum, ductui hepatico, cholydoco, cyssico, arteriæ, & nervis hepaticis, quæ quidem omnia in unum sasciculum colliguntur, nullo inde pacto in hepatis intimam substantiam continuata, sed per eam partem solum cellulosa tunica in viscus adeunte.

Unde ergo Glissonii capsula, de cujus inventore acerrime tum hoc fæculo hisce postremis annis disputarunt Anatomici primi quoque subsellii (a)? Listerus (b) hanc tamquam validum musculum peritonæo hepar penetranti adnexum describebat, qui certe potis esset tantam venæ portarum pulsationem conciliare, ut aortæ pulsationem æmularetur, minorem alii fecere, & minorem adhuc alii; capsulam vero Glissonianam omnino negare vix ullus ausus est: unde porro ejus longitudinales plicæ prima jecoris vasa undique dirimentes? Non videmus, vidimus quidem fibrillas nerveas descripto exteriori venæ portarum indumento ( S. præc. ) inextricabili implexu circumductas, & implicatas, una cum strictioris compagis rubellis vasculis, præcipue ab arteria hepatica præstitis, nihil vero ultra.

XXXIX.

<sup>(</sup>a) Hæc capsula sic describitur, ait Covvper sig.

11. tab. 37. Bidloo, ut quibusdam conjecturis potius de venæ portæ in hepate officio saveatur, quam quod revera sic appareat. Videtur autem musculosam solummodo ei denegare sabricam, nam communem membraneam vaginam adtribuit ductibus hepatis sanguineis, & hisliosis. Ibid.

<sup>(</sup>b) Vid. ejus Tract. de humoribus cap. 7.

#### XXXIX.

Reliqua capsulæ pars reliquam jecoris partem interiorem cum folliculo felleo obvelat vix altera interdum plica producta supra ejus lateris renem ad costas. Hisce vinculis contra diaphragmatis fornicem hepar retinetur, ad id etiam opem aliquam conferente subjectorum intestinorum cumulo, ut demonstravit Cl. VVinslovv (a); & Cl. Arent Cant (b) maximam ex dextra parte jecoris in diaphragma pressionem constituit, ut hoc in dextram pectoris caveam plurimum elatum velit, etsi quidem minorem esse in vivis præcipue erectis certe videatur, quam in cadaveribus dorso resupinatis (c). Alias nunc non memoro capsulæ plicas, puta a ligamento lato, aut etiam a radice sinistri ligamenti lateralis ad xiphoideam cartilaginem, tum ab extrema parte, quæ umbilicali venæ propior, ad proximam coli partem, utpote non perpetuas (d).

XL.

<sup>(</sup>a) L. cit.

<sup>(</sup>b) Tab. 4. impet. prim. Anat.

<sup>(</sup>c) Riolanus nullam diaphragmatis concavitatem; aut faltem non majorem ex ea parte esse contendit in vivis propter pondus viscerum dependentium. Animadin Theat. Anat. Bauh. pag. 707., itemque in Animadin Anat. Laurent. p. 649., & subtiliori theoria Glisse.

nius op. cit. cap. 11.

<sup>(</sup>d) Cl. Bianchi durioris, denfiorisque corpulentia membraneas productiones tab. 1. litt. M. M. M., & N. per latum ligamentum delineatas habet: erantne ex morbo inductæ, utpote icon ex hydropico desumpta suerit? Cl. Santorinus l. s. haud absimiles compactas, & teretes in peritonao elegantes productiones viciti in puerperis, quas albos lacertulos vocat, interiores transverse collocatos, & exteriores in longitudinem productos. Et aliquid etiam hujusmodi ex peritonæi laceratione Falloppius indicare voluisse vicietur in opere cit. observ. Ana.

#### XL.

Venam portarum, & arteriam hepaticam 1993 pene infinitos, & sensim maxime minimos ramusculos elongari, sanguinemque in hepar infundere certo scimus, quemadmodum certo scimus bilem a ductibus hepanicis, ab initio quoque minimis, & pene infinitis retrahi, & infulum primum in hepar languinem ab egredierztibus hepaticis venis ad cavam venam hinc traduci. Id omne, imo quidquid usque nunc descripsimus, hujus visceris structuræ umbram viz præsesert, & quod maxime dolendum, quid præterea addamus, vix scimus: adeo effoeti funt hominum oculi tum in iis rebus, quas tamen Divina munificentia nobis quocumque excogitabili modo pertractandas obtulit, adeo de-Acit tum in minimis naturæ operibus ars hominum. ah semper, semper in tentaminibus suis illusa !

Videt oculas majorem portionem in efficienda hepatis massa venæ portarum esse, quam cavæ, illiusque-majores ramos quam citistime in longe minores redigi; teram, aut vini spiritum a portarum hepatica venæ per aliquam visceris partem in hepaticum ductum traduci, itemque ex issa in cavam (a). Videmus, exciso in frustula hepate, ingredientes venas præ egredientibus in axim replicari, & slaccescere (b);

(b) Uniuscujusque jecoris venæ tunica admodum tenuis est, qualis nulla atia in toto animansi. Oribas. op. cis. pag. 115. in socibus, excepto cerebro, nullum vi-

<sup>(</sup>a) Boerh. Epist. ad Ruysch. de glandular. fabr., itemque Lischvviz de principius venarum; Vieussens op. cit. Non vero penetrari credimus a minimis vasculis penitioris hepaticæ substantiæ, sed a longe majoribus, nempe anastomosium artificio, aliaque profecto est ratio de transstuxu per ductus hepaticos, sed Physiologi munus modo non agimus.

venæ portarum hepaticæ ramos ita bene ductus hepatici ramis adsociari, ut ubique consociati progrediantur, egredientes venas hos, atque illos ramos per diversas directiones intersecare. ad angulos magis, aut minus acutos, obtusos. aut etiam rectos, arteriam hepaticam per quamlibet visceris differentiam traduci, nerveaque filamenta ubique, & vario modo implicari. Videmus etiam ea omnia vasa in maniseste reticulato contextu substantiæ, inquam, cellulosæ, ab hepatis nempe portis in viscus produ-Az ( S. XXXVII. ), contineri, cujus cellulæ funt cujuscumque ordinis, & figuræ, & earum quidem reticulus ab exteriore ejus facie apparet, tamquam hepatis substantiam in majora, aut minora puncta interdistinguens, præ--fertim in ejusdem convexa facie, tum præcipue, cum viscus succingens tunica detrahatur (a). Hæc omnia videmus, at quot remanent ab Anatomicis nondum satis bene perspecta? Oculus videtne quidpiam ultra, quidpiam ultra revelantne injectiones, aut microscopia? Pulchra quidem vidimus, pulchriora per conjecturam scimus, at proh! quam longe pulcherrima

U

7

ï

-

.

13

3

5

Ţ

بو

,

scus jecore mollius est. Parisienses in trunco vena portarum bubali, seu bovis. Barbatiæ observarunt exiguas membranas, valvularum specie, qua cavitates, seu stranco porta in substantiam hepatis, dimidia occludunt, quo impediatur sanguinis ex ramis in truncum porta retrocessus. Nihil autem hujusmodi in homine.

(a) Hanc texturam habent ex capra Africana Pasisini, & Blas. Anat. Animal. tab. 12. fig. 2., atque etiam Bidtoo l. c. omnium autem optime Bianch. tab. 7. Hist. hepat. fig. extra ordinem, quam mirisicam dixit Cl. Haller op. cit. edit. Taur. tom. 2. nota (a) pag. 243. Bianchi autem dat eam ex sue, bove, ove, fele, cane, & homine pag. 1160. tom. 2. hist. hepat., eumque sequuti sunt VVinslovy, Garengeot, Verdier, aliique.

esse debent, que ignoramus! Subrilitas namra, ait Magnus Angliæ Cancellarius, subrilitatem sensus, & intellectus multis partibus superat.

XLII.

Veteres, qui pene infinitam vasorum seriem in hoc, aliisque visceribus erant quoque suspicati, a perfulo sanguine in iisdem, & præcipue in hepase, alteram, distinctamque substantiam, sangumeam offam ex corum descriptionibus dicerem, gigni credebant, eamque parenchyma nominabant; donec vir in perscrutandis naturæ arcanis solertissimus Marcellus Malpighius eam sanguinis offam diligentiori opera perscrutatus demonstravit, quemadmodum venæ portarum hepaticæ ramusculi in quamdam substantiam producerentur, quam peculiari genere glandulosam nominavit: numquamne vidistis in vitrariis officinis ab operariis conicos vitreos tubos in extrema parte ita aptari, ut in vesiculas subrotundas, ovatas, quadrangulares, hexagonas evadant, a quibus inde alter longe minor educatur tubulus? Idem pene naturæ artificium videtur in construenda hepatis interna fabrica. Vena portarum, nempe hepatica extremi ramusculi, forte, imo certe, exiguiores iis, quos ex quacumque encheires videmus, in vesiculam evadunt exiguam; cogitate, quantum exiguam, quum pene linczi Anatomici eam numquam videre potuille 14teantur, alique non minus folertes, qui eamdem tuebantur, liquido demonstrare non potuerint, nisi cellulosæ substantiæ hydatides ex morboso jecore pro Malpighianis vesiculis Anatomicos illuserint.

#### XLIII.

Hisce vesiculis Malpighius figuram nullam speciatim determinare voluisse videtur (\*), alii globosas, aut globosis non valde dispares, alii etiam hexagonas, aut plurium laterum fecere, ex harumque acervis lobulos minimos rimis di-Ainctos ob interserpentem per eorum latera snagis confpicuam cellulofam fubstantiam præ-Atari scribunt, quos nonnulli polygonos, alii cubicos defignarunt; fingulis vero veficulis. aut glandulis sanguinea vasa, venæ scilicet porta, & cava extremi fines, arteria pariter, & porus biliarius ex Malpighio appenduntur. Quemadmodum nempe in uvæ acino a ramusculo, seu petiolo in interiorem acini parietem tenuia, succosa vascula disperduntur, quæ in acini cavum uvæ liquorem extillant, ita venæ portarum hepatica extremi ramusculi, ac si exteriorém tunicam in venculam aptarent, pennicillo valculari, & interiore ejuldem interiorem superficiem obsident, iisque exterius, forte & interius subtilissimi egredientium venarum, & plus quam capillares ramuli priores incipiunt, in majores inde evadentes, ita-quoque accedentibus extremis arteria hepatica ramulis, ab aktezo autem vesiculæ extremo minimi excernentes, seu egerentes hepatici dudus prodeunt, ex guibus in unum collectis hepasicus egerens communis ductus evadit.

7

ı

i

3

#### XLIV.

Ita ex Malpighio hepatis glandulæ præstitæ videntur. Novam vero de viscerum, & speciatim hepatis fabrica sententiam inde invexit Cl. Ruyschius vir peritus, & experiens (a),

<sup>(\*)</sup> Atque, si ullam, eam certe hexagonam.

(a) Viri in critica Anatomica periti folliculosam,

aut glandulosam viscerum structuram a VVepsero pri-

contenditque nullum dari folliculum, nullam dicam glandulam, extremis venæ portarum hepaticæ ramusculis appensam, sed totum, quantum est maximum hoc viscus, simplicibus ejusdem vasorum continuationibus, quorum supellex amplissima est, confici, ductusque hepatizos fine intermedio folliculo ab extremis vena portarum hepatica ramusculis oriri, & spectabiles, si quippiam videant, visceris acinos, glomeramina, seu potius distinctos cumulos vasculorum nulla peculiari membrana obtectorum esse contendit. Oh elegantissimæ Malpighii ohservationes! Urgent porto aliæ Ruyschii; & cui modo credendum? Aliquidne utrique de hujus visceris substantia omnino reconditum semper extitit? Certe Cl. Bianchi in publicis, privatifque lectionibus nobis fæpe adfeveravit quidpiam a vasculosa, & glandulosa substantia diversum in visceribus existere, quemadmodum in elaboratissimis suis Tabulis demonstraturum esse pollicetur (a). Ego autem meam dissertationem .

mum indicatam fuisse contendunt in Epist. ad Joh. Henr. Pauli, itemque omnino vasculosam ante Ruyschium ab Edmundo Kingio in Transast. Philos., at quo ultra processerunt Malpighius, at que Ruyschius!

<sup>(</sup>a) Ipse quidem hepatis substantiam granulis, seu acinis sactam perspexi, Malpighianas autem vesiculas, aur folliculos, ingenuus dicam, numquam vidi, item in renibus: illius certe granula aut acini magis, quam istorum friabiles mihi videbantur, turgentes, pulposi, & laxi, eorumque interior sabrica admodum obscura, villosa, compacte reticularis, & quidpiam ultra, quod bene non perspicimus. Profecto facile crederem in glanduloso sistemate non minus, quam in vasculoso de acinorum disterentia cogitandum esse: atque sorte in hac disquisitione lucem aliquam afferre possent Phythologica observationes, fructuum præcipue, & soliorum, item Zooponia substilior, in iisque jam a quatuor annis tous

tionem nimium jam forsan cum Lectorum fastidio protractam existimo, ut in hoc argumento amplius non immorer, præcipue cum nondum tantam habeam experimentorum copiam, ut litem hanc solvere possim:

Non nostrum inter vos tantas componere lites.

fum . Interim consul. Petr. Nanium Inft. Bonon. tom. . pag. 326., & feq., Boerh. fabric. divers gland. tom. 2. Instit. ejuidem epist. ad Ruyschium de gland. fabr. & Ruyschii responsum. Bianchi progymnasma de varia animalium viscerum fabrica &c., & Histor. hep. L ultimo c. Heister apolog. ad finem adenolog., Morgagni epist. anat. 3. S. 4., & seq., at quoque non omit-zatur perspicacissimi, & optimi judicis Jo. Fantone Diff. Anat. 6. ult. edit. a pag. 227. ad 236. cujus liz-brum gratiofissime nobis dono datum non semel deosculati sumus; addatur VVinslovo Acad. Paris. an. culos intus villosos, & ea materia, que illic secernitur, jam ab initio hominis infarcta ponit expos.

Anat. Trait. du bas-ventre §. 287. idem habet VVinslovvii Præcursor Garengeotius, & ejusdem compendit Scriptor Verdierus, præmonstrantibus quidem Leibnizio, & Michelotto de separat. fluidar.; alii ex Cl Ferrein, quemvis acinum sieri corticali sabrica, friabili, e rubro slava, & alia rubra molli, & quasi medullari scri-bunt. At estne tanta hypothesium licentia, ut, quum vesiculas revera non viderint, quid in iisdem ha-beatur, proponere liceat? Ah nos nimium ad nature opera elegantissima nimium coecutientes!

Quarimus indagine vana.

Naturam semper sugientem: qua se ubi paullum
Ostendit nobis, mox facies in mille repente,
Ceu Proteus, conversa sequentem eludis, & angus
Mærentem seniique horas, cassumque laborem.

Deficiente sensuum ope, erroris periculum semper est, nec quidpiam de abditis natura operibus temere pronunciandum, non quid sieri potuerit, sed quid revera factum suerit sedulo inquirendum; nam sapiens natura eas ut plurimum, quas homines, vias non est sequuta.

#### TABULÆ

# EXPLICATIO

#### FIGURA I.

MEPATIS MARSUPIUM OSTENDIT, EJUSQUE APPENDICES.

I ad hepar ligamenti lati vulgo dicti binas laminas dividas, seu potius peritonæum, quod a concava facie diaphragmatis prorogatum est, totumque hepar amicit, & inter majores ejus lobos in altam, validamque plicam duplicatur, ad hunc locum aperias, & apertas partes in longum diducas, & versus superiores loborum margines longius invicem semoveas, conspicue vides, hoc viscus sub diductis iis partibus omnino ab involucris nudum fieri; nimirum hanc plicam eamdem ipsam esse succingentem tunicam: vides insuper diductas illas ad loborum latera plicæ altitudines continuas esse cum binis aliis peritonzi plicis, que lobos hepatis dextrorsus. sinistrorsus, atque etiam posterius, cum lateribus, & medio concavitatis diaphragmatis annectunt; dextrum ideo, nec non sinistrum ligamentum a nobis sunt dicta: vides ulterius mediam, seu majorem istam tunicæ hepar succingentis plicaturam inferius extra hepar protendi, ibidemque venam umbilicalem dictam complecti, & cum eadem ad níque umbilicum porrectam, ita ad locum umbilico, & jeconi

interpositum cum ibidem assidente peritonæi latere subterfirmari, & connecti, ut hæc ad hanc quoque sedem valide suspendat hoc viscus, a posteriori in anteriorem partem oblique fitum; ne scilicet vel in erectis, magisque incubantibus, aut aliter jacentibus hominibus super subjectum cava vena truncum, aliasque partes prolabatur: vides præterea hanc plicam. fi rursus in proprium nexum componas, ita superius cum diaphragmatis centro continuam esse, ut illic veram, absolutamque suspendentis jecur ligamenti operam præstet: vides demum Lateralia ligamenta posterius expansa ita unite, lateque hepar diaphragmati obligare, ut eadem semper ligamenta fint, quamquam alicubi varie inflexa, aut producta; neque idcirco diverso coronarii ligamenti, aut alterius cujuslihet nomine distinguenda esse. An non ergo ex ita ad hepatis viscus circumducto peritonæo, ejusque hic illic productis plicis elegantissimum, simulque validissimum martupium vides, quatuor præcipuis anfulis, seu inhæsionis punctis firmatum? Primum scilicet punctum ad superiorem terminum lati ligamenti, seu ad centrum diaphragmatis; alterum ad ejus inferius extremum infra hepar sub albæ lineæ loco; tertium, & quartum ad lateralium ligamentorum oras, seu ad dextram, atque sinistram diaphragmatis faciem? Porro suspendendi momentum, & vis in iis ligamentis a ratione occupati spatii computanda est. Latum ligamentum suspensorii arcus duas partes occupat; tertium vero continuum umbilicale. Major sinistri lateralis ligamenti longitudo a majori latitudine compensatur. Hæc autem nitidius percipientur ex confideratione sequentis figura.

Hæc a puero octo annorum desumpta est.

B. Ejusdem centrum tendineum.

CC. Hepar a diaphragmate pendens, cujus tunica, & ligamenta fequenti modo fuerunt explicata.

Nempe ligamentum umbilicale, vulgo suspendens dictum, utpote facile dividuum, in

duas laminas dividebatur.

DD. Igitur utræque devolutæ lamellæ funt,

quibus

E. Umbilicalis vena primum extra hepar infinuata videtur. Producta hine per hepar harumce lamellarum divisione, unum, continuumque corpus cum succingente sunica ab iisdem diductis sieri apparet. Namque ab iis detractis nudum remanet hepar per spatium FF. Et ulterius, si velis.

At, neque peracta hac divisione, quo magis ad superiorem harum laminarum partem procedimus, eo jam in naturali statu plus diductas has laminas invenimus eo modo, ut pene ante cavam venam

G. In triangulum dehiscant, cellulosa, aut etiam

adiposa substantia instructum.

Namque ab hoc triangulo, quæ per hepatis dorsum primo invicem adjunctæ hepaticæ tunicæ, seu peritonæi laminæ ligamentum latum, seu falcisorme comparabant, per summam hepatis, anterioremque partem ad latera intenduntur, & lateralia vulgo dicta ligamenta præstant; suntque hic partes,

HH. Quæ dextrorsum, & sinistrorsum producuntur ad diaphragma, continuanturque cum peritonæo a diaphragmate in posteriorem hepatis partem producto, nempe cum strato

II. Porro declinato in naturalem fitum diaphragmate, & revisis in propriam sedem productionibus tati ligamenti HH., velut navicularem soveam sub diaphragmate simulari

com-

comperimus; eamque partem hepatis, quam naviculæ latera circumclaudunt, tamquam ad facci, seu aperti marsupii oram sub diaphragmate nudam observamus. An hunc membranaceum navicularem ambitum coronarium cum nonnullis vocabimus?

Quando porro diaphragma in naturalem fitum aptetur, non ita quoque in transverfum erunt ejusdem crura, & alæ, guemadmodum hic videntur, propterea quod ad latera aciculis tendantur ad hoc, ut posterius velum magis, magisque appareret.

L. Est cystis fellea extra hepatis oram in hoc cadavere, quemadmodum in pluribus aliis

fuo fundo pendens.

#### FIGURA II.

#### DE HEPATIS STRUCTURA.

A. LST hepatis frustulum ex sue ita excisum, ut illud præcipue videatur, quod describebamus S. LXI., & not. 3. ejuid. S.

B. Est vena portarum ramus per granulosam hepatis substantiam situatus, & per anastomo-

fim cum altero \* junctus.

CCC. Lobelli, seu hepatica apophyses exte-

riori tunica nondum nudatæ.

Hæc autem figura pertinet ad Cl. Bianchi Præceptorem meum, qui in peregregio suo opere LIV. Tab. eamdem nitidius cælatam exponet, atque explicabit, & magis quidem mirificam, quam viderit Cl. Haller. Vid. not. Jup. cit.



## DE HEPATIS

# ABSCESSIBUS,

QUI VULNERIBUS CAPITIS SUPERVENIUNT

APITIS in vulneribus jecoris morbos quandoque subsequi vetus observatio est. Nervorum fympathicis, ut aiunt, affectionibus, vel refluenti materiæ ipforum causam tribuerunt. Ouorum alterum Anatomiæ omnino repugnat: qui enim fieri posset, ne viscera quoque alia, quæ iisdem occupantur nervis, eodem pacto afficerentur? Alterum, etsi metastaseos doctrinam admitteremus, non ita constans est, ut hepatis abscessum perpetuó promovere concomitari videatur: hepar enim quandoque. affecto capite, in pus colliquatum observaverunt, velut in apoplexia, morbis comatofis &c., ubi nullum puris indicium vel causa prostaret. Ab ipsa potius vitiata sanguinis circulatione hujusmodi affectum repetendum esse, mihi videbatur, quoties casus, in quibus hi eveniebant, sedulo persequerer. Hypothesim non inquiro, observationes potius aliquas quambrevissime proponam, ex quibus conjecturam aliquam, quæ ad praxim quodammodo referri possit, indicabo.

Vulnerato capite hepatis abscessum tunc maxime pertimescendum esse, multiplici observatione percepimus, quando æger ab accepto vulne-

vulnere bilem viridem evomit, delirio corripitur, convellitur, sanguinem ab ore, oculis, vel naribus emittit, genæ tument, jugula palpitant, hypochondria convelluntur; quandoque etiam, ne quidpiam ultro omissse, aut dissimulasse videar, idem affectus accidit, si vulneratus comatosus decumbat, stupidus, vaniloquus, atque tunc jugula potius tument, & livent, hypocondria intenta dolent. Nonne ergo in hujusmodi ægrotis sanguinis motus per cerebrum vitiatus erit? Asceusus arteriarum cerebri. earum tenuitas, visceris mollities & structura, finus arteriis, & venis intercepti, horumce ad jugularium venarum alveos declive, breve, & facile iter, semel perturbato motui maxime favent, & irruenti sanguini amplam & expeditam viam cedunt, vel massam majorem facile admittunt; hinc sanguis vel nimium præceps, vel nimia massa gravis, per venam cavam defcendentem propulsus, ascendenti facile vim faciet, quoniam nulla est ad harumce venarum confluxum firiga cartilaginosa Highmori, nullus Vieussennii isthmus, nullum Lovveri tuberculum, & nequidem ipfarum venarum minimus angulus; quæ machinamenta etsi essent, nec quidem agere possent, ne ad auriculam dexteram. vim pateretur a cava inferiore affluens sanguis. Quum vero liquidorum homogeneorum preffiones ita se habeant, quemadmodum altitudines & bases, basis autem, & alritudo cavæ ascendentis longe majores fint; descendentis excesfus, seu major vis tanta numquam erit, ut infringat omnino, & superet ascendentem, alias enim lethalis syncope contingeret; aliqua tamen esse debet; at si quidem pressiones per annulos & segmenta in liquidis undatim agant, pressio autem sit in ratione reciproca distantiæ & resistentia; ubi ideo minor erit distantia & resistentia.

sternia, ibi præcipue vis suæ excessum exeret ? Quis ergo, considerando cavæ ascendentis ramos hepaticos duarum venarum consluxui propinquiores esse, in amplo reconditos inerti vincere, & gregatim in cavam venam ascendentem consluentes, quis, inquam, non percipiet, ibi descendentem sanguinem eo pacto vitiatuma primum agere, ascendentis motum remorari, & perpedire, atque ideo stasim promovere, ex qua inslammatio tandem contingat, in gangrænam, aut abscessum, qui certe frequentior est, terminatura.

Subdole ut plurimum fiunt hujusmodi abscesfus in hepate, & pluries ego certe vidi in cadaveribus vulneratorum capitis, in quibus nequidem suspicabatur. Quid porro, fi & ipfi Medici, teste Boerkaavio, de ipsamet hujus visceris idiopathica inflammatione raro cogitent? Arteriæ enim, habita ratione ad molem tanti visceris, ea est parvitas, sistematis porto venosi ea laxitas, & tam parvus sanguinis venæ portarum impetus, ut fymptomata nec vehementia, nec adeo perspicua gignant. Viscerum inflammationes, quando ipforum massam occupant, obtufum habent dolorem, qui longe obtusior erit in hujusmodi hepatis affectibus quando venofum systema obstructione præcipue afficitur; atque recte ab ipsomet Galeni tempore graviora fymptomata hepatitidis defignabantur, & perspicue definiebantur, si sanguis infarctus esset ad finem arteriæ hepaticæ, vel arteriarum, quæ a diaphragmate, vel aliis proximis partibus illuc pertingunt, & superficiem hepatis perreptant. Membranarum inflammatio generatim præ cæteris majorem dolorem & reliqua inflammationis symptomata longe graviora habet; atque si in suppurationem abeant, hæc ad alteruttam visceris faciem, aut extremos ·

mos limbos, sæpe-sæpius sluere, & adunari, multis observationibus compertum est; verum in capite vulneratis profunde latentem abscessum sæpius observavimus.

Juvenis robustus post ter institutam cranii terebrationem convulsus tandem moriebatur; præter piæ matris levem necrosim reliqua in cadavere optime constituta, & sana videbantur: & jam cadaver linquebamus, quando ad superiorem jecoris faciem parva alba pustula nobis ostendebatur, ex qua, dum rumperetur, albissimi. nec adeo male olentis puris unciæ septem educebantur; atque ab eo tempore in perquirendo diligentiores facti, frequentiores esse hujusmodi hepatis affectus, quando nedum ulla erat suspicio, sæpe commonstravimus. Et quidem vidi ego capite vulneratos, quorum vulnus bene restitutum videbatur, nec amplius sub Chirurgi cura erant, quorum tamen functiones animales non ita bene restitutæ videbantur, ictero tandem corripi, respiratione difficili, atque cum dolore, vel non, laborare, urina lateritia, dejectionibus purulentis, languidos, emaciatos post aliquot menses obiisse, quibus nil, nis hepar purulentum observabatur, ceu veri essent hepatici, dum tamen a vulneris accepti die usque ad mortem in Nosocomio sub Medicorum cura, quibus Chirurgi commiserant, durassent. Historiam referam, quæ horumce abscessuum diutinam durationem, subdolam, nec adeo incommodam oftendet.

Rusticus quidam quadraginta annorum Taurini in Nosocomio D. Joannis per duos menses de accepto capitis vulnere, quod usque ad duram matrem penetraverat, curabatur; mense Junio ad agriculturæ opera redibat, verum ad sinem mensis Julii æger ad idem Nosocomium iterum deserebatur, cui caput erat monstrose

tumidum, atque emphysemate ita deformatum. ut non novissemus illum hominem esse, quenz de eo vulnere curaveramus: facies etat hic illic eryfipelatofis maculis interdistincta, tumor emphysematicus ultra claviculas & scapulas ad pectus extendebatur; respiratio difficilis, anhelosa, cum sibilo; atque æger intra paucas horas moriebatur. Ipse ego cadaver incidi, atque in capite nil aliud observavi, nisi crustam levem facile deciduam ad antiqui vulneris locum, quæ ulcusculum obtegebat; reliqua in capite sana, ut ingens illud emphysema, quod intra sex dies ad eam molem ob solis calorem. ut opinabantur, pervenerat, nisi ab aere exteriore enatum crederetur. Verum ab hepate ingentem puris copiam eduximus, perforato quodam albo tenui folliculo, ad convexam jecoris faciem sub diaphragmate protuberante. Ictericum jam a pluribus diebus devenisse, stupidum quandoque, vaniloquum nobis narrabatur, nunquam vero de lateris dolore esse conquestum. sed tantum de gravitatis quodam sensu.

Clarissimus Molinellius, qui consulto hanc materiam proposuit, potius quam pertractavit, abscessus non sæpins in gibba parte hepatis, quam in concava oriri, quemadmodum Ballonius tradiderat, sed pariter in utraque, observavit, atque meæ confentiunt observationes; sed abscussus, aiebam, sæpe profundus suit, & non æque ad exteriora latus: stagnare interdum saniem etiam in aliis partibus comperit, cum hepar effet integrum; quæ porro partes, nunquam ex iis non erant, quæ abdomine continentur. In quodam homine, qui ob capitis vulnus moriebatur, abdomen intentum, & tumens comperit; atque in eo cadavere supersicies intestinorum, tenuium præsertim, quibusdam in locis, quasi ukcusculis cum multa sanie, & tu& tuberculis quamplurimis hue illucque dispersis, depravata erat. Viderunt & alii in pulmo;
nibus saniem suisse coactam. Utrumque vero
ex proposita sententia explicari posse videtur.
Alterum enim in systemate venarum hepaticarum comprehenditur; alterum ex vitiato sanguinis motu, ob cavarum venarum confluxum
ad dexterum cor, hinc ad Pulmones, facile
intelligitur. Ornamenta porro, & rationes, quas
ulterius possem referre, libenter prætermitto;
nam si sorte erraverim, nimium jam dixero;
si vero rem propius attigerim, satis quidem
dixisse coram artis Magistris probe sentio.

Hanc unam tamen, quam ab initio pollicitus fum, conjecturam proponam: si nempe ex hujusmodi causa hepatis affectus post capitis vulnera contingunt, sanguinis missiones e pedibus quas adeo celebrant, & sæpe repetunt, si ingravescant vulneris symptomata, instante hepatis morbo, an nocuæ potius non erunt? Cum enim ex aperta pedis vena fluxus sanguinis per cavam ascendentem imminuatur, hinc & ejus refistentia, qui vel nimium præceps, vel nimia massa gravis a capite descendit, vis excessim majorem habebit, unde hepar magis magisque repleatur, depleatur difficilius. Non ignoro, nec ultro præterfugio, quæ in doctrinam revulsionis, & derivationis a sapientibus viris allatæ sunt difficultates, ut ex delectu alterutrius venæ sectionis, nihil boni expectandum, aut mali pertimescendum videatur. Quemadmodum vero decessus, & velocitates liquidorum sint in ratione composita altitudinum & orisiciorum, & in ratione inversa refistentiarum, cæteris paribus, quis, inquam, non viderit venæ sectionem in pede hanc ita in vena cava ascendente imminuere, ut velocitates, & decessus in superiori augmentum capiant, utpote etiam BERTRANDI TUM. TOM. 1.

in continuo venoso canali non pulsatili. Vidi ego non semel in hujusmodi casibus, post in-stitutam venæ sectionem in pede, ægros moæ ictericos devenisse, & ut videant alii, auctor sum.

Hujusmodi abscessium historiæ, quæ apud Chirurgiæ Scriptores prostant, nusquam ita sunt descriptæ, ac si suerint prævisi; e cadaveribus omnes sunt depromptæ, atque ideo eorum etiam curationes desiderantur. In Dissertatione de hepate, quam anno 1748. (a) evulgavi, brevem historiam ipse discripseram, eamque modo totam dabo.

Homini robusto, ob capitis vulnus cum cramii diacope, & late sparsa fissura, post instituram cranii terebrationem, febris adaugebatur, & fitis, color ictericus devenerat, cum dolore, & tenfione quammaxima ad hypochondrium dextrum, ibique oborto tumore, qui ultimas costas mendosas elevaret, atque pene disjiceret. quin tamen ultra ipfas extenderetur, & incasfum quibusdam adhibitis remediis, quæ nil forte præstiterant, nist integumentorum intumefeentiam leucophlegmaticam, confultum fuit, ut tumor aperiretur; eoque prope marginem duarum postremarum costarum, qui locus magis congruus videbatur, oblique inciso, multa puris copia quotidie per dies sex e longinquo prodibat; at tandem æger moriebatur. Cadaver ego incidendum infumpsi, atque observatum fuit, puris materiam ab eo loco ad latus ligamenti lati, juxta lobi dextri convexitatem, alte insedisse, quæ ad ipsus lobi verticem pertingeret, ibique late expanderetur in plica ligamenti lateralis dextri, quæ a diaphragmate non parum fuerat divulfa, atque adeo amplia-

ta;

<sup>(</sup>a) Vid. pag. 174. n. (e) nostr. edit.

en; per totum illud latus, hepatis lobus diaphragmati erat coalitus, quemadmodum post prægressas inflammationes, pleuræ pulmones adhærere solent.

Semel hujusmodi abscessum vidi, qui ad epigastrium turgeret, quo tamen inciso, tanta puris vis effluxit, ut æger intra paucos dies obierit: quam certe fortunam bis expertus Hildanus, perpetuo lethalem pronunciaverat. In eo autem ægroto multa fanguinis copia intus. & extus effluxerat. De hujusmodi hæmorrhagia. propter exesam hepatis substantiam, memorabilis casus habetur apud Vefalium. Celebris Jurifconsultus, qui languida valetudine dudum vixerat, cumque nonnulla per transennam Vesalius percunctatus fuerat de morbo suo, qui circa hepar hærere obstructionem dixit, promisit sequenti die se adfuturum Anatomicæ administrationi circa viscera abdominalia instituenda, ne nempe morbi sui sedem attente consideraret. Verum eodem die, paucis post ea horis, inter cœnam, de mira corporis imbecillitate conque-Aus fuit, ac impedita respiratione, & paulo post expiravit. Vesalius sequenti die tam subitæ mortis causam in cadavere inquirens, invenit universum corporis sanguinem adhuc calentem in peritonæi cavum confluxisse, rupto venæ portarum trunco. Hepar totum candidum erat. & multis tuberculis asperum, & tota anterior jecoris pars, & universa sinistra sedes instar lapidis erat indurata; posterior vero pars, ubi vena cava hæret, putredine vitiata, & mollis apparebat.

Si vero de hepatis abscessibus in universum aliquid audeam dicere, postquam summi hujus Academiæ Viri tam solidos, & optimæ doctrinæ plenos commentarios scripserunt, qui a pertractando hujusmodi argumento me deterrere

debuissent, nonnulla, quæ mihi observare com-

tigit, proponam.

Aliquando ex hepatis regione abscessus fuerunt judicati atque ideo aperti, qui tamen ad ipsum non pervenerant. Vir quidam, in summa curia Præses, ictero jam diu laboraverat cum dolore & tumore, qui a cartilagine enfiforma ad tertiam usque costam spuriam extendebatur; materiam fluidim contineri, pene omnes Chirurgi, qui sæpe fuerant convocati, præsentiebant, atque ideo hepatis abscessum esse, quem aperire confulebant. Renuebat æger, atque post quatuor menses, per quos sebre comsumptiva continue laboraverat, moriebatur. Instituta cadaveris Anatome, abscessum in cysti conclusum reperimus, qui a cartilagine ensiformi, desuper inferiorem dextram partem ventriculi, ex uno latere hepatis limbo coalitus, cui etiam per policis longitudinem subjacebat, ex altero linez alba, porro nullo pacto cum hepate. cæteroquin fano, communicaret: sanies vero prodierat ex tumore skirroso, ulceroso, glandularum pyloro adjacentium, quæ multum intumuerant: & fanies ipsa sublutea, mucosa erat, ita ut si tumor ille, dum viveret æger. fuisset incisus, locus, sanies, & symptomata eorum sententiam probassent, qui hepatis abscefsum effe pronunciaverant, etsi non suisset (a).

Quemadmodum lutea depluens materia hepatis abscessum perpetuo non indicaverit; ita quoque si alba siuat, hepar assessum esse quandoque non minus est suspicandum. Utrumque jam agnoverat Hippocrates. Qui suppuraso hepate uruntur, se pus purum & album stuat, scripserat ipse in Aphoris. 45. sect. 7. evadunt:

in

<sup>(</sup>a) Eandem historiam narrat Auctor in was. de tumoribus §. de absceffibus, internis abdominis.

in runice enim his pus inest: se vero qualis amurca fluat, percunt. Ubi enim bona suppuratio fit, commentatus est Cl. Swieten, in uno loco circumscripto pus colligitur: & forte hoc tune imprimis fit, quando circa exteriorem hepatis convexam partem vomica hæret, per externam hepatis membranam coercita, & tecta. Ubi vero in intima substantia hepatis abscessus fit, tunc in amurcæ similem putrilaginem omnia convertuatur, & nulla spes superest. Utrumque vero ita intelligendum esse experientia comperimus, ut alterum neque ita temper bene vertat, neque alterum perpetuo sit lethale: in primo enim casu, propter nimiam puris copiam, quæ multam hepatis partem exederit, hujusmodi vomicas lethales evadere posse, Hildani, & Drelincurtii observationes, ut plures alias antiquiores præteream, ostenderunt, & ratio ipsa suadet. Aliquando per multos dies puris copiam effluxisse visum est, cui tandem materies biliofa adjungebatur, neque tamen lethales fuerunt. Ita Lysterus in epistola ad Bartholinum notat, quod hepate suppurato, per candens ferramentum via facta fuerit puri copiose erumpenti, quod per plures dies confertim effluxit. Dum autem Chirurgus stylum profunde in ulceris cavum demitterer, materiæ citrinæ copia ad tres libras & ultra profluxit quo fluxu cessante, pus iterum prodiit, & perrexit ultra annum exire, sed mediocri quantitate. & relicta fuit fistula in hypochondrio dextro; atque in Commentariis Acad. Reg.: Scientiarum anno 1730, abscessus hepatis curati historiam legimus, qui biliosam materiam adeo acrem evomeret, ut lamina plumbea vulnus defendere oporteret, ne a depluente liquido acriori cutis excoriaretur.

### TOS DE HEPATIS ABSCESSIBUS.

Vidimus hujusmodi abscessum, qui talem amurcam fœtidam, & quandoque sanguine permixtam stillaret, atque hic sistebatur, illa corrigebatur audacter instituta injectione decocti vulnerarii, cui parum adjectum fuerat spiritus vitrioli. Cæterum illud pejoris ominis esse tunc percepimus, quando ea amurea magis fusca ejicitur, atque si in aquam projiciatur, nulli amphus flocculi pulposi, vasculares observantur; tunc enim tota substantia in liquamen habita, vel resorbetur, mortem quam citissime illatura quocumque traducatur. Quantis enim viis, per ventriculum, intestina aut etiam pectoris cavum ab hepate effluxisse hujusmodi materies visa est: vidit Stalpart Vander Wiel vomicam hepatis per sputa purulenta evacuatam, cum hepar, & pulmo dexter infimul perfracto diaphragmate coaluissent, atque commune ulcus habuissent.



## APOLOGIA

DELLA PRECEDENTE

# DISSERTAZIONE

Pubblicata dall'Autore a pag. 40. del II. tomo del trattato delle operazioni.

Anno 1757., nel III. Tomo dell'Accademia Reale di Chirurgia pag. 484., su pubblicata una mia Dissertazione sopra gli ascessi, che alcune votte accadono al segato dopo le gravi serite del capo. Il signor Pouteau, celebre Cerusico di Lione, li 14. Novembre dello stesso

anno, presentò una Memoria alla stessa Accademia, nella quale proponeva una teorica della cagione di quegli ascessi diversa da quella, che io aveva proposta: fummi trasinesso il manoscritto del signor Pouteau dal signor Morand Segretaro dell'Accademia, ed io non risposi. pensando che gli Accademici sarebbonsi per loro stessi soddisfatti senz'alcuna mia apologia. chente, e quale io l'avessi fatta; ma il signor Pouteau ha poi pubblicata la sua Memoria l'anno 1760 nelle sue mescolanze Cerusiche pag 123.; e l'anno 1762. il signor David nelle sue ricerche sopra gli effetti delle diverse cavate di sangue pag. 199., venne a disapprovare non meno la mia spiegazione di quegli ascessi, che quella del signor Pouteau; mi perdoni il Lettore se vò profittare di questa occasione per rispondere: io prima erami abbandonato all'autorevole giudizio degli uomini favi, ed intendenti, nè ora pretendo fare altra cosa, se non se di aggiungere alcune rissesfioni a quei fondamenti, su quali io aveva creduto di potere stabilire la mia opinione, dappoiche quelli non sono stati altrimenti confutati da' miei avversari, se non esponendo una teorica affatto contraria, e perchè il Lettore possa meglio giudicare delle nostre opinioni, prima esporrolle colla maggior brevità

Di tali ascessi, che qualche volta accadono dopo le ferite di testa, alcuni Autori avevano dedotta la cagione dalle assezioni simpatiche de' nervi, o dalla metastasi di materia purulenta; ma rislettendo, che, se da' nervi dipendesse tale assezione del segato, dovrebbe non meno accadere ad altre parti più vicine, alle quali giungono gli stessi nervi, e, se dalla materia, non dovrebbe accadere, come pure accade, in alcune malattie del capo, nelle quali non

vi è stata alcuna suppurazione, sembrommi che un'altra potesse esserne la cagione, la quale dipendesse dal vizio della circolazione del sangue, il quale parevami dovesse prodursi in fimili casi; cioè a dire i seriti al capo sovente gettano sangue dagli occhi, dalle narici. dalle orecchie, e dalla bocca, il loro volto diventa infiammato, e tumido, rosseggiano gli occhi, evvi uno zufolamento, e tintinno degli orecchi, palpitano i giugoli, e sopraggiungono febbre fortissima, delirio, e convulsione, i quali fintomi tutti sembrano dimostrare, che nel capo è cresciuto il movimento del sangue, e conseguentemente pei polposi vasi di quel viscere, per gli ampli seni, per le brevi vene giugolari potrà discendere precipitoso, e grave per la pesante sua massa nell'ancor più breve vena cava discendente, e perciò non potrà non fare qualche forza contro il sangue della vena cava ascendente, giacchè, ove fi congiungono queste due vene, non vi è la striga cartilaginosa dell' Higmoro, nè l' istmo del Vieussenno, nè il tubercolo del Lovvere, nè il minimo angolo di quelle vene, le quali cose, se anco vi fossero, nemmeno potrebbero impedire, che il fangue della cava ascendente non soffrisse refistenza nell' orecchietta destra des cuore; poste le quali cose, si dovrà non meno dedurre, che quella resistenza cada sui prosfimi vasi, e principalmente sulle prossime vene epatiche, le quali al îne volte si aprono nella vena cava ascendente vicinissimo all' orecchietta destra del cuore (a), onde ne possa essere impedito, o perturbarsi il anovimento del sangue nel fegato viscere inerte, a grave, e quindi pro-


<sup>(</sup>a) Vedasi la sua Dissertazione de lepate S. EXEL pag. 168. della nostra edizione.


produrfi la stafi, la infiammazione, l'ascesso; o la cancrena: l'eccesso dell'ampiezza della vena cava ascendente, e conseguentemente la maggior colonna del fangue sono cagione, che non così sovente più lungi si sentano quegli effetti, che pure qualche volta si sentono, come offervò il celebre Molinelli, ved. il 111. Tom. dell' Accademia di Bologna, ma sempre ne' rami della vena porta. Quando tale affezione si produce al fegato, l' ipocondrio diwenta doloroso, tumido, e sopravviene l'itterizia; e, perchè tale mi sembrava potesse essere la cagione degli ascessi del fegato, io conchiudeva in quella mia Dissertazione, che in tale stato di cose non dovremmo essere sì rifoluti di cavar fangue dal piede, come fi suole, per le ferite del capo; imperciocchè, se ancor fosse diminuita, ed infranta la forza del sangue della vena cava ascendente, molto si dovrebbe temere, che ancor più s'inzuppassero le vene epatiche soggette al peso, ed all'impeto di quello, che discende.

7

Conseguentemente alla mia Dissertazione i sopra citati Pouceau, e David sono anco giunti a pensare, che dal vizio della circolazione del sangue potessero dipendere tali ascessi; ma l'uno, e l'altro hanno supposto, che in simili casi minor quantità di sangue giungesse al capo, mentre che io aveva pensato, che troppo ve ne dovesse andare; cioè quegli nell' Opera citata pag. 137. scrisse, che per la commozione del cervello debbano essere caduti in atonia i rami delle carotidi, e delle arterie vertebrali, e che perciò una parte di sangue non potendo giungere, e penetrare pel cervello, fosse obbligata passare nell'aorta descendente, e ne' suoi rami principali, come l'arteria epatica, tionde si facesse ingorgamento nel fegato, e si-

piuttosto rompere que' vasi, e prodursi uno spargimento mortale. L'unico esempio d'ascesso al fegato, rapportato dal signor David pag. 237., fu conseguentemente ad un'infiammazione del cervello. Potremmo anco domandare al signor Pouteau, come proverebbe, che il sangue, il quale non potesse ascendere al capo, dovesse tutto distribuirsi all'aorta descendente, e come principalmente all' arteria epatica; perchè fi facesse piuttosto l'ascesso al fegato, che alla milza, ai reni, o la infiammazione, e cancrena al ventricolo, ed agli intestini? Così anco potremmo chiamare le ragioni al signor David, perchè una tale perversione del movimento del fangue, com' egli l' ha supposta, non produrrebbe una fincope mortale, o la suffocazione de' polmoni, prima che l'ascesso al fegato, il quale alcune volte tarda a produrfi e giorni, e settimane? E con queste poche rissessioni terminando la nostra apologia, protestiamo, che poi, qui sequimur probabilia, nec ultra id. quam quod verisimile occurrerit, progredi possumus, & refellere sine pertinacia, & refelli sine iracundia parati sumus; ma che le cavate di sangue dal piede, ciò, che più importa di mo-Arare, possano nuocere, quando vi sia minaccia d'ascesso al fegato, o sia esso già fatto, meco consentono gli accennati Autori obbligati dalle stesse mie ragioni. Vedansi le Opere qui sopracitate, c le offervazioni del signor Andouillé in favore di mia opinione nel III. Tom. dell' Accademia di Chirurgia pag. 506., la Differtazione del signor Bordenave de vulneribus capitis. & de venarum sectionis usu, stampata in Parigi l'anno 1755.; la quale è stata pubblicamente difesa nelle scuole di S. Cosimo.






# OPERE DEL BERTRANDI

TOMO I.

PARTE IL

CHE TRATTA DE TUMORI CALDI.





# DISCORSO

PRELIMINARE DEGLI EDITORI

## AL TRATTATO DE TUMORI

E IN FARTICOLARE

AI TUMORI INFIAMMATI.

Antichissima è la distinzione delle malattie Cerusiche in tumori, in ferite, in ulcere, e in malattie delle ossa; il Ber-TRANDI l' ha adottata non meno pel comodo degli Studenti, che per conformarsi all' uso comunemente ricevuto nelle altre Università. E' vero, ch' egli avrebbe potuto seguire la distribuzione metodica de' morbi, di cui il SAUVA-GES avea già dato uno schizzo sin dall' anno 1732. (a), poi nuovamente nel 1739. (b), indi ampiamente spiegata,

(b) Pathologia methodica, seu de cognoscendis morbis. Monspelii 1739, in 8.



<sup>(</sup>a) Nouvelles classes des maladies dans un ordre semblable à celui des Botanisses, comprenant les genres, & les especes. A Avignon 1732 in 8.

ed eseguita nella dottiffima sua Nosotogia methodica sistens morborum classes, genera, & species, juxta Sydenhami mentem, & Botanicorum ordinem, pubblicata in Lione nel 1763. Ma tale distribuzione difficilmente può essere guita in un Corso di Chirurgia, non tratta di tutte le malattie, ma solamente delle esterne, ed è poco adattata alla capacità de' giovani allievi, oltrecchè (a dir vero ) malgrado le correzioni, e le aggiunte fattevi dai celebri SAGAR, CULLEN, VITET, altri, ella è molto difettosa, come benissimo osseri nella -Prefazione al III. Vol. delle sue Instituzioni di Medicina pratica. Più che in altro Trattato in questo de' tumori ha il BERTRANDI seguitato un ordine metodico, avendoli distinti in tre Classi, cioè in tumori umorali, in sarcomatosi, e in erniosi, e le Classi in Sezioni, ordini, e generi; le spezie, e le varietà trovansi descritte, e notate sotto il rispettivo ger nere. Dobbiamo però ingenuamente confessare, che i caratteri assegnati versi generi, e spezie sono lontanissimi da quella precisione, e certezza, che i Botanici hanno saputo osservare ne' generi, e nelle spezie delle piante; anzi neppur esatta è la distinzione de tumori nelle accennate tre Classi, da che, rigorosamente parlando, i sarcomatosi sono veri tumori umorali. Checchè ne sia pero di questa Classe, ognuno troverà naturali le altre due, che comprendono i tumori umorali, e gli erniosi, e naturalissima la distinzione degli umorali nelle due sezioni di tumori caldi, e di tumori freddi. Non sapremmo dir lo stesso della divisione de' caldi, ne' quattro ordini, che sono de' tumori flemmonosi, degli erisipelatosi, degli ascessi interni, e della cancrena. Questa divisione è puramente artifiziale, ed arbitraria; ma chi non sa, che i Botanici stessi sono costretti d'introdurre ne' loro sistemi moltissime cose artifiziali?

Questo Trattato è stato dettato dalla Cattedra l' anno scolastico 1761.-62., e nuovamente nel 1764.-65., nel qual ultimo anno vi aggiunse il capitolo degli ascessi interni, il quale, se non c'inganniamo, sarà dagl' intendenti considerato come un capolavoro. Nella Sezione de' tumori caldi, o sia infiammati sarà da tutti ( fperiamo ) commendata la bella teoria dell'infiammazione, perchè aliena da ogni ipotesi, e fondata sulle fole offervazioni anatomiche, e patologiche. Sonvi inoltre in questa Sezione molte cose essenziali, e proprie dell' Autore, le quali dall'erudito Lettore saranno facilmente distinte; noi ci con-

BERTRANDI TUM. TOM. L.

tenteremo di accennarne una, o due. Per esempio al n. 196. nota (a) facciamo notare, come qui il BERTRANDI annoveri tutt' i segni, che indicano un travasamento nella cavità del petto, alcuni de' quali dal dotto signor VALEN-TIN (a) sono rapportati come non cora da chiccheffia offervati. Vedafi nel numero seguente, qual profitto sappia egli trarre dalle più minute cognizioni anatomiche per ispiegare l'ascesso del petto offervato dal Foubert tra la cartilagine xifoidea, e il margine cartilaginoso dell'ultima vera costa, e delle due prime false ( ascesso, che era stato preso da molti Pratici qual ernia ventricolo), e si capirà, se han ragione coloro, che sprezzano quasi inutili fiffatte cognizioni. Lo stesso dicasi dell' ascesso del fegato osservato dal PETIT siglio, e rammentato al n. 203. pag. 125.

Nel IV. Tomo della Reale Accad, di Chir. di Parigi a pag. 545. il celebre DE LA MARTINIERE ha fatto inferire una sua erudita Dissertazione sur l'opération du trépan au sternum, nella quale tra i vari casi, ne quali deesi trapanare quell'osso, meritamente annovera anche quello di un ascesso formatosi

fotto

<sup>(</sup>a) Recherches crisiques sur la Chirurgie moderne.

sotto di esso tra le due lamine del mediastino in conseguenza della infiammazione di quel tramezzo. REALDO Co-LOMBO è stato per avventura mo a dire, che, quando nella doppiatura del mediastino havvi raccoglimento di pus, di acqua, 0 umore, bisogna loro dare esito operazione del trapano (a): Mais je lui voudrois volontiers demander ( riflette molto a propofito il buon Ambrogio Pareo (b), comment nous cognoistrons que tel humeur y soit contenu? Per soddisfare pertanto alla domanda del PA-REO ecco i segni, che dà di tale ascesso il De la Martiniere (c): Les signes de l'abscès du mediastin, produit par cause interne, se déduiront de la considération des symptomes, qui auront primitivement manifesté l'inflammation de cette partie, & des signes rationels, qui en indiqueront la terminaison ration purulente, tels sont la remission des symptomes inflammatoires, pendant que le malade éprouve des frissons irrè-guliers, & autres indicés locaux, qui pourront ne pas échapper à un Praticien éclairé. Ora si paragoni il diagnostico di

<sup>(</sup>a) De re anatomica lib. x1. cap. 3. (b) De l'Anatomie liv. 1v. chap. v11.

<sup>(</sup>c) Acad. Royale de Chirurg. Tom. 17. pag. 556.

questa malattia quì recato dal DE LA MARTINIERE con quello, che ne dà il Bertrandi al n. 199., e sarà facile il decidere, chi dei due abbia meglio soddisfatto al voto del PAREO. pure, com' egli individua prima dello Scrittore Francese i casi, ne' quali quell' ascesso si può evacuare senza l'operazione del trapano, e quanto sia utile l'avvertimento, che dà, di aprir tostamente gli ascessi, che qualche volta si fanno al timo, e che sogliono manifestarsi alla parte inferiore della gola, affine d'impedire, che la marcia non spanda al di sotto dello sterno, com' è accaduto al Cocchiere, di cui narrasi la storia a pag. 552. di detta demia .

Ma perchè i segni dell' ascesso fattosi sotto quell' osso debbonsi principalmente ricavare da quelli della preceduta infiammazione del mediastino, noi qui gli addurremo. Il FREIND nella sua Storia della Medicina pag. mihi 241. sa osservare dopo il Zacuto (a), che il primo, il quale abbia satto menzione di quella insiammazione, come di morbo essenziale, è AVENZOAR (b): i segni, che ne dà, sono

<sup>(</sup>a) De medicor. principum historia lib. 2. histor. 23. (b) Nel suo Libro intitolato Reclificatio medicaminis, & regiminis cap. 63., & 65.

sono una tosse continua, un leggier dolore, che si stende d'alto in basso per la lunghezza dello sterno, la respirazione difficile, frequente, e piccola, la febbre acuta, il polso duro, e inuguale con una grandissima sete. A questi fegni Pietro Salio Diverso, di Faenza, aggiunge un eccessivo calore nel torace, doloris nihil fere nisi in sterno ( non già come dice il DE LA MARTINIERE ibid. (pag. 334.) une petite douleur partout excepté au sternum); quo in loco molesta potius angustia, & interclusio, quam in spirando dólor, sentitur. Soggiunge, che questa infiammazione si distingue dalla pleuritide per la sede, e per la minore acutezza del dolore, dalla peripneumonia, perchè la respirazione è meno difficile. Se all'infiammazione del mediastino si aggiunge quella del pericardio, come sovente accade, allora i mentovati segni sono più intensi, e inoltre succedono frequenti fincopi, e palpitazioni di cuore (vedete Petri SALII DIVERSI curat. morbor. particular. pag. 225.) Il MORGAGNI vedendo, che il SALIO tra i segni della infiammazione del mediastino mette costantemente una certa molestia, stringimento piuttosto, che un vero dolore allo sterno, domanda, perchè stessa molestia dolorosa non pruovasi ugual-

ugualmente al dorso, dove il mediastino va ad attaccarfi, come fi attacca allo sterno. Risponde ciò poter dipendere, o perchè sia più frequente, e conseguentemente meglio osservata l'infiammazione della parte anteriore del mediastino (a), o perchè le vertebre nel tempo della respirazione muovansi molto meno, che lo sterno (b). Non sempre però nella infiammazione del mediastino si offervano tutt' i mentovati segni; qualche volta, essendo essa di tura cancrenosa, e suffocativa, ammazza in pochissimo tempo l'ammalato, come è accaduto al Medico Trombelli, di cui è riferita la storia nel Tom. part. I. pag. 187. dell' Accademia di Bologna. È queste poche ristessioni bastino per la prima Sezione de' tumori umorali. Al principio del II. Tomo ne metteremo alcune altre riguardanti i tumori freddi, e il rimanente di questo  ${\it Trattato}$  .

N. B.

<sup>(</sup>a) De sedibus, & causts morbor. Epist. XXI. ad stnem, n. 46.

<sup>(</sup>b) Ibid. Epift. xx. n. 12. Il VVansvvieten Commento in aphor. Boerhaave tom, 111, pag. 57. edit. Taurin. marra la storia di un ascesso sattosi sotto lo sterno dopo una pleuritide, la cui materia corrose quell'osso, e si aprì la strada per gl'integumenti: il malato ne guarì, ma vi rimase una sistola.

N. B. Ai 24. di Luglio, mentre eravi ancora l'ultimo foglio di questo primo Tomo da stamparsi, ci arrivò il primo Tomo dello Instituzioni di Chirurgia del signor Giuseppe NESSI Professore di ostetricia, e Înstituzioni Chirurgiche nella Regia Università di Pavia, ivi stampato 1786. in 8., il qual Tomo già avevamo veduto annunziato negli Opuscoli di Milano. Da tutto il contesto dell'Opera, e da molti squarcj della medesima si vede, che il chiarissimo Autore, forse nel tempo, che soggiornò parecchi mesi in Torino, ha letto i MSS. del BERTRANDI, e certamente noi avremmo giusto motivo di dolerci, che mui non lo citi, se nella Prefazione non avesse addotte le ragioni, per le quali ha creduto di non dover citare nessun degli Auzori, ai cui fonti ha bevuto.

In iis negotium majus est, qua per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem speciant. Ea omnia genera abscessum sunt. Cels. de Medic. lib. VIII. cap. II.

Errori occorsi nella Dissertazione de hepatis abscessibus.

Errata .

Pag. 194. lin. 12. discripseram Pag. 196. lin. 9. fluidim Pag. 198. lin. 10. habita

>:

defcripferans. fluidam . abit .



# TRATTATO

DE' TUMORI.



DE' TUMORI IN GENERALE.

1. CIASCUNA parte del corpo animale ha un determinato volume, massa, e figura. Tumore nella Patologia Cerusica è l'eccesso della naturale estensione di qualche parte, per cui la figura n'è sempre cangiata, e non di rado anche l'azione viziata.

Definizio-

ne del sus

2. I tumori (1) sono prodotti o dagli umori del corpo, che in alcuna parte troppo abbondantemente si portano, e si raccolgono, e questi diconsi tumori umorali: fra i quali quelli, la cui materia si trova rinchiusa in una vescica, o, come dicesi, in un follicolo, tumori follicolati, o cistici sono chiamati: o sono prodotti da ricrescimenti di sostanze, e allora erescenze si appellano sarcomatose, adipose, ossee ec., o da parti, che, lasciato il loro sito naturale, sono passate ad occuparne un altro non pro-

Cagioni congiunte de' tumori a prio, come accade negli slogamenti, nelle fratture scomposte delle ossa, e nelle mutazioni di sito d'alcuni visceri, od organi, che in certi casi ernie, in altri procidenze si addomandano: o da corpi estranei, che introdotti in qualche parte più, o meno la distendono, come da palle d'archibugio, da chiodi, da pezzi di legno, e simili: o sinalmente (ciocchè più raramente accade), da un vapore aereo, e questi si chiamano tumori slatulenti.

Cagioni an-

3. Queste sono le cagioni congiunte, e materiali, che immediatamente formano i diversi sumori. Le primitive, o antecedenti sono o i vizi degli umori, che peccano in quantità, in qualità, o nel moto, o i varj difetti organici delle parti, le quali cagioni o internamente per certe, come diconsi, spontanee mutazioni inforgono, o dall'esterno sono promosse, è in generale possiamo dire, che la cagione predisponente de' tumori è l'eccesso delle sorze delle parti contenute, cioè dei fluidi sopra la contrattilità, e la refistenza delle contenenti, cioè dei folidi, sia che essi sluidi siano stati antecedentemente viziati, come dicevamo, onde abbiano per se stessi vinta la resistenza de solidi, fia che questi abbiano prima patito nella loro struttura organica; il che meglio dimostreremo trattando di ciascun tumore in particolare.

Segni gene-

4. Il segno generale de' tumori è l'apparente maggiore estensione della parte (1), paragonata al suo natural volume, e simmetria, secondo l'età, e la natural forma del soggetto. I segni patognomonici poi, che caratterizzano ciascun sumore, sono vari, come i tumori stessi, di maniera che non si possono esporre in generale.

7. Se la materia, che forma il tumore (2), non è di cattiva qualità, dicesi benigno, e se ella è maligna, maligno è il tumore, o anche pestilenziale, se da una pestilente insezione dipende. Se i tumori sopravvengono ad un' altra malattia con alleviamento della medesima, appellansi critici, se con aggravamento, sintomatici .

Distinzione tumori iti benigni , maligni, pe-stilenziali, eritiei, e fins tomatici "

6. Quattro sono i tempi de tumori, cioè il principio, che è quando la materia comincia soprabbondare in una parte! l'aumento, quando quella sempre più accumulandovisi, il tumore continuamente cresce, ne ancora è circoscritto in limiti terminati, anzi, a mistira che si spande, sempre maggiori fintomi produce: lo ftato, quando essa materia persiste costantemente in quella quantità, a cui è pervenuta in tutto il tempo dell' aumento, niente crescendo, nè scemando i sintomi: la declinazione, quando, rifolvendosi, o evacuandosi la materia, colla gravezza de fintomi anche il volume del tul more diminuisce. Ne' tumori caldi (42) il principio, e l'aumento con somma prestezza si seguono, nè lo stato dura molto; allo 'ncontrario ne' tumori freddi ( ibid. ) ed ancor più in quelli, che fono prodotti dal crescimento di una nuova sostanza (2).

I tempi de tumori sono quattro : Principio . Aumento.

Stato, 6

Declinazios

7. Sei sono le terminazioni de tumori, cioè risoluzione, suppurazione, retrocessione, mortisicazione, induramento, ed esulcerazione.

8. Dalla necessità, o possibilità dell'una, o dell'altra di queste terminazioni (7) si dee trarre il pronostico buono, o cattivo, dovendo conseguentemente la cura riescire o breve, facile, e felice, o lunga, difficile, e di cattivo esito.

Le terminasei, e qualia

Pronostico.

La rifoliziore quando fi debba tentare. 9. De' tumori benigni (5) si dee sempre tentare la risoluzione (16), la quale però ne riesce anche difficilissima, se la materia è trattenuta in gran quantità, e suor de' vasi, dovendosi allora sin da principio quasi sempre tentarne la suppurazione.

Quando la juppurazio-

10. I maligni siano critici, o sintomatici (5), e i pestilenziali si debbono sempre muovere alla suppurazione (17) per trarre dal corpo la materia, che può nuocere (21).

La retrocesfione perchè si · debba schivare. ri. La retrocessione, se è possibile, deess sempre evitare; conciossachè alla materia retrocessa non sempre selicemente si apre la strada per sudore, per gl'intestini, o per la via delle urine, onde non si abbia a temere, che non resti dissua nel sangue, per cagionar maggior turbolenza, ed insezione (sendo sempre maligni i tumori, che sogliono retrocedere) o che non vada ad arrestarsi in qualche altra parte con molto più grave pericolo (21).

La rifoluzione, e la retrocessione cosue si facciano. 12. La risoluzione, e la retrocessione sono fatte per le stesse azioni meccaniche, cioè per l'assorbimento nelle vene della maggior parte del liquido, che sormava il tumore; il qual liquido, se si rimette al circolo, nel primo caso (9) l'umore buono si assimila col sangue buono, nell'altro (11) l'umor cattivo guasta il sangue, che ancor sosse buono, o lo rende peggiore, se già era tutto guasto, massime se non accade qualche evacuazione, onde si espurghi; e perciò si perde il vantaggio della crissi, se il sumore era critico (5), e s'aggrava ancor più la malattia, s'era sintomatico.

La mortificazione perchè 13. La mortificazione di una parte dee non meno evitarsi, che la morte del tutto, non potendosi così facilmente sperare di regolarne i termini, quantunque cominciasse in luogo meno pericoloso, e meno importante (22).

'14. L'induramento (23) si dee anch' esso evitare; ma qualche volta fatto ch' essi è irresolubile, è necessario di promuoverso, e di sostenerso, se non è possibile, o permessa l'essirpazione del tumore (39), acciocchè non ne accada l'esulcerazione (7).

Cosi pure l'induramento.

15. Questa è anche una pessima terminazione, perchè è sempre l'essetto della pervertita natura degli umori, che dissicilmente si può cangiare assatto, onde alcusta volta sia meglio averne una qualunque evacuazione. L'etiologia, i modi meccanici, e gli essetti di queste tre ultime terminazioni (13.14.15.) saranno espossi negli articoli della cancrena, dello scirro, e del cancro.

L' esuicerazione è una pessima terminazione.

16. Quando dunque la materia di un tumore è di buona qualità, nè raccolta in troppa copia, nè con troppo impeto, ed i vasi sono nè troppo rilassati, nè troppo resistenti, se ne può sperare la risoluzione (9). Questa si conosce, vedendo il tumore diminuire a poco a poco nello stesso tempo, che anche scemano i sintomi; la parte è meno tesa, meno resistente, ed al color naturale sempre più si avvicina, sino che il tumore affatto svanisce.

Segni indicanti la nifoluzione

17. Siccome la cattiva qualità della materia, che produce il tumore, e la gran copia, ed il forte impeto, con cui fi è raccolta, deono obbligare il Cerufico a tentarne la fuppuraziona (9. 10.), così gli faranno prevedere, che facilmente vi fi determinerà, principalmente allor quando vedrà, che l'umore quafi ad un centro fi accumula; che quivi la durezza, la renitenza, il calore, la pulsazione divengono maggiori, e che il colore fi fa più intenso; e quanto più crescono questi accidenti, e si fanno sentire in un determinato luogo del tumore, tanto più sarà imminente la suppurazione, mas-

La suppure zione, che & ta.

sime se il dolore si sa più acerbo, e sopravviene, o cresce un' interna perturbazione colla sebbre: Dum pus consicitur ( disse suppose colla sebbre: Dum pus consicitur ( disse suppose supp

La fatta .

18. Quindi a poco a poco gli accennati fintomi diminuiscono, la parte diventa molle, bianca, alcune volte appuntata, col tatto sentesi l'ondeggiamento della materia, ed allora il tumore dicesi ascesso, od apostema (b).

19. Non sono però sempre tanto chiari i sintomi della suppurazione; ma alcune volte, producendosi essa piuttosto per lo scomponimento spontaneo della materia stagnante, per cui si sa putrida, ed i sodi essendo inerti, leggierissimi sono que sintomi della suppurazione, che si sa (17), e appena sensibili i segni della già satta (18).

Segni della marcia buona , 20. La materia della suppurazione, per essere buona, debb' essere uguale, biança, non molto

(a) Aphor. 47. sect. 11. Dolores, & sebres contingunt magis circa puris generationem, quam eo confesto.

(b) Questo è il senso, che si dà comunemente a' nostri giorni alle parole ascesso, e apostema; non crediamo però inutile l'avvertire per l'intelligenza degli Scrittori antichi, che essi sotto il nome di ascesso, o di apostema non intendevano già il tumore suppurazio, ma qualunque tumore umorale tendente alla suppurazione. Ciò si ricava da più luoghi di Celso, come dal seguente: Si quid etiam abscessi, & antequam suppuraret, subsedit (cap, y. lib. 2, pag. 63.); e ancor più da quest' altro (lib. 5. cap. 18. pag. 326.) Sed quum omnes hi (avea parlato del suroncolo, del sima, e del sigetlo) nihil nisi minuti abscessiu sint, generale nomen trastit latius vitium, totum ad suppuratione pem spessars.

fetente, aver consumata, ed ammollita la maggior parte del tumore, ed essere raccolta tutta in un alveo e cattiva è la icorosa, la giallognola, la verdastra, e la negricante (a).

21.

(a) Circa la buona, o cattiva qualità delle diverso spezie di marce leggasi nel Trattato delle ukere l'articolo delle ulcere in generale. In ogni tempo si è incontrata moltissima difficoltà a spiegare la natura, e l'origine del pus. Questo umore, perchè é sempre accompagnato da un qualche benchè leggiere puzzore, e per certe altre sue qualità, vedesi, che si approffima alla natura degli umori corrotti, e putrefatti; ma se si bada poi all' indole sua blanda. mite, dolce, e quasi balsamica, al suo colore bianco, e alla sua consistenza crassetta, e uguale, non gli si può negare una natura propria, e specifica di gran lunga differente da quella degli altri umori corrotti. Quasi tutti i Medici, e Cerusici hanno per lungo tempo creduto, che il pus fosse prodotto dall' azione accresciuta delle forze vitali, e quindi spie-gavano, perche ne tumori caldi, ne quali, come vedremo (44. e feg. ) quelle forze sono sempre accresciute, così sovente si generi il pus. Il chiarissimo PRINGLE è stato il primo a dimostrare con esperimenti convincentissimi, che senza il concorso dell'azione vitale, esposto al suoco di digestione, si separa dal siero del sangue un sedimento, che ha tutte le qualità della vera marcia ( vedete il fuo eccellente Traité sur les substances septiques, & antiseptiques tom. 11. pag. 278. & suiv. ) Il nostro celebre GABER poi. avendo ripetute, moltiplicate, e diversamente variate le sperienze del PRINGLE, non solamente con esse ne ha confermato la dottrina, ma dilucidati. inoltre diversi punti essenziali riguardanti la generazione del pus, e provato, che la sola parte albumi-nosa del siero è quella, che lo sorma, che in niente vi concorre la parte cruorosa del sangue, come neppure la pinguedine, la bile, o gli altri umori, e nep-pure le parti fode del corpo. Intende però egli parlare della marcia pura, e schietta, non negando, che quegli umori, e quelle sostanze sode più, o meno putrefatte vi si possano aggiungere, ma allora la marcia degenera sempre più, o meno dalla sua blanda natura, a proporzione di quel mescuglio, e

Quali tumori fogliano retrocedere. 21. Sogliono retrocedere que' tumori critici, o fintomatici, de' quali la materia è maligna, e questa, come accennai, (11.12.) o si diffonde

della maggiore, o minore putrefazione di que' corpi eterogenei. Un esempio evidente ne abbiamo negli ascessi del segato, de quali quelli, che si fanno nella cellulosa della sua tunica, sogliono produrre un pus di buona qualità (208), allo 'ncontrario quelli, che ne occupano la sostanza parenchimatosa, mai non danno una schietta marcia, ma una materia di diverso. colore, e consistenza, quasi simile alla seccia del vino (203). Che poi neppure nel corpo animale vivente non sia necessaria l'accresciuta forza vitale alla generazione del pus, lo dimostrano la prestezza, e la quantità, che non di rado se ne forma in certi tumori senza precedente infiammazione nè locale, nè universale, e ciò può anche far credere, che non sempre il pus si generi nel tumore stesso dal siero travasato, e stagnante, ma che vi possa essere porcato già bell', e formato dentro de' vasi medesimi. Vedete, nelle Miscellance di Torino tom. 11. pag. 80. Johannis Baptista GABER experimentorum de putrefactione humorum animalium specimen secundum, e specimen terfium nel terzo tomo. Questa dottrina sondata su tante ingegnose sperienze è stata abbracciata da molti dottissimi Scrittori, e tra gli altri dal Cullen ( Infieutions de Médécine pratique tom. 1. pag. 121.), Ernesto Platnero nel primo supplemento alle institugioni cerusiche del Padre pag. 29., e seg. Il BRAMBIELA però nel suo Trattato sopra il slemmone parte 1. pag. 244. fa una lunga riflessione per combatterla, facendone Autore, oltre il PRINGLE, ed il GABER, anche il . CIGNA, il quale non ha, che si sappia, mai trattato di questo argomento. Le ragioni addotte dal BRAM-BILLA fono, che avendo esso ripetuti gli esperimenti del Pringle, e del Gaber sopra la crosta flogistica di alcuni pleuritici, la materia, che dalla sua corruzione ne nacque, era biancastra, ma lontana dall'essere il ve-70 pus. Anche al GABER sembro ne' suoi primi esperimenti di offervare una tale differenza ( loc. cit. tom. 11. pag. 91. n. 26. ), e perciò avea confutata l'opinione del Quesnay, e di altri celebri uomini, che avevano detto la materia del pus effere la stessa. she quella della crosta pleuritica, ma poi con nuovi

fonde, e si rimescola con tutta la massa degli **umo**ri , éd allora i fintomi della malattia principale vedons crescere, e divenire sempre più pericolofi, quanto più il tumore diminuisce, o la stessa materia a qualche altra parte si deter-. mina, e vi fi raccoglie, e secondo il suo uso. e struttura vari sintomi produce, come delirio, convulsione, affezione soporosa, se si trasporta al capo, e se ai polmoni, difficoltà di respiro. ansietà, palpitazione, e sputo di sangue, d' icore, o anche di marcia; itterizia, dolore, tensione all'ipocondrio destro, singhiozzo, e vomito. se al fegato ec., e in questi casi il tumore dicesi terminato per metastasi.

22. Quando que' fintomi, che dicemmo in- 'Segni dell'a dicare, doversi fare la suppurazione (17), non mortificaziofi determinano ad una data parte del tumore, ma tutta la massa ne occupano con somma durezza, tenfione, calore, e pulsazione, divenendo il colore della cute oscuro, violaceo, e finalmente livido, il peso della parte crescendo, e il calore, e la sensibilità diminuendo.

esperimenti si convinse del contrario, e da uomo ingenuo, com' egli era, si ritratto nel terzo suo Saggio. "Non v'è dubbio, soggiunge il Brambilla, che , la parte sierosa, la più inerte, e la più glutinosa , del fangue cagiona lo fcirro: questo adunque più , d'ogni altro tumore passar dovrebbe alla suppurazione." Se il Brambilla avesse letto attentamente il secondo Saggio del GABER, avrebbe veduto, che ha risposto appieno a questa sua obbiezione, poiche alla pag. 89. num. 20. dell'accennato Tomo di quelle Miscellance dice, che, lasciato il siero per lungo tempo in riposo in un vase chiuso ermeticamente, fe ne diffipa tutto il sedimento puriforme, rimanendovi in suo luogo nel fondo del vase minutissimi frammenti, quai sabbie, di una sostanza calcare, e poi dubbioso domanda:. An ex ea colcarea materio Ikirri origo est explicanda?

egli è segno della imminente morificazione; ancor più se sulla superficie del tumore si ele-vano vescichette piene d'icore, o sentesi col tatto una spugnosa mollezza, da cui esala un odore cadaverico.

Dell' incitamenta 23. L'induramento de tumori umorali fi conosce dal vedere, che, come diminuisce il tumore, cresce la sua durezza, e solidità, dirninuiscono, e insine assatto cessano i sintomi, che
possono dipendere dal movimento de liquidi,
e dall'azione de vasi, e la parte satta quasi indolente sempre più si avvicina al color naturale.

Della efulceragione. 24. La esulceragione (15) suol essere il termine delle rispole maligne (161), e di alcuni tumori duri (14), e questa dipendendo dalla corruzione dell' umore, e dalla viziata azione organica della parte è sempre, come ho già detto (15), una pessima terminazione: si screpola, si rode, e si consuma la cute, sorge una sostanza sungosa più, o meno dura, divisa in maggiori, o minori masse disuguali, inverniciata, e grondante una marcia icorosa, rodente, e setente. Le screpolature delle buganze (a) sono piuttosto l'esserto d'una leggierissima cancrena, ancor più quelle de' carboncelli (177); quelle poi del fuoco sacro (161) sono piuttosto simili alle scottature.

Modi di aprire gli escefi.

25. I timori suppurati (18), se non si aprono da se, deonsi aprire coll'arte, e quest'apertura si può fare in due maniere, cioè col caustico attuale, o potenziale, o collo strumento tagliente.

In quali cafi convenga il conflico. 26. Il caustico, quantunque agisca con maggior dolore, in più lungo tempo, e con maggior

<sup>(</sup>a) Ved. il capit. ult, del Trattato delle ulcere.

gior guaftamento di sostanza, nulladimeno è da preserirsi in que' tumori, i quali per la lentezza, e craffezza degli umori, e per l'inerzia della fostanza organica difficilmente possono pervenire ad una perfetta maturazione, quantunque necessaria; o che hanno bisogno d'una lunga, e copiosa suppurazione, o quando si dee consumare una qualche sostanza, che forse mai non suppurerebbe, nè si potrebbe altrimenti togliere, come dimostreremo ne' casi particolari .

27. Il caustico attuale, date le sopraccennate In quali il circostanze (26), si dee preferire in que'casi, dove si temerebbe lo spandimento del caustico potenziale (28), perchè non vi fosse modo di appoggiarlo, e contenerlo, o perchè la sua lunga azione potesse nuocere, o vi fosse per ogni ritardo pericolo di retrocessione (21), come suole accadere in alcune parosidi suffocati-

ve ( 95. 99. )

28. Tra i caustici potenziali soglionsi usare Quai caustila pietra infernale, e piuttosto la preparata col usaresi pesrame, la quale, più facilmente sciogliendosi, più prestamente agisce: ancor meglio convengono le altre pietre caustiche preparate colle ceneri clavellate, o colle semplici ceneri di sarmento, e colla calce viva, o con questa, e col lissivio di sapone. E questi caustici sodi in forma di pietra si deono preferire, quando vi sono durezze da intaccare: negli altri casi può bastare un caustico estemporaneamente composto con egual porzione di sapon molle, e di calce viva ridotta allora in polvere.

29. Per applicare il caustico potenziale si copre il tumore con una pelle spalmata d'un impiastro attaccaticcio, quale sarebbe il diaquilon composto, o altro: la pelle debb' essere aperta in mezzo per quell'ampiezza, che si desidera caustico 4t-

ci potenziali

Maniera di applicarli,

bruciare, che farà maggiore, o minere secondo il volume del tumore: 'dee l'apertura corrispondere a quel luogo, dove è già accumulata la marcia, dove può avere una più facile uscita; dove con maggior profitto si abbrucia, maggior fostanza consumando, e quella principalmente, che più difficilmente suppurerebbe. Ben attaccato l'empiastro, si applica in mezzo l'apertura la pieera caustica (28) in grossi frammenti rotta, oppure anche intera, ove siavi maggior fostanza da abbruciare, si copre con filaccica, o con cotone, poi fi applica sopra un altro pezzo di pelle intero, e spalmato dello stesso empiastro, il quale si estenda alquanto oltre la base del cumore, e vi si attacchi ben disteso, e fermamente: vi si soprappone una compressa, ed il tutto si contiene colla convenevole fasciatura, raccomandando al malato di tener la parte ferma, perchè non pericoli di fare sidrucciolare il caustico.

Tempo di toglierli.

30. Quando se ne conosca il valore per isperienza, si saprà il tempo, in cui potrà essere stata stata l'escara pel totale discioglimento del caustico. Allora si scioglie l'apparecchio, si ripulisce la superficie del tumore, e se l'escara non s'è screpolata, si aprirà col serro, o si romperà col dito, per dar esito alla marcia. L'azione del caustico produce anche un'instammazione allo intorno dell'escara, più, o meno ampia, della quale si dee proccurare la suppurazione, tanto più, che per averla più abbondante si suole esso applicare (26).

Precauzioni da aversi nell' applicargli, e dopo avergli applicati. 31. Nell'applicarlo bisogna evitare i vasi di qualche diametro, perchè colla caduta dell'escara non possa accadere emorragia, e se mai il caussico avesse penetrato ad offenderne alcuno, si conghietturerà da una forte, ondosa, e limitata pulsazione, che il malato sente in al-

cun luogo; ed allora coi disseccanti, ed astringenti si proccurerà di mantenere sempre più soda l'escara, sino che incallisca, e si restringa l'estremità del vase leso, e il sangue si aggrumi (a), per togliere ogni pericolo di emorragia. Come lungi da'vasi, così anche da'nervi, da'tendini, e dalle aponeurosi si applicherà il caustico, perchè il malato non resti storpio, e per evitare le gravissime insiammazioni, gli ascessi, le convulsioni, ec., che alla lesione di quelle parti sogliono succedere (b).

32. Se non v'è pericolo di emorragia (31) fi proccurerà, il più presto, che sia possibile il totale distaccamento dell'escara, con sar suppurare l'insiammazione, che abbiam detto sarsi attorno la circonserenza della medesima (30). Fra pochi giorni si vede comparire un solco bianco tra l'escara, e la parte sana, donde quella per qualche parte si distacca, sicchè poi,

traen•

<sup>(</sup>a) Nel Tratt. delle ferite capit. 2. è diffusamente spiegato il modo meccanico, onde la natura si serve per arrestare l'emorragie, modo, che qui è semplicemente accennato dall' Autore.

<sup>(</sup>b) Ohre ai vasi ragguardevoli, che si deono preservare dall'azione del caustico, bisogna anche badare nell'applicarlo a quelli di minor diametro, che si possono incontrare nel tumore. Questi corrosi spandono non di rado sangue, che serve di mestruo, e di veicolo al caustico stesso, il quale va qualche volta ad offendere parti effenziali, o almeno fa guasto, dove non dovrebbe. Da un caustico applicato sopra un bubone venereo abbiam veduto corrola buona parte dello scroto, e scoperto il testicolo di quel lato, e un' altra volta prodotta un' amplissima ulcera alla faccia interna della coscia. Se pertanto non si possono que' piccoli vasi difendere dall'azione del caustico, si applichi almeno un addattato, e sufficiente apparecchio per impedire lo spandimento e del sangue, e del caustico.

traendola colle molle, facilmente segue, o st recide colle forbici.

33. In alcuni casi conviene prima aprite col ferro il tumore per quella parte, che già suppurò, ed il rimanente co' cateretici, e co' caufiici si dee consumare, perchè non sarà possibile, come già accennammo, di altrimenti muoverne la suppurazione a cagione dell' inerzia dell'organo, e della spessezza del sumore; nè il taglio allora ad altro serve, che per portare immediatamente su quelle parti il caustico.

34. Il Cerufico non dee mai far uso di alcun caustico potenziale, sensa conoscerne la. composizione, e per pratica l'azione, per non esser sorpreso dalla sua veemenza, od inessicacia: nè mai se ne faccia impostura, quantunque moltissimi sieno i modi di prepararli: si usino con molta discrezione gli arsenicali, e i enercuriali, non solo pel veementissimo essetto, che possono produrre alla parte, ma anche perchè possono essere facilmente trasmessi al sangue.

I modi di applicare il caustico attuale saranno spiegati nel corso di questo Trattato (a).

Moda aprire ferro.

35. Quando l'apertura de' tumori suppurati si dee fare col taglio (25), facciasi nel luogo più molle, fotto cui fiavi la marcia, nella parte più declive, ond' essa possa più facilmente colare, e facciasi proporzionata al volume del tumore, per lo più tagliandone tutta, o quafi tutta la volta, che fu distaccata dalle marce: si segua la direzione de' muscoli, si suggano i vasi sanguigni, i nervi, e i tendini: riguardo alle aponeurosi è alcuna volta necessatio di tagliarle, quando le marce si sieno raccolte

<sup>(</sup>a) Vedasi tra gli altri il S. del Bubone n. 102.

colte fotto di esse, e si debbono tagliare in croce, o a foggia di T, per togliere lo stiramento, che può recare gravi fintomi, e per dare un più facile esito alle marce.

36. Se il loro cumulo fosse in grande quantità, non si facciano uscire tutte in una volta. che il malato potrebbe cadere in fincope (a). E neppure converrà in fimile caso aprire il tumore per tutta la sua lunghezza (35); conciosfiachè con grave danno fi scoprirebbono sovente certe parti, che dovrebbono essere meglio custodite, e difese: si faranno piuttosto col tempo contro-aperture, o s' introdurranno fetoni,

come ne' propri luoghi insegneremo.

37. Evacuata o tutta, o folamente in parte la marcia, si riempia mollemente di stuelli il fondo dell' ascesso, per non produrre un maggiore discostamento delle parti. Si useranno poi i digestivi, gli astersivi, e i cateretici secondo le durezze, e le sordidezze, che vi possono rimanere; e se si vedono lembi di sostanza cellulosa imputriditi, e già qualche poco distaccati, fi taglieranno senza aspettarne la naturale separazione, che sorse tarderebbe troppo a farsi.

38. Il tempo di aprire gli ascessi è, quando la suppurazione è fatta in tutta, o nella massama parte dell'estensione del tumore, quando si sente l'ondeggiamento della marcia, e vedesi

Precauzioni da aversi , se 'l' ascesso è molto

Medicazio-

<sup>&</sup>quot; (a) Illud jure aliquis mirabitur, quomodo quæ-3, dam simul & affligant nostra corpora, et parte 3, aliqua tueantur. Nam sive aqua inter cutem 3, quem implevit, sive in magno abscessiu multum , puris coiit, fimul id omne effudisse, æque morti-, ferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus, exanguis est." CELS. de Medicina lib. 2. cap. 8. pag. 72. Le ragioni, per le quali accade la fincope, sono addotte dal nostro Autore nel Fratt, delle operazioni cap, della paracentesi dell'addomine.

esso tumore in alcun luogo appuntato, e toe-scasi molle (18), Ma i tumori maligni, e i pessilenziali (5) alcune volte vogliono essere aperti, quantunque non persettamente suppurati, o per alleviare il corpo dalla cattiva materia, che li forma, quanto più presto sia possibile, o per evitare il pericolo della retrocessione (21). Lo stesso si dee sare riguardo a' tumori (qualunque ne sia la natura) nati in vicinanza delle cavità, dei visceri, sopra le articolazioni delle ossa, o nelle parti molto adipose, acciocche non vengano maggiormente guastate le parti vicine, che per l'eccellenza della loro struttura, ed uso non potrebbono, se non con grave danno, essere osses.

Cura pei tumori duri irresolubili.

39. I tumori duri irresolubili, i carnosi prodotti dalla vegetazione di nuova sostanza (2), quelli, che sono organici, come sono i cistici (ibid.), richieggono l'estirpazione, quando il volume, la struttura, il sito, e il carattere del tumore il permettano; che altrimenti la via de caustici è troppo lunga, dolorosa, e qualche

volta pericolosa.

40. In fine ogni qual volta dovrete curare alcun tumore, pensate prima qual terminazione possa egli avere pel suo carattere, per la sua cossituzione, per la causa, che l'ha prodotto, pel soggetto, e per la parte, in cui accade, e secondo queste considerazioni determinatevi da principio, per non perdere tempo, cercando una terminazione o impossibile, o pericolosa. Le cagioni primitive, o antecedenti (3) si debbono togliere, o correggere, e gli accidenti combattere, e allora più facilmente si potranno rimuovere le congiunte (1) con alcuna delle accennate terminazioni, promovendole, e diriggendole secondo la necessità, o la possibilità.

41. Noi incomincieremo questo Trattato da' tumori umorali, dopo i quali passeremo ai sarcomatosi, e quindi agli erniosi, trovandoli in questa maniera quasi naturalmente distribuiti in tre Classi. I tumori ossei, e quelli, che sono fatti dagli slogamenti, e dalle fratture scompos ste saranno riserbati pel Trattato delle malattie delle ossa, e i fatti da corpi estranei per quello delle operazioni a

Ordine, che si segue in

# DE' TUMORI

#### CLASSE PRIMA.

Che contiene

#### I TUMORI UMORALII

A materia de' tumori umorali (2) o con prestezza, ed impeto, o lentamente, e generale de' senza gran muovimento eleva la parte; nel relia primo caso diconsi fatti per flussione, insiammati, o caldi, nel secondo per congestione, o freddi. Avuto pertanto riguardo al maggiore, o minor tempo, con cui la materia si raccoglie ne' tumori umorali, debbonsi distinguere in due Sezioni, cioè in caldi, e in freddi; se ne dovrebbe fare una terza dei flatulenti (che questi pure si possono ridurre agli umorali); ma dell' enfisema, nel quale l'aria è sparsa nel tessuto cellulare sottocutaneo, si parlerà nel Trattato delle ferise, degli altri poi, l'aria de' quali è contenuta în ricettacoli particolari, tratteremo in un co' tumori eistiei. DE.

# DE' TUMORI UMORALI

#### SEZIONE I.

### CHE TRATTA DE' TUMORI CALDI, OSSIA INFIAMMATI.

# De' tumori infiammati in generale.

Segni generalı dell' infiammazione.

Ç., •

44. Dicesi insiammata una parte, quando diventa più del solito calda, rossa, tumida, e pulsatile. Così dicesi infiammato l'uomo pallido, e debole, se per una qualunque cagione diventa rosso in faccia con vasi sanguigni sugli occhi, e sulle guance ora apparenti, che prima non si vedevano; se le arterie in esso si muovono con maggiore celerità, e forza, e gonfiano per ogni parte le vene, se ha la respirazione più frequente, forte, e calda, se suda, e da una maggior forza ammati tremangli gli articoli, e gli arde il corpo. Le forze della vita in quest' uomo sì violentemente, e con sì straordinaria forza allora agiscono, che finalmente caderebbe gravemente infermo, o morto, se tale violenza durasse.

Cagioni.

45. Ma quel tumulto (44) nella macchina può inforgere fenza l'applicazione meccanica di alcun corpo, per esempio per una passione dell' anima: dunque tutti quegli essetti allora dipen-

dono

dono dalla forza sollecitata della vita, che per se stessa tutto il sistema de' nervi, e de' vasi irrita, e commuove, dalla qual irritazione fono con maggior forza spinti i liquidi, ed essi stessi maggiormente gli organi itritano, sicche si raddoppi mutuamente, e in un istante la violenza, e l'impeto degli uni contro gli altri, quantunque prima, come dicemmo, non fosse stata altrimenti offesa la macchina

46. Se un dito, o altra parte viene punta L'infiammada una spina, o altrimenti irritata, quella diventa rossa, tumida, dolente, pulsano le arte- le, o para rie, che prima non si sentiyano, e quivi si ziale. sente un maggior calore, e un dolore, che instantaneamente offende; ma questa meccanica cagione esterna ha solamente potuto commuovere la forza vitale di quella parte, senza offendere l'universale sistema: dunque come l'eccesso d'azione della forza vitale può muoversi in tutto il sistema, e produrre un' instammazione universale (44. 45.); così può anche essere mossa solamente ne' termini di una parte. onde questa sola si veda insiammata: così certe parti di alcuni animali mostrano di avere una irritabilità propria non attenente al fistema universale del corpo, dappoiche si muovono airche separate da questo. Nel Sepolcreto del Bo-NETO si parla di una febbre parziale del braccio destro (a).

47. Alcuni hanno data per cagione perpetua immediata della infiammazione la ostruzione di alcuni menomi vasi, ne' quali non potendo più

(a) BONETI Sepulchiet. tom. 3. pag. 135. la offervazione, che è intitolata Febris brachii dextri particularis quotidiana è stata estratta dalle Miscellance de' Curiosi della natura anno 1673. observ. 205., ed è statz fatta da Andrea Cnoffel.

Perchè la offruzione mon bolls effere la caula immediata dell' mfiammazioil sangue passare, debba necessariamente cresscere l'impeto di esso ne vasi prossimi laterali. . 48. Ma, ammettendo anche per vero 🗸 che la infiammazione soglia succedere alla ostruzione di alcuni canali, dobbiamo però niente di manco confessare, che essa non si può muovere, se non per l'accresciuro stimolo della forza vitale o in tutto il corpo (44. 45.), o nella sola parte infiammata (46); « Imperciocchè la ,, ligatura di un ramo arteriolo ( scrisse il celebre GORTER nel Trattato 47. del suo Compendio della Medicina S. x.) non produce già 🕶 l'infiammazione, ma il diffeccamento, e la » paralifia della parte inferiore, nè fi vede nas scere infiammazione, quando una materia vi-» scida glutinosa ostrue l'arteria. Aggiungasi, m che una minima arteria compressa, od ostrutta non vale per se sola ad accelerare la cir-» colazione nelle altre arterie, delle quali essa » forse non sa la millesima parte. Perchè, sic-🐡 come le velocità ne' molti canali, che ven-» gono da uno stesso tronco, crescono pro-» porzionalmente, come si diminuisce la loto » capacità, questa poca diminuzione non po-» trebbe muovere una maggiore circolazione » sensibile nemmeno ne ramicelli, i quali si » dipartissero dallo stesso ramo; conciossiachè, » come dimostrano gl' Idraulici, un ramo, che » venga chiuso, distribuisce egualmente la ve-» locità per tutti gli altri rami nati dallo stesso > tronco. "

49. In fatti qual potenza può avere la ostruzione, per accrescere il muovimento del liquido superiore, se la parte stessa, che lo manda, e lo contiene, non ha altrimenti acquistata maggior forza? I liquidi agiscono per linee perpendicolari fopra i vafi, ne' quali fono conteauti, e, come da uno schizzatojo, che abbia

due

due, tre, o quattro cannelle, quantunque una, o due se ne chiudano, non uscirà per le altre con maggiore velocità il fluido, se non coll' accrescimento della forza dello stantusso; la stessa legge dovranno seguire i sluidi, che nel corpo animale repentinamente con istraordinaria velocità fi muovano.

50. I sintomi della infiammazione (44) sono tutti d'un muovimento accresciuto, e tanto più grave, e violenta ella è, quanto sono maggiori que' fintomi : s' infiamma un edema, uno scirro, se si aggiunge lo stimolo eccessivo della forza vitale, che la inerte materia commuova, nè questa, quantunque fosse in gran copia, avea potuto produrre la menoma infiammazione : dunque, se la oftruzione in ogni caso ha preceduto. non potrà estere stata, se non causa occasionale, la efficiente dovendo sempre dipendere da quell'accrescimento di stimolo della sorza vitale, la quale agisca per se, onde vincere l'offacolo nato dalla ostruzione, questa potrà medefimamente essere essetto di quello stesso stimolo, che abbia spinto il sangue contro argini, che non fi possano così facilmente vincere.

51. Ogni infiammazione se non si risolve, o fe non suppura; termina in fcirro, od in cancrena (238), ed allora evvi la perfetta inerzia, e stasi; il che è un'altra pruova; che questa. non ha potuto essere la causa efficiente della

infiammazione.

52. L'anno 1703. il BOERAAVE (a) ha deseritti nuovi vasi linfatici, i quali continuati imme. addorri dal

Argomenti BOERANVE delle arterie

<sup>(</sup>a) Questo grand' uomo fece per la prima volta esistenza menzione di queste pretese arterie linfatiche nella sua Orazione De usur ratiocinii mechanici in Medicina, stam- linfatiche. pata a Leiden l'anno 1703. in 8., e poi più ampiamente le descrisse nelle sue Instituzioni Mediche n. 245. B 3

immediatamente dalle arterie sanguigne, di figura cilindrica, di un diametro più stretto del Tolo globo rosso, portassero un tenue umore acquolo, cioè la vera linfa, la quale, fommimilirato il sugo nutritivo alle parti, passate poi come da arteris tinfatiche nelle già conosciute vene linfatiche nodose; e se tali atteria non si potevano dimostrare all' occhio, tento di pruovare la necessità della loro esistenza co' leguenti argomenti di fatto, e di conghierame: fulla cornec lucida, e full'adnata in alcune astalmit fi vedono vafi fanguigni, che prima non apparivano: le arterie fanguigne dell'ares à continuano sopra di essa con tanta sessità. e sempre con ordine di arterie, che chiaridimemente fi vede, che alla fine non dee patez paffare in alcuna parte di effe, se non un una re più tenne della paret cravefe, nelle quai però à può ancor far pallare l'olio di mementina; i vali, pei quali patfa il fago dei mere. e si: trermateri de tellicoli, quei, che il Leui-1 ENCECKIO (4) सेनांबेट के अपन करियान्डर के बाद सेटmetro minore del diametro del globo sulla, seni 200000, volte minori di un pele, esseanche a policina determinare a credime, che tak ararie digitable fociano na panacolar difiena di vali sel corpo animale: le injernore padimo in vai del penodio, della piena, inpersones, del cerreiro, ec., che muno une à recereme, e neile antannacione à cole part Strengens accer and remain.

order of the second

is die dies also announce deue mane make Pengan sole also genne de destructure deile Ped R &

potuto passare nelle vene linfatiche la materia delle injezioni, e in alcuni cadaveri è stata trovata rossa, e sanguigna la linsa dentro queste vene: sonvi esempj di sudore, e di orina sanguigna per semplice, come dicono, deosculazione de' vasi, come a un di presso esce il sangue de' mestrui dalle arterie dell' utero ne' dati tempi: l'acqua del pericardio è rossa, sanguigna negli animali morti per un violento corso: dopo le gravi infiammazioni del cervello, de' polmoni, o di alcuno de' visceri dell' addomine, si trovano acque rossigne nelle cavità: infine la midolla è rossigna nelle infiammazioni delle offa; dunque il sangue ha una grande facilità di passare oltre i termini dei vasi propri, e perciò egli conchiudeva, che nelle arterie linfatiche potesse alcuna volta passare il sangue oltre l'ordine naturale, dove poi arrestandosi facesse la ostruzione, dalla quale, cresciuto lo stimolo della forza vitale, dovesse dipendere la infiammazione, essendo indefinibili, e tenuissime le divisioni delle arterie sanguigne. onde nella ultima loro serie possano produrre tali arterie veramente linfatiche (a).

54. Ma, quantunque si ammettesse la esistenza di tali vasi, non sembra egualmente provato, che in essi possa alcuna volta passare il globo rosso del sangue; imperciocchè, quanto è maggiore la distanza de' canali dal cuore, B 4 dimi-

Ragioni contro l'error di luogo.

<sup>(</sup>a) Questa teoria Boeraaviana dell' infiammazione sembra poco disferente da quella dell' antichissimo Anatomico Erasistrato, il quale, al dir di Celso (pres. lib. 1. de Medicina pag. 4.) pretendeva, che nelle insiammazioni sanguis in eas venas, qua spiritui accommodata sunt (cioè nelle arterie) transsunditur, & instantationem, quam Greci phlegmonem nominant, excutat.

diminuendo la velocità del fluido, che vi fi muove dentro, non pare, che sì facilmente que' tenuissimi vasi potrebbono ammettere, nè contenere in tanta copia un umor sì tenace, crasso, e pesante.

Contro l'esistenza delle arterie lenfatiche. 55. La stessa facilità, colla quale il sangue può passare pei condotti secretori (53), c'induce a credere, che non vi sia tra quelle bocche, e l'estremità arteriose sanguigne frapposto un altro sistema di arterie linfatiche; e se pure queste vi si trovassero, non potremmo dire, che il sangue potesse con eguale facilità scorrere dentro delle medesime, e riempirle per la loro lunghezza; imperciocchè esso dovrebbe piuttosto arrestarsi ne'loro principi, o romperle, quanto poco in esse avanzasse.

56. La linfa fanguigna trovata nelle vene linfatiche (53) era stata assorbita dalle cavità, e dalle cellule, come si assorbe nell'ecchimosi. L'ASTRUC (a) trovò rossigna la linfa delle vene linfatiche in un cane morto slagellato. Che dalla cellulosa principalmente nascano le vene linfatiche, è stato dimostrato da Monno il sigliuolo (b): e che il sangue si travasi nelle cellule, il dimostreremo qui sotto (58. ad 62.)

57. Il microscopio ci sa vedere, che quanto più sono separati i globi del sangue, meno rossi appajono, e pellucidi sono i vasi, che così separati, e solitari li contengono, donde sembra molto più probabile, che que vasi sanguigni, i quali nuovamente si vedono per le instammazioni (44.52.), siano piuttosto tali

arte-

<sup>(</sup>a) Traité des tumeurs, & des ulceres. Tom. 1. pag, 34. à Paris 1759. in 12.

<sup>(</sup>b) In una sua Differtazione intitolata: De venis lymphasicis vakvulosis, & earum posissimum origine. Bepolini 1761. in §.

Prierie, le quali allora più densi, e più copiosi portano i globi spinti dallo stimolo (ibid.);
tali debbono essere quelle, che fanno il subitaneo rossore della faccia per le passioni dell'
animo, pel vomito, pel violento corso, e simili: coll' occhio semplice sulle natatoje, e sul
mesenterio delle ranocchie, e sulla coda dei
pesci non si distinguono vasi sanguigni, i quali
si vedono col microscopio, e questi tanto più
appajono, quanto più è irritato l'animale, e
più velocemente scorre il sangue, sicchè si accumulino, e si addensino i globi rossi gli uni
cogli altri; perchè dalla maggiore loro densità se ne sa più intenso il colore, come appunto nelle insiammazioni.

58. GALENO nel cap. 2, del lib. XIV. del metodo di medicare scrisse: Se si sa un taglio sopra una parte, ove siavi un stemmone, si vede,
che il molto sangue, che n'esce, sembra sparso,
e trattenuto, come l'acqua in una spugna; e
sul fine dello stesso capo aggiugne, che nelle
insiammazioni tutte le parti si riempiono di sangue, il quale trasuda dai vasi a traverso le loro
tonache, che poi come una rugiada si dilata,
e si spande in ogni parte della carne (a); e
sappiamo, che GALENO cogli antichi intendeva
per carne principalmente la tunica cellulosa.

59. Questo spandimento del sangue nella cellulosa è stato dimostrato dal celebre ALLERO, cioè ei vide nelle insiammazioni degl' intestini, del ventricolo, del mesenterio, della vescichetta del siele, che il sangue sparso nella cellulosa rappresenta ramicelli, i quali accompagnano i

vafi

Argomenti comprovanti, che nelle infiammazioni il fangue fi travafa nella cellulofa.

<sup>(</sup>a) GALENO ripete la stessa cosa nel sib. x. cap. 6. della stessa Opera del Metodo di medicare, e nel lib. 2. cap. 1. ad GLAUCONEM, come pure in altri luoghi delle molte sue Opere.

vafi steffi; dai quali doveva aver trasudato (2). Se si guarda un dito insiammato, egli è tutto rosso, come se sosse una spugna, o un panno inzuppato in una tintura rossa, e non si distinguono i lati, e le distanze de vasi: alcune volte Iul globo stesso dell'occhio si vedono sostanze

spugnose piene zeppe di sangue.

60. Che per l'estremità de' vasi sanguigni. anzi per le loro pareti possa trapelare la parte rossa del sangue, ce lo dimostrano ancor più quelle strisce rosse sanguigne con ecchimosi, che alcune volte si trovano contro le pareti delle maggiori atterie nelle infiammazioni del petto. e dell'addomine. Non di rado, facendo fervente, e con forza la injezione per un tronco arterioso, si trovano attorno le sue pareti esterne grumi di cera spatsi nella cellulosa, la qual cera ha dovuto trapelare pei pori delle steffe pareti, Il Teichmeyer ha descritto un' aneurisma anomala (b) fatta dalla ,trafudazione del fangue con perfetta integrità dell' arteria pei pori di essa, il quale si era accumulato, e condensato attorno della medefima.

Sentimento dell' Autore circa quel travasamento .

61. Come io posso assicurarvi per le mie proprie osservazioni esser verissime, e assai frequenti le rapportate dall' ALLERO (59.60.), non saprei però determinare, se tale spandimento del sangue nella cellulare sia la vera causa congiunta, o l'effetto della infiammazione giunta al grado di produrre la suppurazione, o la can-

<sup>(</sup>a) Vedasi nella Raccolta delle Opere minori di questo dottissimo Svizzero tom. 3. pag. 349. l'osservazione 53: degli Opustoli patologici. Vedansi pure le pag. 37., e 116. del tom. 1. della sua grande Fisio-

<sup>(</sup>b) Nella Differtazione, che ha per titolo! De sur pendo aneurysmate brachii feliciter per operationem curato, Jenæ 1734. in 4.

grena massimamente che allora tali spandimenti & trovano maggiori. Non vediamo noi spandersi a questo modo il sangue negli scorbutici, melle fuggellazioni, e nell'ecchimofi, senza aver

preceduta infiammazione?

62. I sintomi dunque della infiammazione fono il calore, il rossore, il dolore, la pulsazione della parte, che dicesi insiammuta (44): sopravviene la febbre, se non ha anteceduto, ed altri vari fintomi inforgono, fecondo le patti, che sono infiammate, questi altro non essendo, se non se i modi viziati delle azioni.

a cui le parti infiammate servono.

63. Le sue cagioni sono esterne, od interne: queste sono la pletora, il sangue crasso. viscido, tenace, o troppo rarefatto, o mosso fiammati. con troppo impeto, perchè le forze della natura siano per se stesse violente, o altrimenti irritate, ficchè i vasi vengano troppo riempiuti, e sfiancati da quelle forze, che violentemente lo spingono, o per la cattiva qualità degli umori acre, falina, biliofa, deleteria, che serve essa stessa di stimolo, e d' irritamento, onde in alcun luogo fi faccia il raccoglimento del fangue.

64. Le tagioni esterne (63) sono tutte quelle Esterne. cose, che possono ugualmente accrescere l'azione dei liquidi, o dei solidi, o di amendue infieme, come il troppo calore, l'eccessivo moto, il freddo acre, le applicazioni dei rimedi astringenti, le violente fregagioni, i corpi estranei infissi in qualche parte, e infine tutto ciò, che può premere, distrarre, storcere, rompere, ammaccare, crispare, abbruciare, rodere l'estremità de'vasi, sicchè il sangue non possa più liberamente passare, e conseguentemente, come dicemmo (63), si faccia il raccoglimento, o la flussione del sangue: per la qual

Sintomi generali dell' infiammazio-

Cause inde'

qual cosa allora la forza vitale, e l'irritabilità crescendo contro l'ostacolo, i prossimi vasi debbano dilatarfi, quivi farfi maggiore l'impeto, e la copia dell'umore, ed in tal modo produtsi un tumore di maggiore, o minor massa, e volume, secondo la maggiore, o minore quantità dello stesso umore ivi spinto; ma però i tumori infiammatorj sono sempre gli stessi in genere, e solamente pel loro diverso modo di procedere, e per le diverse parti, che occupano, se ne sono fatti i diversi generi, e lozo dati i diversi nomi. Noi si ridurremo a due ordini generali, che sono i slemmonosi, e gli erisipelatosi, ai quali ne aggiungeremo due altri, uno degli ascessi, e l'altro della cancrena. perchè queke terminazioni sono assai frequenti ne' tumori infiammati. Ogni ordine sarà diviso in diversi paragrasi, che corrisponderanno ai diversi generi di questi tumori.



#### **DEI TUMORI CALDI**

#### ORDINE PRIMO:

Che tratta dei tumori flemmonosi i

65. L' sumori flemmonosi delle parti esterane ( che di questi soli intendiamo di parlare ) hanno la loro sede nel tessuto cellulare sottocutaneo, e delle altre parti ancor più prosonde, e comprendono sotto di se il flemmone, il bubone, l'angina, l'insiammazione delle mammelle, il suroncolo, e altri subercoli, il panei reccio, l'ottalmia, l'orzajuolo, ec.

#### Del Flemmone.

# S. I.

66. Il flemmone (a) è un eumore più, o meno largo, e profondo, con colore rosso intenso, lucido però, e risplendente, che appena svanisce col tatto, con durezza renitente,
con dolor sisso, sorte, continuo, e pulseggiante,

Definizione del flemmo-

(a) La parola Greca flegmone fignifica incendio, ardore, e i Latini, come già si è veduto dal passo poc'anzi addotto di Celso, hanno tradotto questo vocabolo con quello d'inflammatio. Si è poi dato particolarmente tal nome al tumore inflammato, e circo-scritto descritto in questo paragraso, lasciato quello di flogosis all'inflammatione in generale; la parola flegmone viene dal verbo flegmainein, essergiammato.

giante, infine eon calore seco. Secondo la grandezza maggiore, o minore del morbo evvi quasi sempre congiunta una proporzionata sebbre con polso duro, e frequente, colla lingua secca, calor universale, ec., imperciocchè la sorza della vita è sollecitata a maggiori azioni, è irritata, e perturbata dallo stimolo, da cui dipende la insiammazione, come abbiamo dimostrato parlando de tantori insiammati in generale (44., e seg.)

Flemmone eri fiperatojo. 67. Il flemmone (66) è stato diviso in erisipelatoso, in edematoso, e in scirroso. L' erisipelatoso non è guari differente dalla risipola
flemmonosa, solamente come si dee dire risipela slemmonosa (166), quando vi è più di
affezione erisipelatoso, che flemmonosa, così si
dirà flemmone erisipelatoso, quando vi è più di
flemmone, che di risipola; sicchè bisogna sempre in simili casi combinare i segni di amendue le malattie insieme, e come eccedono questi, o quelli loro dare l'uno, o l'altro nome.

Edematoso.

68. Il flemmone edematoso (67) è quello, che accade o ad una parte, che prima già fosse edematosa, senza però, che i sintomi dell' edema, cioè la mollezza, il pallore, indizi d'un inzuppamento linsatico, svaniscano assatto, oppure il flemmone, e l' edema insorgono nello stesso tempo; ed anche in questo caso l'eccesso de' sintomi dell' una, o dell' altra malattia ci determineranno a chiamare il tumore o flemmone edematoso, o edema flemmonoso.

Scirrofo:

69. Il flemmone scirroso (67) non può mai effere, se non come accidente dello scirro, per le ragioni, che ivi accenneremo (452).

Segni, e loro ípiegazio**se**. 70. I segni del flemmone sono gli stessi suor caratteri, che abbiamo riportati nella definizione (66).

Il.

: 2 Il tumore fi fa per la troppa pienezza de vafi della parte, ed ancor più per l'umore

sparso nella cellulosa ( 58. e seg. )

B Il colore è rosso intense, perchè ne' menomi vasi sanguigni sono spinti con forza, ed in gran copia i globi rossi del sangue, il quale i maggiori vali ha già eccessivamente riempiuti (65): la parte tutta si colora, come una spugna inzuppata di un liquor rosso, perchè lo stesso sangue si depone nel tessuto cellulare (58., e seg.), e perchè distendendosi i canali, e la cute, si attenua la loro spessezza, quel colore fi fa lucido, e risplendente, che appena svanifce per la compressione, non potendosi dividere affatto l'onda del sangue per la somma tenfione, e pienezza de' vafi:

y La durezza renitente è prodotta dalla maga gior tensione de' solidi, e dalla maggior massa, e muovimento de' liquidi: l' arco più tefo, e la vescica più piena d'aria hanno maggior grado di elasticità; ancor più dunque le parti anisnali; che sono irritabili, e si risentono d'ogni

preflione.

Il dolore è force, fisso, concinuo, e pulfeggiante, perchè i nervi della parte sono violentemente distesi per tutta la lunghezza del zumore, compressi, ed angustiari, e come hanno una quantità, ed un modo d'azioni pel muovimento, pel fenfo, e pel piacere, l'eccesto a quel modo, e a quella quantità produce in questo caso il dolore: dalla pulsazione ne nasce un certo senso fastidioso, che va sino al dolore, perché è straordinaria alla parte, e perchè continuamente scuote i nervicelli; ma quella pulsazione segue il ritmo del polso, nuova pruova evidentissima, che l'infiammazione dipende principalmente dalla forza follecitata della vita, supposto anche, che l'ostruzione fiane-

siane stata la cagione occasionale (48. 49. 56.

Del calore

Il calore procede dalla maggiore oscillazione de vafi , e dal maggior muovimento de liquidi, come le fregagioni riscaldano le partis egli è secco, perchè è troppo tenue ciò, che s' evapora, e l' onda precipitosa dei liquidi quasi tutto trasporta; ed essendo da quell'eccesso, e perturbazione de' solidi, e de' liquidi assorti gli umori, la lingua rimane secca, perchè si sa minor secrezione di liquor salivale: le orine sono rossigne, e tenui, perchè alcuni globi rossi sono stati rapiti colla facile secrezione del siero urinoso per le aperte papille dei reni; oppure esse vengono acquose, tosto che il malato abbia bevuto, segno che il liquido non ha potuto pel rapido muovimento, e per la tenacità del sangue mescolarsi con esso, il che dimostra un maggior grado d'infiammazione.

E Quanto questa è maggiore, tanto più spesso, e tenace si sa il sangue, e più tenacemente si coagula, appare più nero, e sorma nella superficie una cotenna spessa, bianca, giallognola, verdeggiante; perchè sotto la continua violenta pressione de vasi non possono non addensarsi i globi rossi del sangué, e con esso il siero, e gli altri umort. Per la qual cosa nel maggior fervore dell' infiammazione quasi tutte le secrezioni sono diminuite, o soppresse, nè fi riaprono, o eccedono, se non per qualche terminazione imminente di risoluzione, di suppurazione, di retrocessione, o di mortificaziome. Avverrà il delirio, se il sangue si porta con impeto al capo, o un' affezione soporosa. se colla troppa copia lo aggrava. La respirazione si farà difficile, anelante, e frequente, se esso sangue col troppo moto, o colla troppa sopia offende i polmoni (21).

グほ

Cagioni .

Pronofice .

71. Le cagioni del flemmone possono essere tutte quelle, che abbiamo accennate de' tumori infiammati in generale (64.65.): il pronofito buono, o cattivo fi trarrà dalla maggiore. o minore delicatezza di struttura, ed uso della parte, dalla grandezza del tumore, dalla veeanenza de' fintomi, dalle forze, 😉 dal temperamento del malato, e finalmente dalle cagioni esterne, od interne, che l'hanno potuto produrre: così è più facile a guarirsi quello, che è stato prodotto da un sangue, che pecca so→ lamente in quantità, ed in moto, in un foggetto giovane, e forte, quello, che non ha gravi fintomi, nè è troppo grande, e trovafi in parte men nobile, e di più robusta tessitura: i contrari fanno la maggior gravezza del morbo, per cui si abbia ad annunziare il pronostico di pericolo, o di morte.

72. Abbiamo già dimostrato parlando de' tumori in generale, come alcune volte si avanzano alla cancrena i tumori infiammatori, e con quai fintomi (22): un pessimo segno egli è , quando, l'ardore interno essendo grandissimo, le parti esterne sentonsi fredde; che allora vi è sommo pericolo di mortificazione. Impercioca chè come l'ardore interno denota una violenta interna infiammazione, la quale per qualche tempo, mercè l'eccesso del muovimento, ha prodotto lo stesso ardore alle parti esterne, se queste cominciano a sentir meno il calore, e divengono finalmente fredde, egli è fegno. che le forze della vita si fanno deboli in modo. che, quantunque sollecitate dalla materia irritante. Conciossiachè tale effetto non si osserva quasi mai se non ne' flemmoni maligni ), pure non può il muovimento effere continuato sino alle esterne parti; e in questa maniera lo

stimolo, che faceva il morbo, continuamente

BERTRANDI TUM. TOM, L

Segni della profilma mortificaçio:

diminuendofi, finalmente cessa in ogni parte; e ne accade la morte.

Plemmone Suffocative. 73. Sonvi flemmoni, che con furore si producono, e si avanzano, minaccianti da principio cancrena, e chiamansi suffocativi.

Cura interna del flemmone.

74. La cura del flemmone dee farsi, mode. rando prima il troppo muovimento degli umori, nè vi è rimedio più efficace della cavata di sangue, la quale si farà, e si ripeterà nel principio più, o meno abbondante, così pure nell'aumento del tumore secondo la veemenza del morbo, l'età, e le forze del malato. La dieta, e i rimedi interni saranno quegli stessi, che proporremo per la risipola benigna (167). Se il sangue sosse vacochimico, si somministreranno i più propri per la cacochimia, che vi potrebbe essere, come gli antiscorbutici, se vi sosse il vizio di scorbato (a), o quelli, che commenderemo per la risipola maligna (170), quando gli umori fossero acri, biliosi, e putrefacienti. In questi casi dobbiamo essere più cauti nel cavar sangue, perchè non si produca maggiore scioglimento, e putrefazione, ed ancor più per evitare la retrocessione, che tanto più facilmente può accadere, quanto più libeni si rendono i vasi.

Efferna:

75. Quando il flemmone fosse prodotto da un sangue puro, e il tumore sosse piccolo, e nel suo principio, gli antichi, e anche non pochi de' moderni raccomandano l' uso de' topici ripercussivi, come l'osserato, le decozioni di balaustre, di scorze di pomi granati, di rose rosse, il sugo di semprevivo, e simili, co'quali wogliono, che si facciano somentazioni anco fredde.

Ripercussivi,

<sup>(</sup>a) Vedasi nel Tratt, delle ulcere il cap, delle ulcere

Ardde, oppure eataplasmi, mescolandovi bolo L' Armenia, terra cimolia, sangue di drago, pietra ematite, bacche di mircilla, scorze di pomi granati, balaustre, sandali rossi, e simili polverizzati.

76. Io non saprei raccomandare tali rimedi (75), i quali, quantunque alcuna volta possano, corroborando i vasi, ripereuotere, e risolvere la materia, possono parimenti addensarla maggiormente, e sissarla nella parte, sicchè il sumore si faccia scirroso; oppure, crescendo l'impeto interno, quivi potrebbe prodursi la cancrena (238.239.) Imperciocche se i rimedi interni (74) non sedano i muovimenti del sangue, e non temperano la forza della vita così tostamente, il stammone, che è piccolo, per quegli stessi muovimenti, che continuano, dovendo ampliarsi, l'impedirlo non può se mon esser dannoso, dovendosi allora considerare come critico (5).

77. Quando dunque si avrà raccomandatà una dieta tenue, e rinfrescante, e l'uso de' rimedi interni attemperanti, antiflogifici, o altrimenti alteranti, secondo la spezie di cacochimia, che vi potrebbe essere (74), alla parte fi faranno lungo la giornata fomentazioni non troppo calde colla decozione di fiori di sambuco, di camomilla, di viole, oppure con quella di foglie di meliloto, di parietaria, di branca ursina, di acetosa, e simili; di notte poi vi si applicherà un cataplasma di farina di save, di erobo, di lupini, e d'orzo, oppute di segala. di fien greco, e di lenticchie, fatto colla decozione di quelle erbe, o fiori, le quali anche f potrebbono mescolare colle stesse farine, ridotte che fossero in putrilaggine, e passate per le staccio, come il seguente:

Perché non convengano ful principio

Bensi i ris folventi i R. Flor. sambuc., camamel., violar. a pug. ij, folior. melilot, parietar. a manip. ij; coquantur ad putrilaginem, & per cribrum trajiciantur, addendo farin. fabar., secal. a lib. ss. cum decoct. f. cataplasma.

Quando & debbano ufare i mawrazei. 78. Ma se si osservasse, che l'umore per la sua tenacità non potesse risolversi, anzi che aggravasse sempre più la parte col suo impeto, e colla sua copia, onde il tumore crescesse, e si facesse più caldo, converrebbe allora tentarne la suppurazione, facendo di giorno le somentazioni con decozione di soglie, e di radici d'altea, di parietaria, di bieta, di mercorella, di asparagi, di verbasco, e simili: la notte poi vi si applicherebbe il seguente cataplasma:

R. Radic., & folior. alchae a manip. s., femin. lin., & fænugræc. a drachm. vj, flor. camæmel., & melilot. pulverat. a drachm. ij, farin. hord., & tritic. a unc. vj f. cataplasma addendo mell. commun. unc. ij.

Oppure

RI. Radic. alth., lilior. albor. a unc. ij, folior. malv., bismalv., mercurial., verbasc., parietar., violar. a manip. ss., flor. camamel., melilot. a pug. ij: coquantur ad putrilaginem cum s., q. aq. commun., per cribrum trajiciantur, addendo ung. alth. unc. ij.

La mollica di pane cotta col latte, o con una forte decozione di piante emollienti, a cui si aggiungano tuorli d'uova, e qualche poco di zafferano, sa un cataplasma maturante assai efficace.

Quando gli

79. Alcune volte il dolore, e l'ardore della parte sono così forti, che vi abbisognano gli ano-

enodini non solamente esterni, ma anche interni, e gioverebbe in simil caso il seguente catoplasma:

R. Folier. visc., hyosciam. a manip. ij, flor. papaver. manip. s., pom. dulc. n. j, coque in s. q. lactis vaccini, per cribrum trajiciantur, & cum unc. vj medulla panis albi f. cataplasma, addendo vitell. ovor. n. ij, pulver. croci drachm. j.

80. Quando per la tenacità dell' umore, e per la resistenza della parte, come nelle sossanze ghiandolose (100), difficilmente si potesse promuovere la sappurazione, converrebbe applicare quest' altro cataplasma:

Quando i maturanti più forti

R. Radic. lilior. albor. unc. iij,
capar. sub cineribus coctar. unc. ij,
summitat. alth. manip. ij,
caric. ping. tost, n. vj:
coque, & contunde: adde
farin. tritic., & semin. lin. a unc. ij.,
axung. porcin. unc. ij, ung. basilic. simpl. unc. ss.,
cum vitello ovi, & croc. gr. vj
f. s. a. cataplasma.

81. Come i Cerusici sono talvolta accusati a torto di aver tratto alla suppurazione un slemmone, il quale pareva, che avrebbe dovuto rissolversi, così altre volte meriterebbero di esserio, per aver reso maggiore un slemmone, tentandone la risoluzione, quando da principio doveano determinarsi per la suppurazione. La risoluzione è indicata (16), quando il slemmone non è molto grande, ed è prodotto da un sangue, che pecca solamente in quantità, ed in moto è ed anche in questi casi, se si osserva, che

Quali fiano i fegni indicanti la rifoluzione, e quali la fuppurazione, che i rimedi interni antiflogistici, ne i risoli venti esterni non impediscono in un certo tempo il progresso del tumore, che esso anzi con prestezza cresce, e l'umore ne rende tutta la massa renitente, e piena, che niente assatto cede, rimanendo in istato per qualche tempo, che il martellamento piuttosto aumenta, che diminuire, deesi allora non perder più tempo, e proccurarne la suppurazione (17).

Qualche
woltz quelle
terminazione
accadono
inaspettatao
menue.

82. Ma se non si può negare, che i rimedi prescelti possano promuovere piuttosto l' una, che l'altra terminazione (81); osserverete però in pratica, che non di rado l' una, o l'altra inaspettatamente accade, sicche non se ne possa promettere alcuna sicuramente. Quante volte suppura un tumore, quando, secondo l'apparente indicazione, i più essecutiva quante volte si vedono risolvere tumori, de' quali si tentava la suppurazione? E vicevessa quante volte si vedono risolvere tumori, de' quali si tentava la suppurazione? Ciò dipende da un cangiamento d'umori, da una sorza de' vasi per certi muovimenti spontanei, a' quali non così sacilmente possiamo comandare.

Curs del flemmone erifipelatoso, e deli' edemasoso .

83. Il flemmone erisipelatoso (67) fi dee curare come la risipola benigna slemmonosa (168): per l'edematoso (68) convengono rimedi, che abbiano maggiore attività per isciogliere; e perciò si preseriranno le fomentazioni fatte colla decozione di fiori di camomilla, delle sommità d'affenzio, di maggiorana, e fimili. Alcuni fanno uso del lissivio, o dell'acqua di calce, a cui aggiungono spirito di vino semplice, o canforato, sal ammoniaco, sal gemma, o sal nitro, perché meglio si possa stemperare l' inzuppamento sieroso: si usano pure i cataplasmi farti colle quattro farine risolventi, e coll'ossigrato, o col mosto; ma i rimedi si deono pratiçare più, o meno attivi, secondo che per la natura

matura de' fintomi il tumore parrà piuttosto flemmone edematoso, che un edema flemmonoso, come meglio avvertiremo parlando dell' edema.

84. Quando si scorge, che la materia del flemmone è in muovimento di risoluzione, perchè già il tumore diminuisce (16), conviene allora fomministrare qualche purgante, come la polpa di tamarindi, la manna, la cassia, l'eleteuario lenitivo, il diapruno, o simili in bolo, o sciolti in una infusione di senna, o di rabbarbaro, secondo che parrà necessaria maggiore, o minore purgagione. Convengono anche i leggieri diaforetici, come l'infusione di thé, una leggiere ebullizione di fiori di papaveri rossi, o una leggier decozione di radice di bardana. Se la risoluzione si facesse lentamente, quantunque i fintomi della infiammazione (62) fossero non poco diminuiti, potrebbono giovare allora alcuni de' repercussivi sovrannominati (75), per vincere con essi l'inerzia de'liquori stagnanti, che altrimenti non si muoverebbero.

85. I flemmoni suffocarivi minacciano, come dicemmo (73), piuttosto la cancrena, che la rifoluzione, o la suppurazione. L'ardore, la tensione, il martellamento sono egualmente sorti, ed intensi in turia l'estensione, e prosondità del tumore, il colore è d'un rosso intenso, molto più lucido (70.73.); vi è inoltre sempre congiunta un'ardentissima sebbre, sete, vigilie, e qualche volta la convulsione.

86. Se il tumore è in parti aponeurotiche, e tendinose, sossire il malato prosondamente uno stiramento, e un senso di lacerazione veemente, e continuo, ed allora quantunque il tumore sia teso, e renitente nella superficie, in alcuni luoghi però si sente col tatto una certa vacuità, ove, se si taglia, come si dee tagliare, per toglière le strangolamento, poca, o niuna sup-

Rimedj inw terni, ed esterni da usarsi, quando il flemmone si rifolve.

Sintomi del flemmone fuffocativo.

Offervazioni circa lo stato dello parti affette. purazione vi si trova, ma molto sangue nero; e putrido, travasato nella sostanza cellulosa tra gl'interstizi de' muscoli, i quali alcuna volta si trovano essi stessi sostanza, e cancrenati, quantunque la cancrena non ancora apparisse agli integumenti. In un flemmone di questa spezie alla gamba trovai lembi di aponeurosi laceri, e sciolti, inspessati però, i quali dissecti erano tutti ripieni di vasi turgidi di sangue, che mai non vidi così bella injezione.

87. In queste prosonde insiammazioni il periostio stesso alcune volte s'insiamma, sente il malato un acutissimo dolore, come dicesi, osteocopo, e per lo più succedono le convultioni, ed il delirio: il periostio piuttosto si cancrena, che suppurare, ed all'apertura del tumore coll'accennato guastamento de' muscoli (86) trovasi l'osso in alcuna parte seoperto. Vedete simili esempi nel V. Tomo delle Disputazioni Cerusiche raccolte dall'ALLERO pag, 542. (a),

Curk interenadiquesto

88. Le cavate di sangue si deono fare più abbondanti, e ripetere in più breve tempo (74): i diluenti, e gli antislogistici interni si somministreranno in maggior copia (77); dappoichè il corso di questa malattia è così veloce, che spesso la cancrena inaspettatamente accade, esfendo le parti organiche pel violento impeto interno celeramente portate al termine come della loro tensione, così anche a quello della loro coesione; conciossiachè queste forze non posso-

<sup>(</sup>a) Nell'edizione di Napoli trovansi nel tom. E. pag. 100, e seg. le dissertazioni, nelle quali questi esempi sono rapportati, sono una di Gioanni Henseler, ch' è intitolata Historia brachii pratumidi, e l'altra di Alessandro Camerario intitolata Historia pedis sumidi.

possiono non accompagnarsi sino al medesimo punto estremo, in cui debbano sinire. Chepperò quanto più cresce la durezza, e la renitenza del tumore, tanto più cresce il pericolo della rottura, e dello scomponimento delle parti organiche, e dello spargimento degli umori; cessa infine ogni azione, e la cancrena è già fatta.

89. Riguardo alla cura: esterna, tosto che in alcuna parte mollezza, e vacuo si sente, quivi si dee incidere; e come nelle ferite, e nelle contusioni non si può meglio impedire il stemmone suffocativo, e la cancrena, che colle ampie dilatazioni (a), egualmente in questo caso, quantunque la cagione sosse tutta interna; conciossiachè il modo dell'affezione locale sia lo stesso, tanto più se la cagione interna sosse qualche modo maligna, come dimostreremo parlando del carboncello (177, e seg.), e della cancrena (240).

90. In questo stato di flemmone convengono fomentazioni, o cataplasmi fatti colle radici di angelica, aristolochia, imperatoria, brionia, iride siorentina ec., coll'abrotano, assenzio, betonica, maggiorana, marrubio, menta, origano, pulegio, rosmarino, ruta, salvia, scordio, serpillo, lavanda, tanaceto, e simili; le quali erbe, o radici cotte, e macerate nell'ossicrato

Curá esterna da farfi col ferro.

Co' rimedj topici.

<sup>(</sup>b) Vedete il Trauato delle ferite. Notifi però, che l'Autore già non intende, che si facciano le ampie, e prosonde scarificazioni solamente ne'casi, ove sentesi in alcuna parte mollezza, e vacuo, ma anche ogni qual volta è ralmente tesa, ed insiammata la parte, che il pericolo della soffocazione è imminente; questo suo precetto, quantunque qui non abbastanza spiegato, si raccoglie da molti luoghi di questo stesso Trattato, e degli altri, che seguiranno

si possono applicare calde inchiuse in sacchetti, aggiungendovi sale ammoniaco, o nicro, se la sussociazione è più prossima.

#### Del Bubone

# S. II.

Definizione del bubone. 91. Il bubone è il tumore di alcuna ghiandola, ma principalmente di quelle, che gli Antichi chiamarono emuntori del cervello, del cuore, e del fegato, cioè le parotidi, le foteoascellari, e le inguinali (38): boubon in greco propriamente significa l'anguinaglia, e perciò bubone dicevasi anticamente soltanto il tumore delle ghiandole, che quivi si trovano (a). GALENO su il primo, che chiamò bubone il tumore di ogni qualunque altra ghiandola (b).

Distinzio-

92. I buboni sono o instammati slemmonosi, o erisipelatosi, oppure sono scirrosi con maggiore, o minor durezza: gli uni, e gli altri possono essere benigni, o maligni, o anche pestilenziali.

Buboni bènigni, 93. I benigni sono quelli, che non procedono da alcuna cacochimia, come il gonfiamento delle ghiandole inguinali nella prima pubertà, per gli sforzi del parto, pel camminare stentato, o per altra cagione esterna: così alcune volte gonfiano le ghiandole sottomas cellari pel caldo, o pel freddo, e questi sono sempre più, o meno infiammati.

94. I

(b) Method, medend. lib. XUI. cap. 54

<sup>(</sup>a) Epperciò Celso chiama il bubone inguen, come apparifice dal seguente passo, e da altri ancora: si mulieri ex inguine sebricula orta est ( lib. 2. cap. 7. pag. 60. ). Il nostro volgo, e gli stessi buoni scrittori Tegicani il chiamano anguinaia.

. na. I maligni possono essere critici, o sinsomatici, come la parotide, che suole gonfiare nel tempo, o dopo alcune malattie acute; e in questi casi la cagione congiunta del bubona sempre dipende dalla flussione di un umore di cattiva natura.

95. I pestilenziali sono quelli, che accadono. Pestilenziain tempo di peste, e tanto questi, che i ma- li, ligni (94) sono pure ben sovente infiammatori: le parotidi ( ibid. ) sono alcune volte persino suffocative.

96. Mettonfi anche nella classe de' maligni Venerei, e (94), e inoltre sono contagiosi quelli, che procedono da un commercio impuro, o da lue celtica altrimenti comunicata, e questi, che diconfi venerei, di rado sono infiammatorj.

97. Evvi una cacochimia linfatica, che il si- Strumosi. stema glandoloso più, o meno offende., le parotidi, le ghiandole sottoascellari, e quelle del collo principalmente inzuppando, ed allora que' buboni scrofole, o strume si appellano: essi anche di rado sono infiammatori, ma di così difficile guarigione, che tra i maligni (94) si posfono comprendere.

98. I buboni benigni infiammatori hanno gli stessi segni del flemmone (66), o della risipola benigna (158): il luogo solo ne sa la differenza, onde si debbono trattare cogli stessi rimedi, e colle stesse cautele (74. ad 90.)

Segni, e cura de' beni-

99. I maligni critici, o fintomatici (94) debbonsi sempre tratre alla suppurazione, per togliere dal sangue quella materia di cattiva qualità. Siffatti buboni crescono per lo più in poco tempo, e con impeto, quantunque non abbiano sempre la stessa intensità d' infiammazione, la quale qualche volta è eccessiva, e minacgiante suffocazione, come abbiamo già accennato del gonfiamento delle parotidi (95). 100. I

De' mali-

Cata 💕

roo. I buboni critici alcune volte non avanzano a quella pienezza, che recherebbe maggior vantaggio; conviene allora ufare fomentazioni emollicati, e un poco irritanti, come quelle fatte colla decozione di radici di altea, e di gig'j bianchi, o delle foglie di taffo barbafo, e di parietaria coll'aggiunta delle radici di brionia. Alcumi fogliono applicare fopra il tumore una coppetta con molto fuoco, e firapparla per iscuotere i vafi, e attrarre gli umori: giovano altresì i cataplasmi più, o meno acri, e fitmolanti, secondo che si scorge maggiore, o minor inerzia degli umori, come il seguente:

A. Radic. lilior. albor., capar., bryon. fub cinerib. calid. assaur. a unc. ss., ferment. pan. unc. ij gumm. sagapen. unc. ss., cum vitello ovi f. catapl.

vi si possono anche aggiungere i sichi secchi pingui, il mele, il sapone, il oroco, o altre gomme, come l'ammoniaco, il bdeglio, l'opoponaco, ec.

resistenza, e turgidezza, senza che i sintomi sieno gravi, possono bastare alcuni di que' cataplasmi suppuranti, che abbiamo proposti pel flemmone (78), oppure l'empiastro diaquilon con gomme, quello delle mucilagini risormati con olio di gigli bianchi, aggiungendovi pure sapone, croco, sterco di colombo, semi di senapa, di ortica, e simili secondo il bisogno, oppure

Rl. Capam magnam, excavetur, & impleatur ejus cavitas theriaca; deinde papyro involuta coquatur sub cineribus calidis, & cum ol. scorpion. unc. ss. f. cataplasma, addendo ferment, veter, unc. j.

192, Ab-

102. Abbiamo avvertito, parlando de' tumori in generale ( 26. 33. ) quando, e come fi debbano aprire questi tumori ghiandolosi, suppurati che sono. La parotide suole aprirsi con un ferro rovente, che chiamano saetta di fuoco: perchè ella è una lamina di ferro piatta della figura di un cuore di carte da giuoco, continua ad angolo retto con un lungo manico, più o meno larga, lunga, ed acuta, fecondo che fi vuole più, o meno penetrare, giusta il volume del tumore (a). Con questo strumento si fanno una, o più aperture in forma di T, o di croce. E quantunque alcune volte il tumore paja turgidisamo, duro, e renitente, e non vi fiano fegni esterni di suppurazione, nulladimeno, se precedette quella sebbre, e quella interna perturbazione, la quale dicemmo promuovere la suppurazione (17), la materia poi fi trova nel più profondo, quando colla saetta, col caustico, o col serro maggiormente si avanzi dentro il tumore; e se vero pus non se ne vede uscire, molto sangue nericcio, fetente, o icoroso ne suole scaturire, essendosi già rotti i vasi, e fatto spandimento di umore per l'impeto, e per la copia, con cui vi era pervenuto.

103. I huboni critici, o sintomatici fattisi con impeto, e con molta infiammazione, se non uccidono il malato pel loro precipitoso enorme crescimento, colla mole stessa suffocandolo, evvi molto pericolo, che passino in cancrena (232) per la pressione, che fanno ai

Come fi debba aprire la paroeide suppurata.

Cura de' bus boni suffosasiyi.

<sup>(</sup>a) La fig. 5. della Tav. xvII. degli strumenti di Chir. rappresentati nel tom. III. delle figure dell' Enciclopedia mostrerebbe assai bene la faetta qui descritta dall' Autore, se la lamina, che dee farsi arroventare, ne sosse più sottile, e più piatta.

vasi vicini, e i segni ne sono gli stessi, che abbiamo addotti del flemmone suffocativo (85)2 conviene allora fare scariscazioni più, o meno prosonde, indi applicare il caustico attuale, o potenziale in mezzo a quelle (a), e poscia un sorte digestivo sopra, ed alcuni de sovra descritti cataplasmi (100-101.) per eccitare, quanto più presto sia possibile, la suppurazione, la quale se muovesi, prima che termini la malattia, di cui è crisi, o sintoma il bubone, per lo più suol essere abbondante, sicchè tutta la glandola si consumi, e si sciolga, onde il bubone stesso, divenga poi critico, e ciò più sacilmente accadrà, se esso era instammatorio.

Segni della

104. Ma se la suppurazione non si muove, se il tumore senza crescere di volume si sa sempre più duro, se diminuiscono gli accidenti della insiammazione, e sopravviene un certo color sosco, e piombino, se le labbra delle incissoni diventano secche, o trasuda da esse una linsa rossigna, per lo più n'è vicina la cancrena, ed il malato ne muore.

Cura de'buboni duri, che difficilmente suppurano. 105. Que' buboni critici, che abbiamo detto crescere lentamente, e con leggieri segni di insiammazione (100), se non si hanno potuto trarre a suppurazione persetta coi mezzi sovra indicati (ibid.), per le più non terminano, se non quando co' caustici, e coi corrosivi si sieno consumati i duri globi ghiandolosi. Alquni propongono di estirparli, la qual cosa mon sempre è possibile per ragione di luogo,

<sup>(</sup>a) Pare, che si otterrebbe più presto l'intento, se in vece di applicare nelle scarificazioni il caustico, il quale sa un'escara, che ritarda sempre più, o meno la suppurazione, vi si applicassero a dirittura il digestivi serti, ed animati.

o non si dee fare per lo stato, in cui si trova il malato. Si possono almeno in simili casi separare, ed estirpare quelle porzioni globulari, che o dalla poca suppurazione fattasi, o dalla forza de' corrostvi, e de' caustici fossero già state in parte sciolte; il che talvolta anche si fa per una certa cancrena, che accade nel profondo del eumore, quantunque non appaja esternamente; ciò però sugle solamente accadere nel principio, quando dura ancora il furore della malattia principale, di cui è crisi il bubone Dei rimedi interni non fo parola, perchè deono essere diversi, e adattati al tempo, alle stato, e alla natura della malattia, per la quale fono nati i buboni.

106. I buboni pestilenziali sono quelli, che accadono in tempo di peste; sogliono per lo buboni pestipiù occupare le glandule inguinali, e tendere fin da principio alla cancrena, la quale difficilmente fi può impedire. Nella peste di Atene, descritta da TUCIDIDE (a), e da LUCRE-ZIO CARO (b), la cancrena si estendeva sino alle parti genitali, delle quali molti restarono privi (c): Tali buboni di rado sono critici, quasi sempre sintomatici; ed ecco le osservazioni, che ha fatto il DIEMERBROECK, il

Segni del lenziali.

<sup>(</sup>a) Antichissimo Storico Greco, contemporaneo d' IPPOCRATE, il quale scrisse la storia della guerra del Peloponneso, nel libro secondo della quale descrive con fomma energia la peste di Atene accaduta in quegli stessi tempi.

<sup>(</sup>b) De rerum natura lib. vI. vers. 1136., & seq. (e) Lucret. ibid. vers. 1204.

in nervos morbus, & artus ., Ibat, & in partes genitales corporis ipfas.

<sup>&</sup>quot; Et graviter partim metuentes limina lethi

Livebant ferro privati parte virili.

quale vide una peste in Germania (a). n I tat » mori negli emuntori ( dic'egli (b) ) princi-» palmente quelli, che si elevavano nelle fau-» ci, e dietro le orecchie, se crescevano nello » spazio di 12., o di 24. ore, ed erano mol-» li, come eumori flatulenti con infiammazio-» ne, o senza, erano sempre mortali, e tutti » i malati morivano, quantunque all' appari-» zione di que' tumori paresse, che in qualche » modo fossero sollevati. Allo 'ncontrario se » nel principio erano duri, come tendini, ri-» gidi, e allungari, e se crescevano a poco a » poco con un tollerabile dolore, era piuttosto » di buon presagio, principalmente se, cre-» scendo, conservavano quella durezza. Ma se » que' buboni duri avevano un circolo di di-» versi colori a soggia d'iride, era indizio di » prossima morte, come pure se diventavano » rossi, lividi, o neri. Il pericolo era mino-» re, se i buboni prestamente suppuravano, ed manche se a poco a poco, cessando la febbre, » fvanivano fenza suppurazione.

I buboni pestilenziali sono per lo più accompagnati da carboncelli, come di questi parlando faremo osservare (180).

Segni della pesse.

107. Quantunque presso che tutte le pesti, di cui abbiamo le storie, dimostrino una dissoluzione putrida degli umori, i sintomi però non ne surono sempre gli stessi nè in quantità, nè in grado. Essi surono per lo più nausee, vomiti, itterizia, tremori, dolori di capo, sete intensissima, convulsioni, putride icorose dejezioni del ventre, siussi di sangue al naso, su-

<sup>(</sup>a) Cioè la peste di Nimega, che facea orribile strage negli anni 1636., e 1637.

<sup>(</sup>b) Nel suo Trattato de peste stampato per la prima

sudori freddi, tossi, anelito, dissicoltà di respiro, finghiozzo, sternuto molesto, tumori nella gola, ficcità, raucedine, stralunamento degli occhi, sopore, prostrazione delle forze ec.

108. I rimedi interni sono i bezoardici, i diaforetici, e tutti gli antisettici. Alcuni vogliono, che il bubone si estirpi da principio, quando è ancor piccolo; la qual cosa non si può sempre fare per ragione del luogo, e ancor meno si dovrebbe, se la materia fosse in muovimento, nè ancora forse terminata la sua

flussione alla parte.

, 109. Per attrarvela, e poscia evacuarla nella maggior quantità, che fia possibile, onde sgravarne il corpo, tutti gli Autori raccomandano di applicare sul bubone, quantunque non fosse ancora perfettamente suppurato, il caustico. Paolo BARBETTE nel suo Trattato della peste (a), ne propone la seguente cura: vuole, che sul tumore, comecchè non sia ancor pervenuto a tutta la sua grandezza, s'incominci ad applicare un vescicante, e che, fatta la vescica, si tagli, per subito applicarvi l'empiastro magnetico arsenicale, la cui virtu dice essere in questo caso così grande, che non conobbe mai alcun miglior rimedio. La composizione lasciatacene dall'ARTMA NO, (b) e dall' AGRICOLA (c) è la seguente:

BERTRANDI TUM. TOM. I.

(a) Questo Trattato è intitolato Methodus sanandi peste affectos. Leidæ 1667. in 12.

(b) Nel suo libro, che ha per titolo: Johan. HAR-TMANNI Praxis chymiatrica, stampato per la prima volta a Lipsia l'anno 1633. in 4. La descrizione dell' empiastro magnetico arsenicale trovasi all' articolo Pestis.

Cura esterna, ed interna di tali

Rimedi topici per ime pedirne la retroceffione.

<sup>(</sup>c) Molti essendo gli Scrittori, che hanno il nome di AGRICOLA, bisogna sapere, che qui s'intende Giorgio AGRICOLA Autore di molti Trattati, e tra gli altri d'uno de peste stampato a Basilea l'anno 1554. in 8., dove trovasi la composizione dell' smpiastro magnetico arfenicale

R. Antimon. crud., sulphur. flav., arsen. alb. a unc. ij: subtilissime pulverata, & in phiala excepta sepeliantur in arena, deinde subministretur ignis, donec liquescant, & colorem rubrum subobscurum inducant: vase refrigerato, exime materiam, qua magnes arsenicalis vocatur.

e ci assicura, che ha perduta la sua forza velenosa, come ciascuno può provare sui cani; per fare adunque l'empiastro

N. Gumm. sagapen., ammoniac., galban.; magnet. arsenical. a drachm. iij: terebinth. laric., ceræ a unc. ss.: ol. succin. drachm. ij: terr. vitriol. dulcif. drachm. ss. gummata dissolve in aceto sorti, & per pannum linteum expressa bulliendo iterum inspissentur: deinde seorsiae liquescant cera, & terebinthina, & extra ignem agita, donex in spissitudinem unguenti redigantur: adde porro supradicta gummata, & magnetem arsenicalem cum terra vitriolica, & oleo succini, stat emplastrum.

Si applica questo sopra tutto il tumore, e vi rimane un'escara, che si può facilmente separare; si proccura allora un'abbondante suppurazione, che per lungo tempo si dee sostenere. Ottimo sarebbe, secondo lo stesso Autore, il seguente unguento:

N. Mell. virgin., axung. anat. a unc. ss. fuligin. camini drachm. vj., terebint. unc. ss., vitell. ovor. n. ij: theriac. drachm. iij: ol. scorpion. q. s. m. f. unguentum.

🕊 fi continueranno gli empiastri gommosi, sino che più non vi rimanga alcuna durezza. Se il bubone fosse cancrenoso, si faranno scarificazioni, poi si applicherà il caustico, e il Silvio (a) raccomanda il butiro di antimonio, o lo stesso empiastro di magnete arsenicale. Racconta lo stesso BARBETTE d'aver veduto uomini in tempo di peste, i quali, avendo *buboni* senz'altro sintoma di malattia, morirono aver voluto risolverli . De' buboni venerei (96) discorreremo nel Trattato delle malattie veneree. e delle strume (97) in altro luogo di questo Resso Trattato (410).

Della infiammazione delle ionsille, e dell' uvola.

### S. III.

110. Quando le tonfille sono tumefatte, l'am segni dell' malato inghiottisce più, o meno difficilmente, e con maggiore, o minor dolore secondo il maggiore, o minore gonfiamento di quelle ghiandole, sente un ardore in gola, il tuono della voce cangia, e, se l'infiammazione è grave, la respirazione stessa si sa difficile, e i polmoni anch' essi finalmente s' infiammano; quasi fempre sono anche tumesatte le ghiandole sottomascellari, e quelle del collo.

111. Questa infiammazione alcune volte è schiettamente flemmonosa, altre volte in parte sterosa, o, come dicono, catarrale, il che si distingue per la maggiore, o minore intensità de' sintomi. Che, quando ella è sierosa, il calore 🛭

ne delle cont

Distinzione di questa in4. fiammazione<sub>s</sub>

<sup>(</sup>a) Il vero nome di questo Autore è Jacques du Bois, ed è nel suo libro de peste, & sebre pestilen-tiali, stampato a Parigi l'anno 1557, in 16. 2 che dà questo precetto. D a

Segni della

lore, il dolore, il rossore, ed il lancinamento sono minori, quantunque le ghiandole siano anche molto tumesatte, anzi un certo color pallido vi si scorge, la saliva è meno viscida, e la lingua meno secca, nè il tumore così prestamente perviene alla sua grandezza.

Cura interna, ed esterna della flemmonosa.

112. Se il tumore è schiettamente flemmonofo, i rimed, interni sono gli stessi, come pel flemmone ( 74., e seg. ). Per tentare da principio la risoluzione, il malato gargarizzerà decozione di radice di bistorta, di tormentilla, di foglie di acetosa, di fiori di sambuco, o di rose, l'ossicrato, o simili, aggiungendovi nitro, sal prunella, sciroppo di viole, diamoron, vino chi pomi granati, o altri subacidi, e quando l'ardore sia forte, si farà una crema con polpa di pomi cotogni, e mucilaggine di semi di psillio, rimescolandoli con acqua di piantaggine, ed aggiungendovi mel rosato, rob diamoron, e nitro, e con un pennellino, oppure con ispugna, o con filaccica all' estremità di una tenta, se ne ungeranno le fauci. Giova zenere il collo difeso dall'aria, e se si sentono, comecche poco, tumesatte le ghiandole del collo (110), si applicheranno sacchetti pieni di fiori di sambuco, di camomilla, e rose cotti nell'acqua. Alcuni raccomandano come specifico un nido di rondini applicato a quella parte, impastato prima colla polpa di cassia estratta di fresco, o quello di meliloto canforato; e quando l'infiammazione si facesse maggiore, i pediluvi tiepidi, i sinapismi, e le fregagioni ai piedi, e alle gambe; ma il più efficace rimedio si dee sperare dalle cavate di sangue, e dalle bevande tenui, acidule, e nitrose.

117. Se poi al quarto, o quinto giorno noncedessero i fintomi della infiammazione, ed il tumore persistesse, anzi prendesse aumento, converrà allora passare agli ammollitivi, come sono le decozioni di radice di altea, di malva, di foglie di parietaria, di mercorella, di verbasco, di semi di siengreco, e di lino, cotti nell'acqua semplice, o nel latte, colle quali fi faranno frequenti colluzioni in bocca, o gargarismi, facendone anche cataplasmi da applicarsi al collo. Nè, quando si faccia la suppurazione, bisogna essere troppo solleciti ad aprire l'ascessa; imperciocche vi possono poi rimanere durezze molto difficili a risolversi; egli è però vero, che sovente si apre da se senza

l'opera del Cerusico.

114. Alcune volte l'infiammazione delle tonfille si fa con tanto surore, e crescono a tanta mole, che, senza poterne sperare una pronta risoluzione, o suppurazione, il malato corre pericolo di restar suffocato. Deesi allora scarisicare, ed incidere col faringotomo la tonfilla. che è più tumida, e trarne sangue; conviene alcune volte quasi spaccarla; ed è accaduto in fimili casi, che essendo esternamente turgida, e dura, ne sia nulladimeno uscita dal prosondo materia già fatta putrida. Può anche eflere necessario di scarificare la membrana delle fauci e del palato, se si trova anche turgida, ed infiammata, onde si tragga una maggiore quantità di sangue, e forse si tolga a quel modo il pericolo della suffocazione, o della cancrena. Giova ugualmente in tanta gravità del morbo cavar fangue dalla vena giogolare, piuttosto che dalle ranine, acciocchè se ne possa trarre una maggior copia, e in minor tempo, e così ottenere una maggiore derivazione. Si continuano poi i cataplasmi, e i gargarismi ammollitivi,

Ouando convengaпо і бирри:

Cura della tonfille suffocative.

e suppuranti (113), principalmente il latte, in cui siansi satte cuocere radici d'altea, e sichi pingui. Se in quel surore del morbo accade sumore esternamente, deesi promuovere, e sossenere colle somentazioni, e co' cataplasmi maturativi.

Attenzioni da aversi dopo l'apertura dell' a/ceffo. 115. Fatta la suppurazione, ed aperto l'ascesso, ai gargarismi sopraccennati (113.114.) si aggiungerà mele rosato con alcune gocce di essenza di succino, o di pimpinella. Accade alcune volte, che quantunque siasi rotto un maggiore ascesso, restinvi nulladimeno alcune cellette della stessa materia ripiene, le quali non si sono vuotate, dacchè queste glandole sono cellulose, e quasi cavernose. Conviene in questo caso inciderle in croce più, o meno prosondamente, e colla punta del dito smuoverle, ed aprirle maggiormente, acciocchè tutto l'umore n'esca.

In qual cafe convenga la tracheotomia. 116. Se tanta è la gravità del morbo, che, nulla avendo giovato le copiose, e frequenti eavate di sangue (114), nulla i diluenti, ed antissogistici, i quali il malato può appena inghiottire a sorsi, nulla le scarificazioni satte alle parti insiammate (ibid.), l'insiammazione, ed il tumore siano pervenuti ad occupare le parti interne, ed esterne della saringe, e della laringe con evidente pericolo di suffocazione, l'ultimo rimedio sarà allora la tracheotomia (a), almeno per sollevarlo, se pure non può guarire pel progresso, che nulladimeno potrà sare la malattia, pervenendo alla cancrena.

Cura della flussione cacarrale delle tonsille. 117. Nella flussione catarrale (111), in cui, come si è detto (ibid.), l'instammazione è leggierissima, il tumore molle, bianchiccio, gial-

<sup>(</sup>a) Il modo di fare questa operazione vedasi nel Tranato delle Operazioni cap.

giallognolo, e appena rosso, manca la sebbre, o, se sopravviene, è per lo più critica, poco convengono le cavate di sangue, piuttosto i purganti, e i diuretici, ed il richiamare altrove la flussione co' vescicanti, e co' cauterj. Giovano i gargarismi, le colluzioni, i somenti, e i cataplasmi risolventi, astringenti, ed incissivi, come il seguente gargarismo:

M. Flor. ligustr. unc. X.,

Syrup. & quatuor radic. aperient. unc. s.,

sal. pharyng. ZOBEL. drach. ij,

Oppure

Rl. Aq. rorismarin, unc. viij, nier. purif. scrup. ij, essent, pimpinell. alb.unc.ss, rob. dianuc. drachm. ij, syr. violar. unc. ss. misce.

Il sale saringeo del ZOBELIO (a), che è un ottimo rimedio in questi casi, è una cristallizzazione di cremor tartaro, e di nitro purissimo a parti eguali, e di alume bruciato alla metà satta nell'aceto sorte. Convengono anche per la stessa indicazione le tavolette, come diconsi, de tribus, e, quando il tumore sia in diminuzione, quelle di terra catechù, e di acetosella (b).

118. Può

<sup>(</sup>a) Frederico ZOBELIO fiori verso la metà del passato secolo al servizio del Duca di HOLSTEIN-GOTTORP. Dopo la sua morte è stata pubblicata la seguente sua Opera Tartarologia spargyrica Jena 1676, in 12., nella quale si dà la compositione del sale faringeo.

<sup>(</sup>a) Ne' foggetti cachetici alcune volte alla base della lingua, nel tessuo cellulare, che attornia le glandule sottomascellari, e sublinguali, e negl' interstizi de' molti muscoli, che qui si trovano, si fanno inzuppamenti linsatici, pei quali, se non si corregge a tempo il vizio degli umori, e ancor più se non si

In quali cafi debbanti le tonfille estirpare. 118. Può accadere, che le tonfille faccianti scirrose o per l'abuso de repercussivi, o pella somma viscidità degli umori, o per l'inerzia dell'organo. Poco giovano allora i gargarismi, le lavature, i sussumigi, e le paste emollienti, e discuzienti; che, se recano incomodo, bisogna finalmente estirparle (a).

Inflammazione, e inzuppamenzo fierofo dell' uvola, e cura, 119. Anche l'uvola ora s' infiamma, ora si riclassa, e s' inzuppa di umori sierosi sola, o in un colle fauci, e colle tonsille: nell' infiammazione convengono gli stessi rimedi esterni, ed interni sin qui proposti pei simili tumori delle tonsille (112. e seg.) Si sono veduti guarire rilassamenti dell' uvola per mezzo delle scaristiazioni satte al velo palatino, essendosi per esse sgravata la siussione. Quando essa sia fatta pendula, e scirrosa, si può recidere (b), nè il taglio di questa particella ossende in alcun modo la voce, o la deglutizione, come è comun timore.

Angina peftilenziale, 120. Debbo avvertirvi di una certa epidemica infiammazione di gola, che cominciò in
Ispagna l'anno 1610., donde passò in Italia,
ove durò più di 20. anni con tanto surore, e
tanta strage, che questa malattia prima chiamata dagli Spagnuoli garrotillo, perchè i malati ne erano sossocia, come se da un laccio
sossocia sossocia, su poi dagl' Italiani nominata

apre di buon' ora ne' luoghi più convenienti, ne succedono poi ascessi di cattiva natura, con moltiplicati seni, e caverne, dai quali si vedono poi uscire lembi di quel tessuto fracidi, e quasi canerenati, e talvolta medesimamente lobi delle accennate glandule, sicchè la saliva stessa per qualche tempo ne coli

ficche la saliva stessa per qualche tempo ne coli.

(a) Il modo di ciò sare è insegnato nel Trast. delle operazioni Tom. 11. cap. XVIII.

(b) In che modo debbasi fare questa recisione, vedasi nel luogo cit, delle Operazioni,

minata morbo strangolatorio, pestilente affetto delle fauci, carboncello anginoso, angina pestidenziale, laccio della gola, ascesso suffocativo, e pestilente de fanciulli, afte maligne, suoco facro, e con altri spaventosi nomi. Vedete le Consultazioni di Ludovico MERCADO cap. X. Consultazione XXIV. (a), Gioanni Andrea SGAM-BATO de pestilente faucium adfectu Neapoli sæviente (b), EZIO CLETO de morbo strangulaçorio (c), MARCO AURELIO SEVERINO nel suo Opuscolo de pestilente, ac præsocante pueros abscessu, aggiunto al Trattato della recondita nazura degli ascessi. Erasi quasi perduta la memoria di questo pestilente morbo, quando nuovamente comparve in Inghilterra, ed in Francia, non fono molti anni (d), ove io ancora ho potuto vederlo, e vo'darne la descrizione, e la cura, quale ci fu comunicata da Gioanni FOTHERGILL celebre Medico di Londra (e), acciocché sappiate conoscerlo, e curarlo, se mai ( il che tolga Iddio ) aveste a trattarlo alruna volta. Evyi niente di esaggerato, e la nuova

<sup>(</sup>a) Le Consultazioni di questo verbosissimo Spagnuolo formano il v. Tom. della raccolta di sutte le sue Opere stampate in cinque volumi in foglio a Francsore l'anno 1614.

<sup>(</sup>b) Stampato a Napoli l'anno 1620. in 4. (c) Stampato a Roma l'anno 1636. in 8.

<sup>(</sup>d) In Inghilterra se ne videro alcuni ammalati sin dall' anno 1739., su poi frequentissimo dal 1748. sin oltre il 1752. In Francia comparve nell' Autunno del 1748. e non cessò che nel 1752.

del 1748., e non cessò, che nel 1753.

(e) In un suo Trattatello intitolato: Description du mal· de gorge accompagné d'ulcères, qui a paru à Londres &c. traduit de l'Anglois par Mr. de la CHA-PELLE. Paris 1749. in 12.

nuova descrizione colle antiche de' nominati Autori concorda (a).

E' contagiosa

121. In tutt' i Paesi, dove comparve questa malattia, fi offervò, che i fanciulli principalmente, ed i giovani, le femmine piuttoso che i maschi, n'erano sorpresi, e ancor più, se deboli fossero, e cagionevoli. Quando incominciava a mettersi in una famiglia, per lo più tutti la ricevevano, se conversavano inseme. Terribile è la storia raccontata dal COR-TESIO pag. 698. delle sue Miscellance (b): Divi Francisci Custos hac lue obsessus consillas solummodo. & gargareonem inflammacione lasa habebat, & continuo querebatur, se percipere in ore fætorem quemdam; & ut hac de re certior redderetur, ad se vocavie Baccalaureum quemdam amicissimum, rogavitque, ut vellet olfacere, per cipereque naribus, an verum effet, talem fatorem emittere, an ab ejus imaginatione proditet. Olfecit Bacculaureus, me præsente ( dice il CORTESIO ) & muleis aliis., & statim, nonnullis elapsis horis, decubuit sola faucium, & glandularum inflammatione vexatus absque manifesta corruptione partium, omnibusque præsidiis ex arte factis, quarto die suffocatus periit. Il MERCADO racconta di una nutrice, a cui si cancrenò la mammella, per aver allattato un fanciullo, che avea tal malattia, e al padre s' infiammò il dito, e contrasse lo stesso male di gola, per avergli messo quel sito in bocca. 122. Esta

<sup>(</sup>a) Chi desiderasse ulteriori notizie circa la storia di si seroce morbo, legga nella Scelta di Opuscoli interessanti, che già si stampavano in Torino, Tom.

1. per l'anno 1777. la Storia della squinanzia cancre; nosa di Gioanni Brugnone.

(b) Stampare a Messina in foglio l'anno 1625.

Suoi fegni.

122. Essa comincia ordinariamente colla verzigine, o giramento di capo, preceduto sovente da una debolezza, e tremore fimile a quello di un accesso di sebbre: succede tosto un gran calore, alternandosi il freddo, e il caldo per alcune ore, sino che poi questo diviene intenfissimo, e costante. Allora il malato si lagna di un dolore di capo acutissimo, di calore, e dolore in gola, di rigidezza del collo per lo più dolorofissima con vomito, o diarrea, o amendue infieme, Il volto si sa rosso, e gonfio, gli occhi infiammati, e umidi di lagrime, fuccedono vigilie, inquietudini, e debolezza. Il morbo sorprende ordinariamente al mattino, e fulla sera il calore, e l'inquietudine crescono fin verso il mattino seguente, nel qual tempo, dopo un leggierissimo, breve, e torbido sonno, si trovano bagnati di sudore, pel quale diminuisce il calore, e l'inquietudine, onde pare, che in qualche modo la febbre fia intermittense. Esaminando la bocca, e le fauci dopo il primo accesso, si vedono l'uvola, e le tonfille molto turgide, e di un color rosso vermiglio, come pure il velo pendulo del palato, e tutte le fauci. Alcune volte si osservano macchie pallide più, o meno irregolari, ma circondate dallo stesso color vermiglio: quelle macchie sono molli al tatto, come se fotto vi fosse umore. Generalmente al secondo giorno della malattia il volto, il collo, il petto, e le mani sono di un color rosso erisipelazoso, e tumide, e vi si elevano tubercoletti rossi, e quantunque per questa espulsione i sintomi universali si facciano più miti, quelli però della gola continuano, anzi fi fanno più gravi, fuori che le macchie bianche diventano d'un color bianco opaco, ed allora fi vede, che se prima pareva, che coprissero un ascesso, non erano

erano in realtà, se non escare fatte sulla superficie di un'ulcera. Tutte le parti della gola sono soggette a quelle ulceragioni; ma genetalmente cominciano ad apparire ne' fuoi angoli sotto, e sopra le tonfille, comecché sovente se ne vedano anche al velo pendulo, e al di dietro di esso nella faringe, alla faccia interna delle guance, e alla base della lingua, le quali parti ne sono coperte come da un'escara spessa. Quando il male è benigno, in vece dell'escara, molte, o soltanto alcune delle stesse parti sono ulcerate superfizialmente, e irregolarmente, nè da altro segno se ne distingue l'ulceragione. che dal vederne la superficie scabra, e disuguale. Le parotidi dell' uno, e dell' altro lato gonfiano, e si fanno dure, e dolorose, e nel furore del morbo tutto il collo diviene tumido. ed edematoso, stendendosi il sumore sino al petto con pericolo di suffocazione. Il polso è generalmente precipitoso, in alcuni duro, e piccolo. in altri pieno. Il sangue estratto nel principio della malattia difficilmente si coagula, ed è vermiglio, l'urina cruda, e pallida, poi diventa biliosa, e torbida; la sete non è grande, e la lingua coperta di un umore spesso, e bianco: esala dalla bocca, e dalle narici un odore putridissimo, e la deglutizione è più, o meno impedita a proporzione della gonfiezza maggiore, o minore. Finalmente l'ulceragione si estende verso le narici, che si osservano internamente rosse, oscure, e livide, ne cola una sanie chiara, e corrosiva, meschiata con materia bianca, spessa, e putrida, della quale tanta è l'acrimonia, che esulcera le parti, ove posa per qualche tempo, e vi eleva vescichette principalmente agli angoli delle labbra, e fulle guance, e fe i fanciulli ne ingojano, forgono accidenti, che dimostrano l'escoriazione degl'intestini, sicchè

n efulcera poi anche l'ano. Sopravviene emorzagia dal naso per lo più mortale, e nelle donne è anticipato, e più copioso il flusso me-Aruale, così che esso pure minaccia pericolo.

123. Tutti questi sintomi (122) dimostrano una costituzione di umori acri, putrefacienti al sommo grado, come meglio faremo notare nella risipola maligna (161). La cavata di sangue ( secondo l'osservazione di molti Autori ) fu sempre piuttosto perniciosa, e ancor più i purganti. " L'uso di questi ( dice il FOTHER-GILL (a) ) quantunque dolci, e femplicemente » lassativi, apportò fintomi pericolofissimi, il » rossor della pelle svanì, crebbe la slussione » alla gola con pericolo di suffocazione, e, con-» tinuando le evacuazioni, la gola divenne » molle, ricascante, secca, e livida, e i ma-» lati poche ore dopo moritono". Sono anche stati provati nocivi i rimedi nitrosi, e rinfrescanti, essendo per essi cresciuta la debolezza, e sopravvenuti copiosi sudori, o slussi di ventre, che fino alla morte resero sempre più debole il malato: allora il polso si abbassò, la respirazione si fece difficile, e l'estremità fredde, gli occhi perdettero il loro splendore, e le forze diminuirono a poco a poco fino all' estinzione. L'esperienza adunque dimostrò, che, quando al principio del morbo vi era il vomito, giovava di ajutarlo, facendo bevere un' infufione di thé verde, di fiori di camomilla, di cardo benedetto con alcuni grani d'ipecaquana; anzi il celebre HUXAM (b), per eccitare un maggior

Cura in-

<sup>(</sup>a) Nella Dissertazione qui sopra citata.

(b) Vedasi la sua Dissertazione sur les maux de gorge gangréneux aggiunta all'altra sua Opera intitolata: Essi sur les fierres. Paris 1765. in 12.

gior vomito in alcuni fanciulli, che farebbeto altrimenti stati sussociati dalla copia dell' umore, che loro sgorgava in gola, su alcuna volta obbligato di far uso dell' ossenele squillitico, o dell' essenza di antimonio. Conviene poi somministrare ogni cinque, o sei ore qualche cordiale calefaciente aromatico, come la polvere di contrajerva, le confezioni cardiache composte, le spezie aromatiche, l'acqua alesseria spiritosa, l'acqua di menta ec., per esempio:

R. Aq. alexiter. simplic. unc. vj, alexiter. spirituos. unc. j s., confect. cardiac. drachm. j s., pulver. simplic. contrajerv. drachm. s., syr. croc. unc. s., cap. cochlearia due singulis tribus horis.

Il soprabbondante flusso di ventre può essere mortale, perciò bisogna arrestarlo cogli astringenti, o cogli anodini, come col diascordio del FRACASTORIO sciolto nell'acqua di cannella orzaea, della quale si prenderà un cucchiajo dopo ogni evacuazione. Giovano pure le infufioni di origano, di marrubio, di salvia, e di menta; ma se sopravviene un sudor abbondante, e fetido. conviene allora fomministrare a piccola dose l'elissire di vetriuolo colla tintura della corteccia Peruviana, che è il miglior antisettico. Nella somma debolezza, per sostenere le forze del malato furono utili i vescicanti applicati alle gambe, e alle braccia. Il sopraccitato HUXAM li fece applicare alcune volte con vantaggio alle parti laterali del collo dal di fotto delle orecchie fino alle clavicole. Deefi avvertire il malato di non mai inghiottire l'umore, che ha in bocca, perchè non tragga con sommo danno quella

quella putrida materia nello stomaco, e negli intestini.

124. Come qui sopra abbiamo avvertito (122), quell'escare non coprono un ascesso, ma un ulcere, e su provato pericoloso, anzi mortale il proccurarne tostamente la caduta; imperciocchè l'ulcere si saceva depascente, e la cancrena si allargava, ritornando l'escara in breve tempo più spessa, e più tenace. Quando la malattia è benigna, può bastare un gargarismo dell'infusione di salvia, e di rose con qualche poco di ossimele, oppure una decozione di sichi pingui, di rose rosse, aggiungendovi mele, o mucilaggine di pomi cotogni, siroppo di more, tintura di mirra, o spirito di vetriuolo. Ma, se la putresazione è al sommo grado, sono necessari antisettici di maggior essicacia, come il seguente:

Cura efter-

Rl. Decoct. pettoral. lib.; j, tempore ebullitionis adde radic. contrajerv. ruditer pulver. unc. ss., filtreturdecoctio, & adde vin. alb. generos. unc. ij., tinctur. myrrh. unc. ss, mell. optim. drachm. vj., utatur pro gargarismo;

o se ne facciamo injezioni in bocca ai fanciulli, che non sapessero gargarizzare. I gargarismi, o le injezioni si deono ripetere sovente, perchè la materia non goccioli nell'esosago, o troppo non si accumuli nelle fauci, e nella bocca. Quando l'escare sono larghe, e tardano troppo a distaccarsi, vi si può aggiungere il mele egiziaco. Lo stesso Huxam loda pure il fare ricevere ia bocca il vapore d'insusione calda di rose rosse, di siori di camomilla di mirra, e di canfora bolliti nell'aceto. In Francia, ove su questa malattia l'anno 1753., giovò una dissoluzione di xxiv. grani di sale di saturno in due once d'acqua di piantaggine, con cui si

toccavano l'escare. Ci avverte l'HUXAM cha le parotidi, le quali gonfiarono nell'impeto del morbo, restarono, quantunque esso fosse terminato, così dure, che non su possibile di risolverne il tumore, se non coi mercuriali esterni, ed interni, i quali però sarebbero stati sommamente nocivi da principio con produrre una maggiore dissoluzione degli umori. Questa dissoluzione, e putrefazione alcune volte su tale. che accadevano, come già si è detto (122), emorragie dal naso, o dalla gola, contro le quali nessun rimedio giovava, oppure i malagi morivano esausti dal flusso di ventre col ventricolo, e cogl'intestini cancrenati per la causticità di quella materia, che giù colava dalla bocca, onde raccomandano gli Autori, che i malati non la ingoino. Quando ciò fosse accaduto, ci assicurano essere state utili le bevande emollienti, e mucilagginose, e le mucilaggini stesse applicate all'ano, che n'è ardonte, ed esulcerato (122), non tralasciando però i soprallodati antisettici interni (123), ed esterni.

· Dell' infiammazione delle mammelle.

# S. IV.

Cagioni
congiunte, e
antecedenti
di tale infiammazione.

125. Se alle puerpere, ed alle nutrici è per alcuna cagione impedita la circolazione, o l'evacuazione del latte, raccogliendosi questo morbosamente nelle glandule delle mammelle, le distende, e le gonsia con sintomi d'insiammazione più o meno forte, secondo la quantità, e la qualità del latte raccolto, e secondo la forza accresciuta de'vasi (50). Possono essere cagione di questa impedita, o suppressa circolazione, o evacuazione del latte l'aria fredda, che improvvisamente sorprenda le mammelle,

puerpere vi sogliono applicare, per far passare, come dicono, il latte, la sua troppa crassezza, abbondanza, o cattiva qualità, la suppressa evacuazione de' lochj, le passioni dell' animo, il contatto de' corpi duri, irritanti, comprimenti ec. Egli è raro, che una mammella sola sia assetta, vicendevolmente, e successivamente or l' una, or l' altra s' inzuppano, o amendue insieme.

126. Se il latte si fosse aggrumato nelle mammelle solamente per la sua soprabbondanza, e spessezza, nè il tumore sosse accompagnato, come alcune volte accade, da perspicui accidenti d'insiammazione, è molto lodato l'ungere la parte, o l'applicarvi sopra un pezzo di tela spalmato del seguente linimento:

Cura del 185 more possiinfiammatos

Rl. Ol. amygdal. dulc. quantum cupis : huic exacte mifce in mortario lapideo, aut vitreo spirit. sal. ammoniac. cum calce viva parati q. s. pro componendo linimento.

Il KLEIN nella sua scelta de' medicamenti (a) propone, e raccomanda come molto efficace un linimento composto con butiro fresco e sala volatile di corno di cervo. Il BARBEYRAC (b) nelle sue formole loda il seguente:

R. Axung. serp. unc. j. s.: busyr. venc. anc. s; agitentur simul, & liquentur ad ignem: dein adde succ. menth. unc. j.,

BERTRANDI TUM, TOM. I.

<sup>(</sup>a) Selectus rationalis medicaminum. Francosurti 1756.

<sup>(</sup>b) Medicamentorum constitutio, seu formula. Lugdung. 1751. in 12.

THE RESERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESER THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. Annual of the last AND THE PROPERTY IS NOT IN LINE IN THE THE THE BOTTOME I IN THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE THE RESERVE THE PARTY OF THE PA manufacture of manufacture of any The second secon is a many new across metholism di pierra. an office of the announced scotto in the ACTUME I THE PROPERTY AND ADDRESS. me a not applicate questi nimello, de fi The same prime principle of he con Com in topmaggiunge la febbre, a ammatata farire un distore publiche in tota i comme della mammella coll georgicianti alla Suppurazione, lie ranti ammie

le sue ghiandole (ciò che è assai comune), o queste, e quello insieme, è necessario di ben distinguere i segni, che ci fanno conoscere la

precisa sede di tali inzuppamenti:

Nel primo caso, cioè quando l'infiammaziane occupa solamente il tessuto cellulare, la mammella uniformemente si distende, e gonfia, talmente, che non cangia figura, fuorchè la materia si accumulasse in diversi ascessi, e medesimamente suole in tal caso accadere, che, rompendosene i tramezzi, e poscia comunicando insieme, la mammella di nuovo si faccia regolarmente globosa, ed uniforme. Questa sorta di -ascessi produce vivissimi dolori, primacche si aprano naturalmente, o che la fluttuazione della materia divenga assai sensibile, perchè se ne possa fare l'apertura; e non di rado la gonfiezza si stende sino all'ascella, ed al braccio, ficchè la donna è obbligata tenerlo disteso, ed immobile.

Segni dell inzuppamento cellulare

B Nel secondo caso la mammella è di supersicie disugnale con elevazioni a varie distanze: col tatto si conosce, che i varj tumori non .Iono molto vicini, nè dapprincipio gl'integumenti della mammella sono molto distesi, nè il dolore così forte, non crescendo proporzionatamente come cresce il tumore, ma si fa poi maggiore sul fine, quando la suppurazione è affatto determinata.

Del glandus

y Nel terzo caso la mammella è inugualmen- Del misto. te gonfia con durezza maggiore in un luogo. che in un altro, e i dolori pullatili fi fanno sentire, come nel caso precedente.

La suppurazione si fa prontamente, e anche abbondante nel primo (a), ma la marcia è di colore, e di confistenza diluguale; contuttocciò l'ulcere, che vi rimane, si deterge facil-

mente,

mente, purche non vi si aggiungano altre complicazioni, e principalmente se l'ascesso si apre

spontaneamente.

e Essa suppurazione si fa più lentamente nel secondo caso (\$\beta\$), e non si produce nel medesimo tempo in tutta l'estensione della mammella: comincia in un luogo, poi si fa sentire in un altro, e mentrecchè si vuota un ascesso, diventa dolorosa un'altra parte della mammella, quivi formandosene un altro, e più e più se ne formano, sinchè tutte le ghiandole sieno suppurate le une dopo le altre: perlaqualcosa alcune volte la malattia dura per alcuni mesi.

E Nel terzo caso (y) si formano anche disserenti ascessi; ma siccome in ciascuno di essi sono comprese varie ghiandole, la mammella si scarica più prontamente che nel secondo caso, e

più lentamente che nel primo.

Curz della mammella Juppurata.

129. Molti Autori raccomandano di aspettare la spontanea apertura del tumore, non solamen--te acciocchè l'aria meno offenda le tenere parti interne, ma ancor più perchè la lunga dimora della materia acceleri la distruzione de tramezzi, ·da' quali il tumore è diviso in varj ascessi, sciolga, ed ammollisca sempre più le ghiandole, onde non si debbano moltiplicare i tagli: inoltre lo strumento tagliente lascia sempre cicatrici più o meno grandi, e difformi, che molto spiacciono alle donne. Allo incontrario, se si ·lasciano aprire spontaneamente, dopo la guarigione appena vi rimane vestigio dell'apertura. Se, perchè l'inzuppamento si è fatto lentamente, e con pochi fintomi d'infiammazione, la suppurazione troppo tardasse, bisognerebbe scuoterla con qualche suppurante essicace, come farebbe il seguente:

R. Radic. alth., lilior, albor. a unc. ij, folior. acetos. & acanth. a m. ij, coque ad putrilaginem; deinde pulpa per cribrum trajecta adde ung. basilicon., & fermene. veter. a unc. j., ol. lilior. albor. q. s. fiat cataplasma.

Si potrebbero applicare gli empiastri di gomma ammoniaca, di diaquilon semplice, delle muci-laggini, riformandogli insieme con olio di gigli bianchi, ed aggiungendovi zasserano, sterco di co-tombo, e simili, i quali rimedi sopici si debbono continuare, anche dopo che la mammella è aperta, nel caso che vi sieno rimaste durezze, le quali pure sogliono difficilmente sciorsi, e suppurare. Con morbidi stuelli intrisi d'unguento digestivo gli ascessi si terranno aperti, e si saranno purgare, e, se sia necessario di astergere, non solamente vi si aggiungeranno polveri aster-sive, come mirra, incenso, aristolochia, iride siorentina ec., ma nelle sinuosità, sendo bisogno, si faranno injezioni, come la seguente:

R. Decoct. hord., & flor. hyperic. a une. iv.; mell. rosac. unc. ij. misce.

Se dal fondo di qualche ascesso le materie potessero dissicimente colare, si faranno le opportune controaperture; che se sono di buona qualità, e consistenza, e colano facilmente, e se
le durezze vanno sciogliendosi, si tralascierà
l'uso di que cataplasmi tanto ammollitivi, e
di quegli empiastri tanto attraenti, bastando
allora di applicarvi l'unguento di altea, il sosco,
o, come dicesi, della madre, la pomata di spermaceti, e cera vergine satta coll'olio di mandorle dolci, oppure l'empiastro di Norimberga
tescentemente composto.

E 3 130. Quana

Cura delle durezze, che qualche volta rimangono,

130. Quantunque la suppurazione fosse succeduta bene, tuttavia, se colla diminuzione della marcia non si vedessero sciogliere tutte le durezze della mammella, converrebbe allora l'empiastro di galbano, quello di cicuta, il de ranis rifotmato con quello delle mucilaggini . o di sapone. Il LEVRET (a) raccomanda come fommamente efficace in questo caso, lo fillicidio, o, come dicono, la doccia d'acqua pievana, o della destillata, in ciascuna pinta della quale siansi disciolte due dramme, o mezz' oncia di fal fisso di cartaro. Può alcuna volta Dastare di applicarvi compresse bagnare in quel liquore caldo, oppure nella lisciva di ceneri di surmenti, o di ginestre, o anche una leggiere dissoluzione di supone di Alicane nell'acqua comune. Quando l'ammalata non abbia più alcun dolore alla mammella, giova allora farle fare qualche muovimento del braccio corrispondente, pel quale, mettendoù in azione i muscoli grande, e piccolo pettorali, la mammella n'è anche scossa, dal che gli umori sono pure smossi, sicchè possano o evacuarsi, se già sotro travasati, o mettersi in muovimento colla massa universale, se solamente Aagnami ne proprj vafi.

Degli altri tumori prodotti dal latte li partetà qui appresso tra gli aforssi interni ( 221, )

· sign )

Dè

<sup>(</sup>a) Nel suo libro intitolato: L'art des accouchemens demontré par des principes de Physique. Paris 1763 in 8.

## De' tubercoli infiammatori.

## S. V.

121. Tra i tubercoli infiammatori sono cont Definizione presi il fina, il figetto, il terminto, ed il fue dei tubercoli roscolo: non sono essi guari disserenti tra di se, infiammato se non per la maggiore, o minore profondità, ed elevazione.

a Il fima (a) è un tubercolo circoscritto, Del fima cutaneo, non spoleo elevato, che presto suppura, riducendoù tutto in pus:

B Il figetto (b) è più ampio, ed ancor me- Del figetto no elevato, più dolorofo, ma che difficilmente iuppura:

y Il terminto è un tubercolo rosseggiante, e doloroso con una pustula in cima nera, o livida, che si secca come una crosta: dicesi, che abbia tratto il suo nome da questa pustula, che rassimiglia al frutto del cerminuo (c):

Del termina

(a) Il vocabolo Greco phyma propriamente si-gnifica qualunque tubercolo nascente da se senza cagione esterna, epperciò CBLSO ( de Modic. lib. 5. cap. 18. pag. 254. n. 16. ) dice: malagna ad firumam. & orientia tubercula, qua phymata vocantur. Lo stesso

Autore però (lib. 5. cap. 28. pag. 325. n. 9.) dà il nome di fima a un tubercolo particolare furunculo

finile, fed roundius, & planius, fape etiam majus.

(b) Il fignto dai Latini dicevali panus: panum et finilitudinem figura nostri vocant (CELS. loc. ultimo cit. n. 10.); e panus presso i Latini significa propriamente un gomitolo di lana, o il fulo carico di filo, oppure la navicella, che serve per tessere, detta la spola: dalla figura adunque o della spola, o del faso, o, ciò, che è più probabile, del gomitolo pa-

- (c) Il terminto è l'albero, da cui stilla la trementina, meglio chiamato terebinto, il qual albero fa un Del furan-

Il furoncolo è un tumore maggiore dei tre nominati, il quale però di rado supera la grossezza di un uovo di colombo: esso è resistente al tatto, appuntato quasi in piramide, di un color rosso intenso, con calore, e dolore acerbo, urente, e pungente. Alcuni pretendono, ch'esso abbia tratto il suo nome dal surore, con cui si produce, altri dai molti forellini, co'quali resta bucherato, quando suppura.

Cagioni di questi tudeteoli. 132. La viscidità del sangue, per cui esso diventa acre, è la cagione principale di questi tumori, i quali per lo più sogliono nascere nello stesso tempo in vari luoghi, o succedersi. I rimedi interni debbono essere gli stessi, che

Cura del

nello stesso tempo in varj luoghi, o succederti. I rimedi interni debbono essere gli stessi, che per la risipola benigna (167). Il sima con quanta prestezza suppura (131. a), con altrettanta si essica, che di rado gli si debbono applicare rimedi: l'empiastro di spermaceti con quello di altea, delle mucilaggini, o di meliloto ne promuovono la suppurazione: servono per essiccarlo l'unguento di tuzia, o di litargirio. Sul sigetlo, quantunque difficilmente suppuri, nulladimeno non si deono applicare sup-

Del figulo,

puranti più attivi dei sovradetti; imperciocche pel loro stimolo potrebbe crescere, e farsi di maggior estensione, come se sosse un furoncolo. Pel terminto, se è molto doloroso, come suole alcune volte accadere, giovano i cataplasmi composti delle mucilaggini di semi di psillio.

e di radici di altea, le faglie di malva macerate nel latte caldo, quelle di tasso barbasso, di pa-

Cura idel

frutto ovato, che può benissimo aver dato il nome a questo tubercolo. Galeno però con maggiore probabilità nel suo Comment. Iv. al libro vi. de' morbi epidemici d' ippocrate lo deriva dalla somiglianza, che ha coi ceci chiamati in Greco therebineo; o therminsoi.

rietaria, di viole, la polpa di pomi cotogni cotti, ed impastati col burro. Fatta la suppurazione per lo più il tumore è esausto, e si

secca facilmente (a).

133. Il furoncolo maggiore di quegli altri Del furonzumori alcune volte è accompagnato da febbre, colo. e dolore intensissimo, e se è vicino a parti nervose, e tendinose, produce anche lungi dolore, tensione, inzuppamento, ed insiammazione. Debbonfi allora ripetere le cavate di sangue, raccomandare maggiormente la dieta, e i diluenti, ed antiflogistici interni, i quali faranno tanto più necessarj, quanto più i furoncoli vedrannosi moltiplicare, e succedersi in varie parti. Giovano, per promoverne più pre-Ro la suppurazione, tutti que' cataplasmi emollienei, che abbiamo proposti per far suppurare il flemmone (77., 78., 79., e 80.). Gli empiastri gommosi, come abbiamo avvertito del siguilo (132), fogliono crescere il dolore, ed il calore, senza però eccitare ne più presta, ne più perfetta la suppurazione.

134. Il furoncolo suole suppurare in punta. fenza che tutta la massa del tumore sia ammollita; nè bisogna essere troppo solleciti a farne l'apertura, prima perchè quasi sempre si sa da se, poi perchè il rimanente più difficilmente si potrebbe trarre alla suppurazione. Quella solle-

Il furoneolo Suppurato deesi lafciar aprire

<sup>(</sup>a) Quando in vece di suppurare il urminto si essiça, sotto quella crosta nera si raccoglie una materia spessa, e untuosa, la quale, comprimendo la base del tumore, n'esce sotto la forma di vermicelli. Dal che sembra potersi conchiudere, che la sede del terminto sia nelle glandule sebacee. Esso è frequente ne giovinastri dai 15. ai 20. anni, e suol comparire moltiplicato, non mai solitario, alle tempia alla fronte, alle ali del nato ec-

Cafi, ove conviene sprirlo coll' arte,

estudine però non sarebbe tanto condannevole, se il furoncolo fosse in parti molli, e adipose, ove facilmente si potessero produrre seni, come all'ano, al perineo, alla vulva, e al canto interno dell'occhio, e in questo ultimo luogo, fosse anco un sona, un siguso, o un termino, presto pure dovrebbesi aprire, perchè la marcia non vada ad ossendere il sacco lagrimale,

come dimostreremo altrove (a).

135. Quando il furoncolo si apre da se, suole uscire poca marcia viscida, e tenacissima, a cui vien dietro po' poco d'icore: allora giovano i medicamenti gommosi mescolati co' mucilagginosi, imperciocche è necessario, che suppuri tutta la sostanza cellulosa, ove il sumore ha la sua sede. Se v'è una sufficiente apertura, si applicheranno filaccica intrife nell'unguento bafilicone, o nel balsamo dell'ARCEO, o in altro ancor più efficace digestivo, per cui la tenscissima materia maggiormente si sciolga; se nò si dilaterà, e per poter fare a dovere le necessarie medioszioni, e per rendere più facile l'uscita non meno di essa materia, che di certi fiorchetti (b) di quella sostanza macerata, e semiputrida, che vedonfi poi uscire, e lasciare un vacuo più o meno grande sotto la cue. Sonvi furoncoli, come fu già notato dal FORESTO melle sur offervaçioni (c), che estendono le loro radici moko lungi, tali fogliono essere quelli, che vengene alle statiche, alle guance, al collo, e sotto le ascelle nella sostanza cellulosa, che 71E 188-

O dilatare l' apertura fpontanea.

(s) Trust. delle Operazioni tom. 11. cap. XVI.

<sup>(</sup>b) Questi fiocchi di cellulofu, che escone, suppurato che è il funncolo, sono chiamari da Cheso veneziulus furunculi (vedasi il luogo cit. della sua Medicina).

(c) Chirungicanum observationum libri moum, Leib.

1590. in 8.

riempie gl'intervalli de' muscoli, che trovansi in quelle parti. Sissatti furoncoli, se non si fanno a tempo le necessarie aperture, e dilatazioni, come suole non di rado accadere per la trascuraggine de' malati, lasciano poi seni, e sistole.

136. Quando i furoncoli si aprono con molti fori (131. ), alcune volte al di sotto di que' pezzi di cute, che sono tra i fori, rimanvi un vuoto; i feni non foglionfi allora riempire, nè la cute riattaccarsi, se non si tagliano le aje di cute, the fi ftendono dall'uno all'altro foro Altre volte quella sostanza cellulosa lacera. macerata, e fordida di marcia viscida (135), profondamente, e lungi ai lati si stende, sicchè difficilissimamente a può muovere alla suppuragione, e far separare, se al digestivo qualche cateretico, e sorrestvo non si aggiunge. E in generale ne' funoncoli l'abbondanza della marcia, che n'esce, eccede la massa del comore, nè secondo quella questo sempre cede, e ciò perchè la materia fuol venire da lungi per certi anderivieni, che fi stendono nelle parti vicine: bisogna dunque esaurirli con una lunga, e copiola suppurazione, facendo anche, come dissisno (135), le opportune dilatazioni, e debellando il vizio degli umori, pel quale i furoncoli fono stati prodotti (a).

Attenzione de averficire ca certi paraticolari furoncoli.

Del

<sup>(</sup>a) Non si sgomentino però i malati di certe durezze qualche volta assai prosonde, che sovente rimangono dopo la cicatrice de furonceli; soglionsi esse a poco a poco risolvere da se senza il minimo accidente.

#### Del Panereccio.

# S. VI.

Definiziose, ed etimologia del pasereccio. 137. Il panereccio detto da' Toscani patereccio, o paterecciolo, e dai Latini panaritium o reduvia (a), è un tumore infiammatorio, che viene alla estremità di alcun dito ordinariamente alle radici delle ugne. La sua etimologia su tratta da due vocaboli Greci para contro, ed onyx unghia, quasi si dicesse umore contro l'unghia, onde i Greci il chiamatono paronychia.

Perchè il panereccio sia tanto dolo-roso.

138. Siccome i morbi sono sempre gli stessi, ed il luogo solo ne sa la disserenza, non dee recar maraviglia, se questa instammazione, quantunque d'una parte piccola, è alcune volte dolorosissima, ed accompagnata da gravi accidenti, essendo essa parte guernita di molti nervi, che

<sup>(</sup>a) Quantunque comunemente s'interpreti la parola latina reduvia per panereccio, noi crederemmo però, che propriamente significhi le pipiu, cioè quei pezzetti di cute, che sovente si sollevano, e si staccano dal rimanente verso la punta delle dita, e c'induciamo a così pensare, prima perche FESTO così spiega questa parola; Rediviam quidam, alii reduviam appellant, quim circa ungues cutis fe refolvit, quia lure est solvere; poi perchè la reduvis era riguardata come un morbo leggerissimo, onde Cicerone nell'Orizione pro Roscio Amerino: Intelligo me ante unpus, Judices, hac scrutari, & propemodum errare, 141, quum capiți SEXTI ROSCII mederi debeam, reduvian cirem. Anzi n'è persino nato il proverbio: De redevis queritur, quando uno si lagna di cose di nessun momento, diffimulando le maggiori. Ma chi non fa, che il panereccio, parlando anche foltanto di quello, che viene fotto l'unghie, che era il folo così chiamato dagli Antichi, è una malattia dolorofifima che non vuol esser negletta?

che quivi terminanfi con papille piucche in altre parti capaci di sensazione, e con un intreccio di vafi, che vi formano corona, oltrecchè la cute delle dita non è capace di molta eftensione.

139. Le cagioni del panereccio possono essere tutte quelle, che abbiamo accennato dell'infiammazione in generale (64., 65.): sovente dipende da punture d'aghi, di spine, o sestuche, che siansi infisse in quella parte, o dall'impru-

dente estirpazione delle pipite.

140. Quattro sono le spezie de' panerecci. La prima è, quando il tumore, e la infiammazione fono nella tunica adipofa fotto la cute: la seconda, quando sono sotto l'unghia: la terza, quando il periostio stesso è insiammato: infine la quarta, quando la infiammazione occupa la guaina de' tendini flessori, e questi stessi sono infiammati. qualche volta fino al loro corpo muscolare (a).

141. In generale i segni di queste varie spezie di panerecci (140) sono gli stessi, che quelli di ogni altra infiammazione; ma in una spezie più che in un'altra, per ragione della struttura delle parti, sono più intensi, e vanno più lungi. Nella prima spezie il dito è più tumido, il malato sente un ardore, un martellamento veramente nella cute, e quantunque il tumore si stenda lungo il dito, nulladimeno però evvi un luogo, dove la elevazione è più circoscritta. 142. Nella ·

Quali ne fiano le cagior

Quattro ne sono le spes

Segni del della prima

<sup>(</sup>a) Stando all' etimologia, non vi sarebbe altra spezie di panereccio, che quella, che si sa sotto, o contro l'unghia; con tutto ciò noi crediamo, che l'Astruc (Traité des tumeurs & des ulceres tom. 1. pag. 157.) biasimi a torto i Cerusici di averlo difiinto nelle quattro spezie suddette, perchè l'etimologia non ha mai fatto regola, come già si è detto, :parlando del bubone.

Della secon- '

142. Nella seconda spezie (140) il tumbe ·lungo il dito è per lo più minore, maggiore però attorno l'unghia, la qual cangia di colore, facendosi da principio livida, e rossigna, poi pallida, e vacillante: il malato vi sente sotto un acerbissimo dolore, e un senso di gravezza ·lungo il dito.

Della terza. -

143. Nella terza spezie (140) il tumore per la lunghezza del dito è ancora minore, che nella seconda (142), i dolori fono più acerbi. e sentonsi veramente contro l'osso: alla cute per lo più non appajono, se non alcune strisce erisipelatose.

144. Nella quarta spezie (140) il tumore non ·è grande alla estremità del dito, sono più tumidi gl'internodi, gonfia la mano, sentesi quasi uno strangolamento al luogo del ligamento detto anulare interno del carpo, il dolore si stende lungo il cubito fino al condilo interno dell' omero, onde traggono origine i muscoli stessori delle dita, e infine si avanza sino alla spalla. Nella seconda, e terza spezie evvi sempre la febbre, veglie, e dolori atrocissimi, ma in questa per lo più succedono anche le convulsioni, ed il delirio: la mano, l'avan-braccio, ed il braccio fino alla spalla si fanno a poco a poco tumidi con istrisce dure, nodose, che occupano gl' interstizi de' muscoli: il tumore su quelle parti cresce poi con surore, come un vero flemmone suffocativo (85., 86., 87.), tutto l'articolo diventa pesantissimo, ardente, ed infiammato, si fanno ascessi in varj luoghi, se pure non anticipa la cancrena, e si pericola della perdita del braccio, e perfino della vita.

Cura inter-

145. Di qualunque spezie sieno i panerecci, na, ed ester- egli è raro che si risolvano. Perciò, nel tempo na de pane-recej in ge- stesso, che si somministreranno i rimedi interni, come per le altre infiammazioni (161., 170.);

e che le cavate di fangue si faranno copiose, e fi ripeteranno secondo gli accidenti, e le diverse cagioni, che gli hanno prodotti, i locali dovranno effere emollienti, come farebbero le fomentazioni di decozione di malva, parietaria, melitoso, o viole, nelle quali il malato terrà immerso il dito. Alcuni propongono l'acqua pressoché bollente, altri il latte. Se le fomensazioni incomodano, o annojano, fi applicheranno cataplasimi fatti di quelle piante cotte a putrilaggine, e mescolate colle farine di orto. avena, semi di lino, o siengreco, aggiungendovi qualche poco di mele, o qualche grasso, come quello di galtina, di anitra ec. Sonvi Autori anche metodici, che raccomandano l'applicazione della *triaca* disciolta nello spirito di vino canforato, l'aglio macerato, e cotto nel latte o nella decozione di sabina, o di scordio, oppure lo stesso aglio contuso, e impastato colla eriaca, e colle foglie di affa fetida (a); e certamente tali rimedi acri, e calefacienti possono eccitare una più pronta suppurazione, ma è anche facile a capire, ch'essa con tali rimedi dovrà produrfi con maggiori dolori. Fabrizio Secondo II. ILDANO (b) raccomanda, che senza aspettarne la suppurazione perfetta, ammollito po' poco il dito col latte, in cui siansi fatti cuocere siori di camomilla, e di meliloto, semi di fiengreco, e di *pomi cotogni*, fi tagli a poco a poco, e fuper-

<sup>(</sup>a) La pianta dal nostro volgo, e quì dall' Autore chiamata affa fetida, è il chenopodium vulvaria del LINNEO (Systema natur. tom. 3. pag. 195.), offia l'atriplex fatide di Gioanni BAUNO (Histor plantar. tom. 11. pag. 974. ). Vedasi la pag. 197. del tom. 11. della Flora Pedemontana del nostro illustre Allioni 11. 2014.

<sup>(</sup>b) Observat. Chirurgicar. centur. 1, observ. 97.

fuperficialmente la cute, finche fi vedano alcune macchie rubiconde, dalle quali fiilli una materia roffigna, e fottile, poi vi fi applichino compresse imbevute nello fpirito di vino, nel quale siasi disciolta della triaca, ed afficura, che in questo modo senza suppurazione si possono guarire panerecci, cred'io, della prima spezie, accompagnati eziandio da gravi accidenti, com'erano certamente quelli, de'quali a questo modo curati ci ha lasciate le storie.

Cura particolare di quello della prima spezia.

146. Nella prima spezie di panereccio (140) non di rado suol elevarsi alla punta, ed ai lati del dito una vescichetta piena d'una materia rossigna, o citrina, della quale proccurando l' evacuazione, mirabilmente scemano gli accidenti; ma se la infiammazione si avanzasse alla suppurazione, si potranno applicare gli empiastri diaquilon, delle mucilaggini, di meliloto, o di altea; e quando in alcun luogo vedafi raccolto alcun poco di marcia, quivi tosto si dovrà fare l'apertura, o dilatare quella, che fi foffe fatta spontaneamente, se sosse troppo piccola, perchè la rigida cute del dito non avesse potuto rompersi sufficientemente: che se il malato si opponesse a tale apertura, o dilatazione, converrebbe avvertirlo, che ne potrà accadere perfino la carie dell'osso.

Della fecon-

147. Se il panereccio fosse della seconda spegis (140), bisognerà recidere l'unghia, perchè
non faccia pressione, nè impedisca l'uscita della
materia: si taglierà si lati, alla radice, od in
mezzo, o medesimamente si separerà tutta intera, secondo la sede, e l'estensione del morbo,
tanto più ch'ella dovrà per lo più cadere, dopo che il malato avrà sosseri gravissimi dolori,
perchè non su separata dapprincipio, con pericolo innoltre che la marcia abbia guastata la
sottoposta falange. Dopo avere in parte recisa,

De portata via intera l'anghia, si applicheranno rimedi, che possano eccitare la suppurazione, come il balsamo dell' ARCEO, l'unguento basilico, o altri simili co' sovranominati empiastri

(146).

148. Ma se il panericcio fosse della terza spe- Della terza zie (140), il che si conoscerà dall'acerbissimo dolore ofteocopo (143), non bisognerà aspettarne la perfetta suppurazione, anzi, ancorche immaturo, dovrebbe aprirfi, penetrando col ferro sino all'osso, sinchè ne sia reciso il periostio; che un'apertura, che non vi pervenisse, sarebbe affatto inutile. Quantunque poco, o nulla n'esca di materia, nulladimeno, tolta la continuità del periostio, come nelle serite del capo, quando è teso, ed infiammato il pericranio, colla semplice dilatazione i sintomi si acquetano.

149. Nel fare quella dilatazione (148) alcuni Autori raccomandano di farla ai lati del dito, per non offendere i tendini del sublime, e del profondo, la quale attenzione certamente converrebbe, se il tumore fosse alla prima, o alla seconda falange; ma quando fosse sull'ultima alla punta del dito, fi potrà francamente tagliare in mezzo, non essendovi più pericolo, che si offendano que' tendini, il solo tendine del profondo giungendo fino alla base di quell'ultima falange, ma non fino alla sua punta. Bisogna tagliare francamente, e fermamente, per essere ficuri di avere inciso il periostio; che altrimenti per le graffiature, che si facesseto a quella membrana, gli accidenti piuttosto crescerebbero, che diminuire. Quando l'infiammazione, e il sumore sono alla prima, o alla seconda falange, se, fatta ad un lato l'apertura, gli accidenti non iscemassero, se ne dovrà fare un'altra simile all'altro lato, che a questo modo sara BERTRANDI TUM, TOM. I.

Attention da averfi nel tagliare perioftio .

interamente tolta la tensione del periossio, cas gione di tutti que' sintomi.

Medicazione da farsi dopo reciso il periostio. 150. Dilatato il tumore, e reciso il periossio (149), se ne medica poi il sondo, come si sa nelle serite con iscopertura dell'osso (a), o nelle ulcere con carie (b), se l'osso scoperto si trovasse carios; avvertendo però, che l'ultima salange, quando è cariosa, piuttosto si separa intera, che risolversi in isquame, perlaqualcosa si proccurerà di separarla, tostochè mercè la suppurazione sarà sciolta dalle parti molli; è però vero, che quella del pollice più larga, e più grossa può qualche volta anche disquamars, onde non bisogna essere troppo solleciti a proccutarne la totale separazione.

Cura delle earoncole fopravvegnenti ai panerecej.

151. Dalle apérture fatte nell'una, e nell' altra spezie di panerecci (146. e seg.) suole pullulare una carne fungofa colla forma di caroncola, la quale occupa principalmente i lati dell' unghia. Si dee essa consumare co' caterecici, quali sono l'alume, il verrinolo, i precipitati mercuriali, il verderame, l' unguento egizhaco. il mondificativo di apio, e fimili; oppure fi dovrà recidere, roccando poi il luogo reciso colla pietra infernale, o applicandovi filaccica intrise nell'acqua di calce, per impedirne la mova vegetazione, che suole sovente accadere. onde si debba più d'una volta recidere, e cauterizzare. Cessata la pullulazione, si useranno l' unquenco di cuzia, o l'empiastro diacalciteos. E se si vedesse, che l'origine di quella caroncola dipendesse dalla pressione dell'unghia, quefta

<sup>(</sup>a) Vedasi nel Tratt. delle ferite il cap. delle ferite del capo.

<sup>(</sup>b) Vedasi nel Tratt, delle ulcere il cap, delle ulcere con carie dell'offo,

sta si dovrà tagliare o in parte, o assatto; che

altrimenti non cesserà di pullulare.

152. Quantunque negli Autori d'ogni fecolo si leggano osfervazioni di panerecci, che cagionarono cancrena, e morte, i quali perciò dovevano certamente effere stati della quarta spegie (140), nulladimeno il GARENGEOT fu il primo, che ne ha meglio dimostrata la sede, ed infegnatane la cura, nè potremo far meglio, che di trascriverla: "si dovrà primieramente , aprire quel piccolo tumore, che è verso la , punta del dito, fotto il quale per lo più si , sente la materia; il taglio si farà in lungo. , fino che fi abbia penetrato nella stessa guaina , del tendine, e ci accorgeremo di avervi ,, penetrato, vedendo uscire una linfa rossigna, e giallognola con qualche inflantaneo allevia-, mento de' dolori, i quali però non tardano , a ritornare egualmente forti. Può accadere, , che pel furore del morbo crepi senza taglio ,, la guaina stessa, ed allora dalla screpolatura ,, esce una sostanza fungosa, e rossigna, dotata , di squisitissimo senso. Questa non si dee tagliare, infino a tanto che non fiafi tolto lo , strangolamento, che vi sa al di sotto la stessa

,, 153. Perlaqualcosa entro quell' apertura (152), comunque sia essa stata fatta, s' introdurrà una tenta scanalata, che si spingerà oltre la prima angustia, che suol essere all'
internodio di sotto, e strisciando lungo la scanalatura della tenta un gammautte, che vi appoggi col dorso, si taglieranno integumenti, e guaina sin oltre quell' internodio, e qualche volta nel prosondo vi si scorge una materia crassa, che era la cagione congiunta del male. Se quella materia qui non si trova, nè gli accidenti diminuiscono, si seguiterà a spingere

Del panereca cio della quarta spes zie:

Modo di taa gliare la guaina de' tendini flessori delle dita lungo il diato

" spingere oltre la tenta, e a tagliare, sino " che appaja la sede del morbo; e se si dovesse s, tagliare fin sopra la metà, o sino al princi-, pio della prima falange, il taglio dovrebbefi , poi continuare per qualche linea fin sopra la " mano stessa, ove la guaina molle, rallentata, e tenue, potrà meno cagionare strangolamento. ., 154. Fatta questa dilatazione (153), si ta-, glierà quella sostanza sungosa (152), che al-🔐 cune volte si trova per tutta la lunghèzza del tendine. Che se non si fosse ancor trovato ,, il fonte del morbo, si continuerà a spingere ,, la tenta fotto la guaina lungo la mano stessa. " e si dovrà sorse penetrare sino all'avan-brac-, cio; conciossiachè in questi casi suol essere suppurata quella pinguedine, che è tra il muscolo pronator quadrato, ed i flessori delle " dita. Si recide adunque in fimil caso per tutta la lunghezza della mano, e giunti al legamento anulare interno del carpo, vi fi " farà passare sotto la tenta, facendo piegare , la mano, perchè le parti meno tese, meno , anche resistano, e sentita col dito la punta ", della tenta, che passò già oltre il ligamento, , ivi si dovrà tagliare, ed aprire, spingendo la tenta appoco appoco semprepiù in avanti, ficche fi possano allargare, e spartire con leggierezza que' tendini, e scoprire l'ascesso, ,, che sarà quivi sotto, il quale alcune volte è assai grande. Perchè il tumore, e la tensione delle parti qualche volta non cedono, .. non sempre è possibile di far penetrare la tenta sotto quel ligamento; allora il Cerusico, ,, conoscendo, che in quel luogo dell'avan-" braccio vi debb' essere ascesso, taglierà tra , il margine interno del radio, e l'esterno de'

braccio.

palma.

, muscoli i soli integumenti universali, poi col 22 dito indice cercherà l'ascesso; conciossiache,

, ope-

operando altrimenti, potrebbe esservi pericolo di ossendere i muscoli, se prima non si sosseno ben distinti, e separati: trovato l'ascesso, si dovrà recidere la tunica cellulosa, che sacesse argine, e subito vedrassi la marcia a uscire. Ciò fatto, se si è potuto passare colla tenta sotto il ligamento anulare, vi dovrà anche passare quel sondo, e sar colare la materia, che quivi sotto si potrebbe raccorre; e ancorchè non si avesse prima potuto passare, colla tenta sotto quel ligamento, aperto poi, ed evacuato l'ascesso, le parti cedono maggiormente, sicchè non sia allora difficile di passare ugualmente il setone.

" 155. Non sempre però con queste dilata-", zioni (153., 154.) gli accidenti cedono. , anzi alcune volte diventano sempre più mi-,, naccianti; ed allora l'ultimo rimedio è di ,, tagliare il *tendine* del dito malato vicino alla , parte muscolosa, anzi la tensione dipendendo , in parte dallo Arangolamento, che fa alle , parti soggette il ligamento anulare, perchè , non può cedere, nè rilassarsi, egli è anche , talvolta necessario di reciderlo, massimamente , che sarebbe poi ugualmente corroso dalla ,, materia, che vi si sa sotto. In caso della ,, recisione di questo ligamento, si dee tenere , la mano sempre piegata, non solamente per-🛼 chè se ne faccia più facilmente la riunione, , ma anco perchè i tendini non fi spartano. ,, ne si allarghino.

caduta emorragia pel taglio di qualche vaso, si dovrà preserire l'allacciatura; che le compr. ssioni e gli astringenti in questo caso di grave instammazione potrebbero sommamente nuocere. Se vi sono, o se si faranno ascessi in altre parti.

In che caso debbansi recidere il tendine, e il ligamento anulare.

۲.

lungo l'avan-braccio, o lungo il braccio, tosto fatta la suppurazione, si dovranno aprire; le piaghe si medicheranno co' digestivi, e si userà la fasciatura a 18. capi (a). Quando lungo l' avan-braccio, ed il braccio vi fosse, come suol succedere, il flemmone suffocativo, si faranno le scarificazioni, e si useranno que' rimedi, che abbiamo proposti trattando di quel flemmone (88. e seg.), altrimenti vi potrebbe accadere la cancrena, onde si dovesse fare l'amputazione dell' articolo, se pur sosse possibile; che sovente quella fi stende fino alla spalla. Quando fi è dovuto tagliare il tendine vicino al suo corpo muscoloso (155), soglionsi fare spandimenti di materia lungo, e sotto quel tendine, i quali difficilmente si espurgano, se quello non si taglia anche dall' altra parte, per separarlo affatto (b).

Per

<sup>(</sup>a) Vedan nel Tratt. delle fratture il cap. delle fratsure complicate, nel quale questa fasciatura è descritta.

<sup>(</sup>b) Quasi tutti gli Scrittori parlano comunemente soltanto de' panerecci, che accadono alle dita della mano, quasi che questa malattia mai non accadessa alle dita del piede, anzi l'Astrauc (Traité des tumeurs, & des ulceres tom. I. pag. 161.) asserisce positivamente, che mai non viene il panereccio alle dita del piede. Ma l'Autore del libro della cura delle malattie citato qual testo di lingua dai Compilatori del Vocabolario della Crusca così lo definisce: El panereccio è una postema, che nasce aelle dita delle mani, e delli piedi alle radici dell' ugae; e che questa postema possa nascere, ed in realta nasca anche alle dita de' piedi, l'esperienza giornaliera lo dimostra, massime ne' villani, che camminano scalzi, addivenendo assai sovente, che o da spine, o da sessitano loro punte le dita de' piedi, o altrimenti ossessa da altre cause esterne, od interne, dalle quali siano poi prodotti i panerecci dell' una, o dell' altra specie. La struttura della parte essendo la stessa, che nelle dita della mano, la cura ne sarà anche a medesima.

Per finire l'ordine dei tumori flemmonosi, vi resterebbe ancora da trattare dell'ottalmia, dell'orzajuolo, dell'egilope, e della paralide; ma dei tre primi si parlerà nel Trattato delle malattie degli occhi, e dell'ultimo in questo stesso Trattato coll'occasione, che dovremo ragionare dell'spulide (526).

### **DEI TUMORI CALDI**

ORDINE II.,

Che tratta dei tumori erifipelatofi.

157. A Bhinmo detto (65), che i sumori flammonosi hanno la loro sede nel tessuto cellulare fortoeutance, o delle altre parti ancor più profonde: gli erisipelatosi all' opposto sono tumori infiammati superficiali, ne' quali il sangue è con forza, e in copia eccessiva spinto, e raccolto ne' vafi fanguigni cutanei, e più o meno anche travafato nella teffitura cellulare della cute medefima: in quegli il color rosso della parte infiammata è costante, nè svanisce colla pressiome del dico (67., 70.); in questi quel colore è meno perfistente, da che la parte si fa quasi bianca, guando fi comprime. Molti sono i generi de' tumeri erisipelatosi, e soglionsi distinguere in esterni, ed interni. Noi parleremo solamente degli esterni, che sono i soli, che appartengono alla Chiturgia, tali sono la risipola, il carboncello, le afue, le buganze, P intertrigine, l'erpete, la rogna, il lattime, e tutti gli altri tumori infiammatori della cute.

Natura, divisione, e nomenclatura de' rumori erifipta latosi.

# Della Risipola.

. S. I.

Definiziope, e cause congiunte della risipola.

158. La Rifipola detta da' Greci, e dai Latini erysipelas (a) è un tumore instammatorio. superficiale, cutaneo, di un color rosso più o meno vivo, qualche volta dilavato, e giallognolo, che colla pressione del dito svanisce, e quella tolta, subitamente ritorna. Per lo più occupa un'ampia superfizie, e produce un dolore urente, pruriginoso. Essa è ne' casi cerufici (157) la infiammazione propria della cute, quando alcuna cagione interna, o esterna ha spinto con forza il sangue in que' vasi pallidi, de' quali abbiamo parlato, trattando de' tumori infiammati in generale (57). La copia di questi vasi nella tessitura della cute debb' essere grandissima, dappoiche essa per le fregagioni, pel calore, pei violenti muovimenti, e per le passioni dell'animo diventa così facilmente rossa, e s' infiamma. Che anche in questo caso il sangue possa essere alcuna volta sparso nella cellulosa (157), ce lo dimostrano le macehie. e strisce irregolari, quasi suffusioni, che in tali sumori sovente si osservano, le vescichette, che vi si producono, la desquamazione, che ne segue della cuticola, e la pronta trasmigrazione della malattia da una parte all'altra quantunque lontana; nè la cute è altra cosa, fuorchè una denía sostanza cellulosa.

159. La

<sup>(</sup>a) L'etimologia del voçabolo eryfipelas viene fecondo GALENO da erutros roflo, e dall'avverbio perlas quafi, come fe fi diceffe tumore quafi roflo, o tendente al roflo, perchè veramente il colore di quefio tumore è piùttofto fimile a quello delle rose; quindi alcuni gli hanno dato il nome di rose.

159. La copia del fiero, con cui sono mescolati i globi rossi, è la cagione del color rosso dilavato, o giallognolo della risipola (158): quanto perde di profondità, tanto acquista di larghezza, facendosi solamente in quel genere di vasi (158) il raccoglimento del sangue, ed avendo negli altri maggiori facilissima la strada, nè essendo assai denso, perchè sì facilmente vi fi possa arrestare, onde forse anco quella facilità, che ha l'umore di risolversi in una parte, per nuovamente comparire in un'altra: la infiammazione erisipelatosa sulle membrane de' visceri, e sul periostio si sa egualmente ne'loro sottilissimi vasi superfiziali, mentrecche il flemmone suole più o meno occupare la soda massa degli steffi visceri. Se per cagione interna accade la risipola, sempre precede la febbre. perchè des precedere quel maggior muovimento, per cui i globi rossi del sangue passino in maggior copia in que'vafi (158), e perchè la materia della risipola è sempre per sua natura irritante, effendovi più foggetti quelli, che hanno un fangue sottile, molto divisibile, bi-

lioso, e zulfureo.

160. La risipola si suole distinguere in benigna, e in maligna: quella è la descritta nella definizione (158), i cui sintomi sono assai miti, e limitati, essendo prodotta da un umore men cattivo, e terminando quasi sempre colla riso-

luzione.

161. La maligna (160), che gli Antichi chiamarono fuoco sacro, occupa le stesse parti (158, 159); ma sovente è accompagnata da pustule icorose, il calore n'è maggiore, il dolore acre urente, il colore molto più giallo, e talvolta sosco, la perturbazione interna, e la sebbre sono anche molto maggiori; imperciocchè questa spezie di risipola sempre dipende dalla diatese more

Spiegaziane de' fintomi della; rispola.

Suz distinzione in Benigna,

E in mali-

Deferizione di quell' ultima . morbosa di un sangue sulfureo, bilioso, e putresaciente; quindi precedono, o seguono nauseo, vigilie, ansietà, dolore di capo, e sovente il delirio. L'ardore alcune volte diviene eccessivo, che pare, che abbruci, ond'è venuto il nome di fuoco sacra: le pustule sono maggiori, o minori, più o' meno sparse, alcune volte sono tanto piccole, che alcuni la chiamano rispete migliare; ma sovente crescono, si accumulano, si serepolano, e si esulcerano, e n'esce un umore setente, tenue, giallognolo, verdeggiante, od oscuro, che insamma, ed esceria le parti, sulle quali cade.

Perchè fia anche chiamata ferpiggine. 162. Questa rispola (161) mon solamente serpeggia (onde alcuni la chiamano surpentina, o serpiggine) sopra la parte, ove dapprincipio è comparsa; ma più facilmente retrocede, e ritorna in parti lontane da quelle, ove prima si vide. Alcune volte si stende in una lunga striscia attraverso, o lungo il tronco, il collo, o altro membro, che gli Amichi chiamarono zona, o soster, che vnol dire vincolo, o cintura.

Zona, o Softer.

Esame del fangue estatto nella rispola maligna.

Cofa india chi detto fangue

163. Il sangue in questa malattia (161., 162), secondo le osservazioni del celebre GORTER (a), non si coagula, estratto ch'egli è, come nolle altre imstammazioni (70), ma rimane rubicondo, e totalmente sluido, il che des dimostrare, che la materia di questa rispola sia veramente tenue, acre, irritante, saponacea, e putrida, per cui la conesezione del sangue, la quale dovrebbe altrimenti accadere pel suo maggior muovimento, sia impedita. In satti se sulla rispola benigna (160) si applicano rimosi pingui,

<sup>(</sup>a) Rapportate in più luoghi del suo Compendio

pingui, oleosi, putrefacienti, essa diventa maligna: l'icore, che sgorga dalle ossa cariose, se s' infeltra negl' integumenti comuni, colla sua acrimonia irritante vi produce una risipola: lo stesso essetto vediamo prodotto dall'acre materia del cancro: negl' idropici, negli scorbusici essa è sempre l'effetto d'una dissoluzione putrida degli umori, che suole terminare in can-

crena ( 235. ).

164. La risipola benigna (160) suol essere di peco, a nellun pericolo, e facilmente si risolve: l'altra può essere eritica, o fintomatica, ed è sempre più o meno pericolosa, perchè sempre dipende, come dicemmo (161., 162., e 163.), da una pessima cagione interna; perlaqualcosa si dee sempre temere, se mai affatto retrocedesse, o si trasportasse ad una parte più nobile, e di maggior senso: può anche per la qualità urente, e putresaciente degli umori sacilmente passare in cancrena, tanto più se la parte, che occupa, era prima edematosa, come si è detto (163) accadere sovente negli idropici, e negli scorbutici, oppure lascia un ulcere grondante una sanie, che difficilissimamente si può mutare in buona, e schietta marcia: alcuna volta quello spandimento si secca quati come un'escara, e l'affezione erisipelatosa allora fi spande ai lati, si elevano vescichette, quindi si screpolano, e formansi quinci, e quindi nicerette di quella forta.

165. L'una e l'altra risipole è stata da alcuni divisa in flemmonosa, edematosa, e scirrosa: chiamano rifipola flemmonosa quella, nella quale l'umore, che fa la cagione congiunta del tumore, è in tanta densità, e copia, che il colore n'è eneno dilavato, e la fua maffa maggiore con qualche renitenza, e pulsazione. La edematofa Edematofa ? è quella, in cui per l'abbondanza dell'umore

Pronostico di amendue le spezie di rifipola.

Divisione delle due risipole in Flemmono-

fieroso il colore è ancor più dilavato, il tumore cede maggiormente al tatto, e si scorge un maggiore inzuppamento linfatico.

E scirrosa.

166. La scirrosa non può esservi, se pure non s'intenda quella, che può sopravvenire ad uno scirro, la quale nemmeno può dirsi scirrosa: e veramente, s'ella è benigna, sarà prodotta da un accrescimento d'azioni, che avrà spinto i globi rossi in quella quantità, ed in que' vasi, che abbiamo accennato (158), ed in questo caso essa sarà come accidente allo scirro, ma pura, e schietta risipola. S'ella è maligna, già fi capisce come una materia tanto tenue, irritante, e putrefaciente ( 161., 162., e 163.) non possa divenire talmente compatta, e inerte al muovimento, per raccogliersi, fissarsi, e inspessars, e così formare una rispola, la quale si possa dire scirrosa, anzi coll'apparizione della risipola suole lo scirro cangiarsi in cancro.

Cura interna della rifipoia benigna.

167. La risipola benigna dee curarsi, correggendo prima, o togliendo quella cagione interna, o esterna, che ha spinto in quella quantità ne' sottilissimi vasi cutanei, e nello stesso tessuto cellulare della cute i globi rossi del sangue (158). Giova la flebotomia, la quale si farà una o più volte, secondo le forze, l'età, e il temperamento del malato, e secondo la quantità, il fervore, e la sede della malattia. gli fi raccomanda la quiete dell'animo, e del corpo, gli fi proccura un ambiente temperato. e gli si prescrive una dieta umettante, e rinfrescante. Beverà copiosamente decozione di gramigna, di cicoria selvatica, di lattuca, di endivia, di borraggine, d'orzo, o d'avena, acqua col nitro, siero di latte alterato con alcune di quelle piante: fi terrà il ventre libero con clisteri emollienti, e attemperanti, e con qualz

qualche minerativo, massime se si sospettasse

qualche impurità nelle prime strade.

168. Se la risipola è sulla faccia, basterà tenerla coperta con pezzi di tela fina asciutti. solamente un po' riscaldati al suoco. Può anco guarire con que' foli rimedi interni (167) la risipola nelle altre parti, purchè siano ben cu-Aodite dall'aria fredda; ma, se essa fosse flemmonosa (165), si potrebbono usare le fomentazioni con acqua, o decozione de'fiori di sambuco, con acqua di sperma di rane, o coll'acqua sem+ plice mediocremente calda, a cui siasi aggiunta poca quantità di spirito di vino canforato.

169. Se la risipola benigna fosse edematosa Dell'edemas (165), le fomentazioni dovrebbero farsi con acqua leggiere di calce, a cui, se sarà necessaria una maggior forza, fi aggiungeranno per ciascuna libbra due once di spirito di vino, alcune dramme di sale ammoniaco, o di salegemma, o la seguente mistura, che è tanto lodata per questa spezie di risipola dallo SCULTETO (a).

Rl. Lixiv. mediocr. e cinerib. sarmentor. vit. lib. j., nitr. drach. s., sal. comm. drach. j., acet. vini. optimi unc. j.,

misce.

Di questi liquidi tiepidi si possono inzuppare compresse a più doppi, che si cangieranno varie volte al giorno.

170. Quan-

(a) Descritta nel suo Armamentarium Chirurgicum observ. 98. pag. mihi 312. Lo Sculteto dice, che la composizione di questa mistura è stata comunicata allo Spicello da un Chirurgo Tedesco, come un grandissimo secreto.

Cura ester-

Della flemmonosa ,

tofe .

Cura interna della rifipala maligna.

170. Quando la risipola sosse maligna (161). critica, o sintomanica (164), la cavata di fangue non si sarà se non per l'urgenza de sintomi infiammatorj, che potrebbono effere insorti pel forte continuo irritamento prodotto da quella sì acre materia (161., 162., e 163.). Si fomsmnistreranno rimedi interni attemperanti, che possano correggere quell'acrimonia biliosa. come il siero di latte semplicemente thiarificato con qualche sugo acido, o alteraro colla bollitura di foglie di lattuga, di borrana, di bugiossa, di accessa e simili, delle quali piante si potrebbono anco prendere i fushi o semplici, o mescolati col siero, o con brodo magro. ed infulfo; si beveranno lungo la giornata Prangiace, o limonate tenui, allungate; si terrà pure il ventre libero con tristeri emotlienti, e rinfrescanti, e la sera si prescriveranno emulsioni tatte co' quastro semi freddi, sal prunella, e sciroppo di viole mammole, e in questi cast conviene maggiormente, il proccurare una leggiere evacuazione con manna sciolta nel siero di tane, aggiuntavi qualche oncia di sugo di limone. I purganti irritanti si deono assolutamente evitare. Qualche volta la natura indica doversi muovere il sudore, e allora giova bevere alcuna dose di acqua distillata di fiori di fambuco, o se ne prescriva il rob alla dose di sma dramma semplice, o sciolto nel suco di fumaria, di accresa, di dente di lione, di cicoria, o simili. La dieta sarà tenuissima, usando brodi leggieri senza grasso, e senza sale, minestre di vegetabili, come di lattuca, o portulaca, di fatina d'avena ec.

Cura efter-

171. Alla parte bisogna temperare l'irritamento e l'ardore. Se le pustule, e le vescichette s'innalzano, e si ammucchiano (161), conviene aprir le maggiori, per dar esito a quell'

quell' icore, il quale non solamente nuoce per la irritazione, che ivi produce, ma perchè potrebbe anche retrocedere. Per quella indicazione servono i sughi di lattuga., di porcellana, di piantaggine, di ombilico di venere ec., applicandovi compresse bagnate di questi sughi po' poco riscaldati; alcuni ne fanno cataplusmi con mollica di pane secco. ABZIO (a) loda moltissimo il suco acerbo delle uve immature mescolato con quello di portulache verdi, per far un cataplasma con farina d'orzo finissima ... e vuole, che si applichi freddo, anzi si tolga, e fi rinfreschi, tosto che pel calore della parte fiafi riscaldato. Ma però nel sommo surore delle vescichette, e della turgidezza del tumore meglio convengono i fomenti tiepidi, come l'una, o l'altra delle feguenti formole:

R. Flor. melilot., sambuc. a manip. j., papaver. hortens., lentis palustr., plantag., nymph. a manip. ij., coque in aq. commun. s. q. colatur. unc. exi adde acet. rofat. unc. ij. applicetur tepide.

Oppure

P. Flor. sambuc., hyosciam, melisot., papaver. rhoead. a pugill. j. aq. commun. lib. 101 coque vase clauso; colature adde acet. sambucin., rosac. a unc. ij.

Il fervore, ed il calore alcune volte sono tali, che si videro in poche ore divenire secche, ed arefatte le molli soglie cotte di latuga, e di ninfea, che vi si erano applicate.

172. Nel sommo grado della risspola maligna critica, o sintomatica suole alcuna volta

Cura esterna della risipola suffoçativa

<sup>(</sup>a) Tetrabibl. IV. fermon. 2. cap. 5.

accadere, che la parte gonfi enormemente. minacci soffocazione, e cancrena: in fimile caso si debbono fare alcune scarificazioni non troppo profonde, per le quali non folamente fi toglie il troppo stiramento, e quasi strangolamento, ma anche si apre una maggiore strada agli umori, per cui si evacuino. Nello stesso tempo si deono continuare quelle fomensazioni (171), finche dura il fervore della febbre. l'urente calore alla parte, e finchè l'umore con copia, e con impeto continua a portarvisi; conciossiachè, finchè durano que' fintomi, evvi sempre pericolo di retracessione, o che infine la parte si cancreni. I rimedi topici veramente astringenti, ed efficacemente repercussivi sono in quel tempo pericolofissimi; perchè con essi o si sossoca la parte, fissandovi la materia, o se ne impedisce la crist, sicche si faccia internamente maggiore tumulto .

Suoi fintomi minaccianti.

173. E se questo accade (172) o per l'eccessiva soprabbondanza, e veemenza dell'umore, o per qualche errore commesso, allora la lingua diviene secca, gialla, nera, adusta, ed aspra con una sete intollerabile, il malato sente un grandissimo calore tanto più di cattivo indizio, quanto più interno lo sente, parendogli fredde le parti esterne (72), la respirazione diviene faticosa con un certo anelito inquietissimo. e la febbre acutissima, l'orina è tenue, rossigna, e gialleggiante, oppure (ciò che è ancor peggio ) la pura, e schietta bevanda si piscia, perchè i rimedi non hanno potuto mescolarsi col sangue, pulsano, e si convellono gl'ipocondri, i giogoli, le tempia, ed altre parti, la cute è arida, il sudore è tenue, e sparso a gocciolette, il malato si lagna con lunghi, e stentati gemiti ec. Vi accenno questi gravi minaccianti sintomi, perchè non ne siate sorpresi, quando li vediate

accadere ad una rifipola, che dal volgo fi cre-

de una malattia leggiere.

174. Quando coll'uso de'rimedi interni, che abbiamo sopraccennati (170), l'acte umore sia stato attemperato, e corretto, onde il tumore della parte diminuisca, e quivi l'impeto di quell' umore fia acquetato, cominciandofi già a vedere squame furfuracee di cuticola, le quali si separano, lasciando intera la cute, allora si faranno bagni d'acqua di piantaggine, di sperma di rane, di rose, nelle quali si abbia sciolto po' poco di alume, o di zuccaro di saturno, o alcune gocce di aceto litargirizzato, del rosato, e simili; alcuni fi servono anco di una leggierissima dissoluzione di vetriuolo nell'acqua di rose, o di qualche goccia di liquor di saturno nella stessa acqua, applicandone prima fulla lingua, per sentire se non sia troppo forte, ed astringente. 175. Se coll'uso di questi rimedi (174) le pustole, e le escotiazioni non si essiccano, è segno, che vi è ancora parte di quel fermento nel sangue, il quale si dee continuamente combattere; e se vi sossero segni di affezione scorbutica, si deono preserivere gli antiscorbutici più efficaci, come i sughi, le macerazioni, o i destillati di nasturzio acquatico, di beccabone ga, di coclearia, di trifoglio fibrino, di scorza d'aranci, e fimili, come meglio insegneremo nel Trattato delle ulcere. Infine quantunque que rimedj esterni ( 171., e 174.) siano tali, che possano attemperare, e correggere" l'umore che viene alla parte, onde meno irriti, e meno esulceri, se però non se ne toglie il sonte, sovente il Cerusico non meno, che il malato sono infastiditi dalla pertinacia di queste ulcerette.

176. Esausto quel fonte (175), queste facilimente si seccano o da se stesse, o con alcune BERTRANDI TUM. TOM. I. G.

Quande debbanfi ufare i fore rifolventi, quali.

Come fi conosca, che
vuossi continuare l'
uso de' rimodi interni, e di
quali.

Quando convengano le polveri efficcanti.

polveri intrassanti, che vi s'inspergano, come sarebbe la seguente:

P. Cret. alb. drach. fs., fiat pulvis.

Gli aleosi, e pinguedinosi sono perniciosissimi, onde nemmeno possiamo far uso di alcun olio, o grasso per fare unguento con quelle polveri.

### Del Carboncello.

# S. H.

Definizione ne, etimologia, e deferizione del carbonsello

- 97 B St 103

177. Il carboncello detto da' Greci anerace [a] è un tumore arido e duro con gravissima infiammazione erisipelatosa, sovente mista colla flemmonosa, di un color rosso, sosco, o livido con istrisce giallognole, e tutto lucente, poco elevato,, e fermamente fisso alle parti soggette, accompagnato da acerbissimo dolore, come se la parte fosse abbruciata da un carbone acceso, onde gli è stato dato quel nome: esso è per lo più cancrenato con vescichette nere, o cinericce, oppure presenta una vera escara cancrenosa. Il malato suole avere un ardentissima febbre, vigilie, nausee, vomiti, alito fetente, inquietudine, difficoltà di respiro, lingua gialla, o nereggiante, voce rauca, dolori di testa, vertigini, tremore, palpitazioni di cuore, fincopi, sudore abbondante, e freddo, secce biliose, orine sottili, e grude.

Distinzione de' carbonselli in

178. Questi fintomi sono in maggiore, o minor numero, ed intensità secondo il surore del carboncelto, non essendo tutt' i carboncelli

di

<sup>(</sup>a) La parola Greca antrax vuol dire la brace, il carbone acceso.

di eguale veemenza. Perlaqualcosa alcuni gli hanno distinti in benigni, maligni, e pestilengiali. Chiamano benigni quelli, che hanno in sommo grado i fintomi del furoncolo (131., e 133); e terminano screpolandosi con qualche fessura cancrenosa nel inezzo: il maligno è quello, che abbiamo descritto (177): il pestilenziale quello; che accade in tempo di peste.

179. Tutt'i fintomi del carboncello (177) procedono da un fangue acre, che diventa putrefaciente, il quale ifrita, e produce una somma tensione suffocativa, che quali sempre fa la cancrena; quindi si possono anco comprendere tutti gli altri sì dello stesso tumore, che gli universali, quando massime si consideri, che quell'umore acre finalmente produce una dissoluzione putrida della massa generale, per la quale per lo più i malati muojono.

180. Quanto dunque più acre, e putrefa- Pronostico I ciente è la massa degli umori (179), tanto più è pericoloso il carboncello, e maggiormente s' esso è in parte di struttura delicata e di senso squisito, il tumore profondo, ed ampio coi maggiori segni d'irritamento, e di suffocazione, i quali postono anche estere intensistimi per la fola ragione delle parti affette, senzachè corrifpondano con eguale intensità i sintomi univerfali. In occasione di peste il DI MERBROECE osservò (a), che i carboncelli erano più pericolosi dei buboni, i quali avvenissero agli emuntorj (91), e che erano tanto più pericolofi, quanto più tardi apparissero, o gli uni agli altri fi succedessero. Più facilmente, e più prestamente si curavano que' carboncelli, che in due o tre giorni erano circoscritti, e terminati con

Maligni E peftilene tiali .

Spiegazio. ne de'finto= mi del *car* bonsello.

un cerchio rosso, ed erano assolutamente mortali quelli, che si estendevano con istrisce nericce, e cancrenose, come anco quelli, che nel principio fi fermavano, poi sparivano, indi

ripullulavano.

181. L'eccessivo calore, gli alimenti acri, putrefacienti, la bile fervida sono le principali cagioni antecedenti del carbonoello. Accadono per lo più ai villani nel fervore dell' ardentifsima state, massume se mangiano pepi lunghi, aglio, cipolle, e fimili altri alimenti, e abbiamo molti esempi di carboncelli accaduti a molte persone in uno stesso tempo, e luogo, per aver mangiata carne di animali infetti, o morti di malattia putrida, e veramente tutti gli alimenti putridi hanno una veementiffima forza settica, e velenosa (a).

182. I

<sup>(</sup>a) I carboncelli sono frequenti nelle campagne, non Solamente quando si mangia la carne di animali infetti, o morti di malattia putrida, ma anche pel so-lo scorticarne i cadaveri. Quindi ne sono sovente attaccati i Beccaj, e ancor più i Maniscalchi, quando introducono le mani nell'intestino retto, o nella bocca delle bestie ammalate, o pel sangue, che loro spruzzi addosso nel salassarle, o nel loro sare qualche altra operazione. Una donna ne fu sorpresa alla fronte, perchè le faltò in quella parte una goccia di sangue, mentre si scorticava un cadavere infetto. Noi vidimo morire in 24. ore un Maniscalco d'un carboncello venutogli sotto l'ascella destra, per aver assistito all'apertura di un cavallo morto della squinanzia cancrenosa. Le mosche stesse, e i tavani, che vanno a succhiare tali cadaveri, se mordono poi poco dopo gli uomini, loro possono comunicare il veleno, come è stato da noi osservato in due contadini, che morirono di carboncelli alla faccia, per essere stati morsicati dai tavani in una putrida epizoozia, che nel 1789, attaccò nel Faussigny principalmente i muli.

182. I rimedi interni debbono essere alesse. Cura interfarmaci, ed antisettici. Poco o nulla giova la cavata di fangue, quantunque i fintomi della infiammazione siano alla parte fortissimi. Si sono veduti carboncelli retrocedere, per avere più d'una volta cavato sangue. Giova piuttosto il promuovere co' bezoardici un leggiero sudore.

183. Se il carboncello è circoscritto, e terà Cura efferminato in un certo spazio, se ne dee scarificare. na. la parte, ov'evvi segno di cancrena, poi lavarla con ossicrato, con acqua di calce, o con acqua, e spirito di vino insieme mescolati, sinocché il sangue cessi di colare. Ciò satto, si dee cauterizzare. Alcuni per quest' effetto propongono l'empiastro magnetico arsenicale (109), altri il butiro di antimonio, gli spiriti ardenti ec. Ma dee certamente preferirsi il caustico attuale, che agisce più prestamente in quella quantità, che si sima necessaria, e niente può trasmettere al sangue: con esso l'escare cancrenose de carboncelli, che sono setide, mucose, e molli, meglio si essiccano, e si terminano, e perchè sono fatte da una sostanza morta, non danno segno di senso, finche l'ustione non è penetrata alla perte viva. Perlaqualcosa insino a tento che il malato, non dia segno di questo senso. e n'esca il puro, e fluido sangue, si dee continuare a bruciare più o meno profondamente. si applicherà poi l'unguento digestivo sopra le parte abbruciata, come farebbe quello, che abbiamo proposto pel bubone pestilenziale (109), oppure il seguente:

Bl. Butyr. recent, unc. jss., ung. basilic. drach, vj., theriac. drach. ij., cum vitello ovi misce, . fiat digestivum.

Se il carboncello fosse veramente pestilenziale, il DIEMERBROECK (a) loda molto quest'altro:

N. Scord. pulveras, drack. ij., vitellum unius ovi, terebinih. venes., mell., ung. Apostol. a unc. ss., misce.

Si applicheranno nel tempo stesso cataplasmi ammollicivi, i quali diminuiscano la somma tensone, che vi può essere alla parte: e perchè necessaria una pronta, ed abbondante suppurazione, se l'escara per la sua durezza, e prosondità tardasse a separarsi, le si saranno scarisicazioni, e i pezzi più mobili si separeranno.

Quando, come, e fin dove debbanii fare le fcarificaziofondità tardasse a separarsi, le si faranno scariscazioni, e i pezzi più mobili si separeranno.

184. Alcune volte i carboncelli, che sembravano terminati in un certo spazio, si vedono
dilatarsi impetuosamente, e spandersi; perlaqualgosa lo SCREIBERO nel suo Trattato della peste
(b) raccomanda, che le scaristicazioni si continuino qualche poco sin sopra la parte sana; il
che deesi assolutamente sare, quando la insiammazione molto si spande, ed è veramente susscariora; imperciocchè, se per tutta la sua
ampiezza quelle non si sanno in modo, che
penetrino almeno sino alla sostanza adiposa,
sacilmente ne avverrà la cancrepa, e lo ssacole
(132).

Medicazione da farsi dopo le scarificazioni. vengono poi quelle fomentazioni, che abbiamo accennate pel flemmone fuffocativo (90), oppure la seguente:

Rl. Sal. absynth. unc. ss., herb. scord., flor. sambuc., samamel a m. ij., aq.

<sup>(</sup>a) Loço citato.
(b) Intitolato: Observationes, & cogitata de pestilentia, que annis 1738., & 1739, in Ucrania grassata es. Berolini 1744. in 8.

aq. simplic. lib. 2. ss. coquantur, & colatura adde spirit. vin. camphorat. unc. vj.; theriac. unc. j.:

Si applicheranno compresse a più doppi inzuppate in questo bagno caldo, e si continuerà, sinchè sia tolto il pericolo della cancrena. Ma quando non più vi sia quello stringimento, che minacciava sussociave, si useranno cataplasmi ammolstivi, oppure quello delle farine risolventi satto colla decozione ammolsiente. Avvertasi, che non dobbiamo essere troppo solleciti a sar separare l'escare, insino a tanto che i loro margini, che sono contigui alla parte sana, o infiammata, se ne scorgano divisi per una linea bianca, la quale denota la separazione del sano dal corrotto: altrimenti vi sarebbe pericolo di sare stendere la cancrena più oltre, come in altro luogo dimostreremo (252., e seg.).

186. Quando l'escare siano cadute, alcune volte il sondo dell'ulcere, che vi rimane, è soudido, e mucoso, qualche volta anche con carne lussureggiante; debbesi allora astergere coll'inguento egiziaco, o col sosco del WURZIO, o con quello degli Apostoli, o aggiungendo al digestivo alume polverizzato, polvere di genziana, o di aristolochia, nè mai si useranno i corrosivi, nè i precipitati mercuriali, i quali possono facilmente risvegliare l'orgasmo della

parte.

187. Come ne' furoncoli violenti (135., 136.), egualmente ne' carboncelli, quantunque la infiammazione, che era mono estesa, sia ridotta a certi limiti, il centro però, e il fondo del aumore rimane duro co' margini durissimi. Perciò convengono allora i digestivi più forti, e gli empiastri gommosi, e mucilagginosi insieme messcolati, onde eccitare un' abbondante suppurasione.

Dopo caduze l'escare.

Ventriglio del carboncello qione, dopo la quale, come ne' furoncoli, alcune volte accade, che si separi un mucchio di sostanza cellulosa, o membranosa, che è quasi il nocciuolo del sumore, e rimanvi alcun pezzo d'integumenti per un maggiore, o minore spazio distaccato dalle parti soggette.

Non deefi tagliar la cute diftaccata dalle parti foggette.

188. Il LE-DRAN ci ha date due offervazioni, the sono la XIV., e la XV. del I. Tomo (a), dalle quali si vede, che non dobbiamo sì prestamente determinarci a tagliare, e separare, quanto vi è di cute sciolta dalle parti sottoposte, perchè ciò renderebbe la cura molto più lunga. La prima osservazione è di un carboncello, che si stendeva dalla nuca al mento, e per tutto il collo, e quindi dallo sterno all' omoplata. Essendosi separata un'escara della larghezza della palma della mano alla metà del collo, n'esci poi tutta la sostanza cellulosa, ficche restò scoperto tutto il muscolo platismamioideo sin dalle sue aderenze al mento, all' occipite, alle vertebre del collo, alla clavicola, e all'omoplata (b), n'esci anche tutta la so-

<sup>(</sup>a) Observations de Chirurgie, auxquelles on a joint plusieurs restexions en saveur des Etudians. Paris 1751. in 12. deux volumes.

<sup>(</sup>b) Le aderenze, che qui il le DRAN accenna dei muscolo platismamioideo alle vertebre del collo, e all'occipizio, fan vedere, che egli credeva, come noi pure siamo inclinati a credere, e come l'Anatomia dembra dimostrare, che i due muscoli platismamiodei, divenuti alla parte posteriore del collo aponeurotici, si congiungono il destro col sinistro, attaccandosi al ligamento cervical posteriore; che quest' aponeurosi continua ad allargarsi in su alla nuca per congiungersi con quella de' trapezi, e poscia, dopo aver coperto i muscoli occipitali, unirsi alla parte posteriore della cussia aponeurotica del cranio, nello stesso modo, che anteriormente gli stessi muscoli platismamioidei non finiscono al mento, ma si allargano aponeurotici sui masseri, e sulle parotidi, per andar ad unirsi colla medesima cussia agli archi zigomatici.

fanza adiposa, che trovasi tra i muscoli dalla mascella alla trachea, e alla base della lingua. e tra le ghiandole che sono in quelle parti, dimodoche si vedevano belli, e puliti tutt' i muscoli. Fu fatta un'incissone lungitudinale verso le vertebre a quegli integumenti così distaccati. perchè le marce potessero meglio colare, e colla fola applicazione di un esatto apparecchio il rimanente della cute si riunì colle parti soggette, e la cicatrice fu perfetta in due mesi e mezzo. L'altra offervazione è di un carboncello assai grande alla nuca, dalla cui apertura angusta esciva anche molta sostanza cellulosa; perlaqualcosa rimase distaccata dai muscoli nudi non poca quantità d'integumenti, i quali niente di manco hanno potuto contrarre nuova aderenza.


189. Quando i carboncelli minaccino di retrocedere, è necessario di opporvisi co' bezoaridici, co' sudorifici, e co' cordiali. Lo SCULTETO (a) racconta di un carboncello pestilente attorno l'ano, il quale retrocesso comparì nuovamente a quella parte coll'applicazione di un serro rovente. Potrebbono per la stessa ragione giovare gli epispatici, o piuttosto l'applicazione, e lo strappamento delle coppette, e tutti gli empiastri fortemente attraenti, come quelli, che abbiamo propossi pei buboni, e per le parotidi, che difficilmente suppurano (100., 101.).

Degli altri tumori erifipelatofi appartenenti alla Chirurgia fi parlerà ne' seguenti Trattati, come dell' erpete, della rogna, del lattime, e delle buganze in quello delle ulcere, delle afto in un capitolo delle malattie della bocca nel Trattato delle malattie degli occhi; dell' intertrigine in quello dell' arte ossetticia ec.

impedire la retrocessione del carboncello.

DE

Mezri per



# DE' TUMORI CALDI

### ORDINE III.,

Che contiene non poche osfervazioni intorno alcuni ascessi interni, ai quali la Chirurgia può giovare.

Motivi, che hanno indotto l'Autore a trattare di quefti ascessi.

100. L'Arlando de' sumori in generale, & fono rapportati i fegni, che indicano la terminazione di un cumore in ascesso, e quelli, che lo mostrano già fatto (17., 18.): ivi pure fonosi insegnati il tempo, e i modi di aprirlo, fatto, e conosciuto che siasi (25. ad 39.). Inoltre nell'esposizione di ciaschedun tumore inflammato in particolare fonosi dati più spezialmente i necessari precetti circa i mezzi da prefemifi per tale apertura ne' diversi casi ( 102., 109., 113., 114., 129., 135., 136., 146., al 156., e altrove), e dichiarati quelli, ne' quali quell'apertura deesi o fare prematuramente, o ritardare, come pure le attenzioni da aversi nel fatla. Ma que' segni, e que' precetti riguardano quasi unicamente gli ascessi, che si fanno nelle parti esterne, ne sono sufficienti per far conoscere quelli, che si fanno internamente, e ancos meno, perchè se ne faceia una cura metodica. Egli è raro, che tali ascessi si manisestino con sensibile mollezza, e sluttuazione; il Cerusico dee pinttofio raccogliere i segni razionati, pei quali possa fondatamente conchiudere, o ne della loro esistenza. Le parti, ove questi ascessi immi postono accadere, variano talmente:

di struttura, d'uso, e di prosondità, che, per curarli, tutti richieggono parricolari cautele. Questi sono i motivi, che ci hanno indotti a confiderargli in tanti paragrafi distinti, dopo avere però prima esposti i segni generali, e comuni a tutti.

. Dei segni generali indicanti la formazione degli ascessi interni.

# S I.

191. L'ascesso interno o è la terminazione di un tumore, che ha preceduto nella parte, o la materia purulenta ivi è stata deposta dalla massa interno conuniversale degli umori, senza che abbia preceduto alcuna malattia in quel luogo, dove fi può sospettare esservi un ascesso. Net primo caso, mentre perseveravano i segni pasognomonici di una frenitide, peripneumonia, pleuritide, o epa*ticide*, il malato sentiva il martellamento, e la spinta dell'umore, il dolore, il calore, la gravezza, e lo stiramento in un determinato. e preciso luogo, più che in un altro della parte. affetta con vari fintomi d'azione lesa, pervertita, o abolita, secondo l'uso, e-la struttura di essa parte, e secondo la quantità del morbo, che troppo lungo favebbe di minutamente descrivere. In tutto il tempo della malattia non è sucseduta alcuna evacuazione critica , anzi offa malattia durò affai con tutta la violenza, con cui era pervenuta allo flato. Le urine sono sempre state tenui, chiare, al più po' poco rostigne, senza deporte verun sedimento. Il sudore, quantunque talvolta copioso, e continuo, non su di nessus vantaggio. Quindi, dopor lunghe, e gravi inquietudini, e vigilie, il malato viene inaspettav gamente forprese da un rigore di seddo come

Segni della formazione dell' ascesso fecutivo a una malattia locale.



di una febbre intermittente, dopo il quale suci, cede un calore secco, stanchezza, nausea, vomito, e sovente un sudore, che gravemente olezza. Sono diminuiti o poco, o assai il calore, il dolore, e il martellamento nella parte, ma n'è cresciuta la gravezza: continua poi quel calore secco con un polso per lo più frequente, celere, e minuto. Ritornano quindi i rigori di freddo, i quali sogliono più frequentemente sorprendere verso la notte, ai quali poscia nuovamente succede più veemente quel calore secco, e questa è la febbre, che dicesi di suppurazione, perchè denota, che la presente infiammazione interna si termina per suppurazione. Che se dopo tali sintomi, le urine, o le dejezioni del ventre non compariscono purulente, si può con fondamento conchiudere, che la malattia locale sia terminata in ascesso.

Dell' ascesso interno satto per metastasi.

192. Quando allo incontrario questo si produce per una nuova, e subitanea suffione di umore in una data parte, o, come dicono, per metastasi (21), (il che suole principalmente accadere nelle malattie acute e maligne, biliose, putride, e principalmente nelle esantematiche), non essendo prima accaduta alcuna evacuazione eritica, il malato viene improvvisamente sorpreso da quella febbre di suppurazione (191) accompagnata da fintomi ancor maggiori di perturbazione grave, e minacciante, dopo la quale non è molto diminuita la gravezza del morbo ellenziale, finche la materia putrida siasi determinata ad alcuna parte, dove poi forse faransi sentire i segni dell'apostasi, od ascesso: io diceva, done forse faransi seneire; conciossiache alcune volte tali flussioni fansi in parti così proconde, tanto inerti, e di così poco senso, che, quantunque poi trovinsi ne cadaveri, non ce ne può rimanere vergogna di non averle cone sciute

ciute nel vivente: o se pure anche per una prosonda, ed oscura gravezza, e pulsazione, e per l'azione lesa di alcuna parte si poteva conghietturare, dove potesse essersi fatta l'apostasse, non era però possibile, che l'arte nostra vi giovasse.

193. Nè la materia della suppurazione ( siasi questa generata nella parte, o sia venuta d'altronde ) trovasi sempre raccolta in una grande cavità, cioè in un ascesso cavo; che alcune volte abbevera la cellulofità delle vifcere, come se fosse un edema purulento, o forma una crosta sulla superficie delle stesse viscere, come se fosse trasudata, il che frequentemente si offerva sulla pia-madre, sui polmoni, e sugl'intestini. Altre volte le metastasi fansi con tanta violenza, ed impeto sui polmoni, o sul cervello, che in breve tempo il malato muore soffocato, convulso, o apopletico, senza dar tempo, che la flussione siasi circoscritta in uno spazio limitato, acciocchè se ne potesse tentare l'evacuazione. Ma perchè io come Cerufico debbo trattare di quegli ascessi solamente, ai quali forse la Chirurgia possa giovare, gli accennerò gli uni dopo gli altri, rapportandone quelle circostanze, per le quali, come già ho detto (190), si possano talvolta come meglio, e più certamente conoscere, così anche per avventura curare, e guarire.

> Degli ascessa, che si fanno dentro la cavità del cranio.

## S. II.

194. Gli ascessi , che si fanno nella cavità del eranio, sogliono essere mortali, quantunque la marcia siasi aperta la via per le narici, o per

Cafi di ascessi interni ove la Chirurgia niente può giovare Per quali cagioni quefii ajcessi fiano quasi fempre mortali.

gli oreschi; che di rado ciò giova. Perciocchi tale per lo più è stata la gravezza della malattia, a cui sono seguiti gli ascessi come terminazione, che, quando si conoscono, o il malato è già vicino alla morte, o talo guastamento è stato fatto delle parti, ch' esso è irreparabile. Nella massima parte degli esempi, che abbiamo di ascessi interni del capo guariti, vediamo, che erano stati prodotti da serite, per le quali, e perchè fossero assai aperte, e dirette verso l' ascello, o perchè se ne avesse fatta la dilatazione col uapano, o colla leva, la materia aveva potuto evacuarsi. Ma se l'ascesso è stato prodotto per cagione interna, e conseguentemente nella integrità del cranio, o per un colpo esterioge, che non abbia aperra la via, benchè per la gravezza, pel dolore, e per la tensione, che sentonsi dentro la cavità, per la uscita d' icore o medefimamente di vera marcia dalle nairici, o dalle orecchie, o da amendue quelle parti, per l'affezione soporosa, che non di rado suol succedere, per la cecità, per la paralisa di alcun membro, e infine pei rigori di freddo preceduti si possa conghiesturare l'esistenza di un ascesso, difficilissimamente però si potrà avere certazza del preciso luogo, dove possa essere lo spargimento, perchè si possa con ragionevole fiducia tentare di dargli uscita colla operazione del trapano. Vedete nel Trattato delle ferite il capitolo delle ferite del capo, ove quest'argomento è ampiamente ttattato; imperciocche, per determinarsi ad aprire il cranio, le stesse considerazioni, sia il raccoglimento di acqua, di sangue, o di materia purulenta. Perchè non è permesso di giuocare della vita degli nomini, anco ne' casi dissicil ssimi, e oscurissimi le nostre determinazioni debbono essere appoggiate ad una serie sufficiente di conghietture; che

che non sempre la nostra audacia sarebbe così felice, come quella di un Maniscalco Adi cui narra il WEPFERO alla pag. 119. offervazione 46. delle affezioni del capo (a); sentitene la lepida storia, di cui si avrebbe orrore, se non fosse stata felice. « Un villano soffriva da lun-» go tempo una crudele cafalalgia prodotta-da » umore linfatico, come poi fu veduto, sparso » tra il cranio, e la dura-madre. Non potendo » più sopportare il male, pregò un Maniscalco. » che aveva costume di trapanare i giumenti a » quando pativano vertigini, che gli volesse n fare la stessa operazione (b). Gliela sece con 🤊 uno di que' trapani de' Legnajuoli sopra il sin-» cipite, senza quelle molte cerimonie, che p fogliono usare i Cerusici; ne usch gran copia » di siero, e l'ardito villano su interamente 🔊 guarito . . 🐪 Degli .

(a) Ecco il titolo di quest' Opera postuma di Gioanni Jacopo Wepfero pubblicata da due, suoi Prosipoti Bernardino, e Giorgio Michele Wepfero: Obfervationes medico-prastica de affestibus capitis internis. E externis. Schaffhusii 1727, in 4.

<sup>(</sup>b) I Maniscalchi sogliono trapanare i giumenti mella malattia da essi chiamata capostoro, o capogatto, che è una spezie di vertigine, o giramento di capo. Non si può negare, che qualche volta l'indovimino, evacuando pel soro satto al cranio la linsa sparsa tra esso, e la dura madre, oppure tra questa, e la pia, quando da tale travasamento linsatico dipende il male. Ma siccome, applicando per lo più il trapano in mezzo della fronte, non penetrano già nella cavità del cranio, ma nei seni frontali; quindi è, che quantunque vi sosse il travasamento, nol potrebbero evacuare E' vero, che, per sar credere agli sciocchi, (o credendolo essi stessi buonamente) di aver per netrato nella cavità del cranio, sogliono mettere un candelino acceso vicino al pertugio satto dal trapano, dicendo, che il dibattimento, che si osservantella siamma del candelino, proviene, dalla siamosità



Degli ascessi, che si fanno dentro la cavità del petto.

S. III.

Segni razionali delle diverse vomiche. 195. Gli ascessi interni del petto diconsi comunemente vomiche (a). E queste possono essersi fatte nella sostanza stessa del polmone, il quale non abbia contratta alcuna aderenza colla pleura, ed allora niente vi può la Chirurgia. Ma, quando il polmone precedentemente insammato si è poi satto aderente alla pleura, come succede in molti casi di peripneumonia, o quando l'ascesso si è fatto nella cellulosa della pleura tra questa, e le costole, i segni, che cel sanno conoscere, sono, che, avendo preceduto, come dicemmo, in quel luogo il dolore, il calore, il martellamento, ne segue poi fatta

del cervello, che si svapora, mentre procede dall' aria, che nel tempo dell'espirazione esce allora per que'seni aperti, ranto più, che sogliono in quel tempo tener chiuse le narici dell'animale. Anni somo girava per rutte le Città dell'Italia, e l'abbiam anche veduto in questa; un Ciarlarano, il quale pretendeva di poter conficcare nel cervello di un cavallo vivo un lungo, e grosso chiodo, senza che l'animale ne sossifise; ne saceva lo sperimento pubblico, facendo pagare a chi voleva esserne spettatore, ma il chiodo piantato obliquamente d'alto in basso nella fronte penetrava solamente nelle ampie cavità nasali, e perciò non saceva alcun male.

(a) Non a caso l'Autore dice, che gli escessi inzerni del petto diconsi comunemente vomiche, ma per sar
sentire, che propriamente la parola vomica fignisica
qualunque ascesso interno; in questo ampio senso sempre se ne serve Celso, come si ricava dal cap. 27.
n. 4. del lib. 3., e da molti altri luoghi. Vedremo
qui appresso, che lo stesso Bertrandi da il nome
si vomica agli ascessi del mesenterio (212).

fatta la suppurazione, un certo senso di gravezza; non di rado la cute al luogo corrispondente alla vomica diventa po' poco edematosa, o enfisematica. Ad un uomo, il quale dopo una grave peripneumonia, ebbe una vomica, che occupava tutta la faccia anteriore del polmone, gonfiò d'un enorme edema tutto quel lato del petto, la spalla, ed il braccio. Alcune volte su qualche parte della gonfiezza del petto comparisce una macchia rossa erisipelatosa (a), la quale suole indicare il centro medesimo della vomica. Il malato ha la respirazione difficile. ed affannata, nè può giacere su certe positure, verso le quali sia mossa la materia secondo il sito, ch' essa occupa, e la inclinazione, che le si può dare. Nella vomica del polmone la tosse suol essere frequente, molesta, e purulenta, non così in quella della pleura, nella quale la tosse è piuttosto secca, e rara, eccettochè l'ascesso non venga col tempo a comunicare col polmone.

196. Il FOUBERT nel primo Tomo dell' Accademia di Chirurgia narra di un ascesso del petto sattosi dopo una peripneumonia, il quale, quando il malato tossiva, presentava un tumore grosso come un uovo di gallina tra la carcilagine xisoidea, e il margine cartilaginoso dell' ultima vera costola, e delle due seguenti salse. Perchè, applicandovi sopra la mano, il tumore rientrava, alcuni Pratici (dice il FOUBERT (b))

Offervazione ne del Fou-BERT d'una vomica fingolare.

(b) Pag. 717. di detto primo Tomo dell' Accademia di Chirurgia, edizione in 4.

BERTRANDI TUM, TOM. I. H



<sup>(</sup>a) La gonfiezza edematosa di alcuna parte del petto, e quella macchia rossa, qui addotte quai segni
dell' ascesso interno del petto, mostrano, che il nostro
Autore già li conosceva, primacchè il signor VaLENTIN pubblicasse le sue Recherches tritiques sur la
Chirurgie moderne, Paris 1772. in 12., dove dà questi
segni per nuòvi, come se da niuno sossero stati ofservati

Spiegazione tratta dall' Anatomia di quefto cafo ftraordinazio.

Riflossione fulle con-

oredettero, che potesse essere un' ernia del venzicolo: egli però, che ne aveva sempre sentita la fluttuazione, lo giudicava piuttosto l'appendice di un ascesso. In fatti all'apertura del soggetto, che in fine morì, vel trovò continuato sino nella sostanza del polmone. Il diaframma suol avere un'appendice carnosa, con cui si connette alla cartilagine xifoidea; da questa fino alle proffime costole manca per lo più il piano carnoso, e si addossano pleura, e perisoneo. Ivi dunque per la debolezza della parte aveva potuto comparire quell' ascesso tanto più, quando per la tosse era violentemente scosso. ed abbassato il diaframma. Mi duole doverlo dire, e lo dico sine ira & studio, quorum caussas procul habeo (a), ne' casi, ove piuttosto per una somma di combinazioni, e di conghietture, come sogliono essere questi degli ascessi interni, si deve trarre il giudizio del morbo, dal quale poi la indicazione, s'incontrano talvolta Confultori capparbi, i quali, pronunciata che hanno una loro opinione, ne fono talmente inteschiati, che non potrebbono cangiarla, e ciò, che prima era loro semplice conghiettura, o sospetto, diventa poi nella loro immaginazione realtade, e persuasione. Non potè il FOUBERT, come egli stesso mi narrò, volgere l'opinione di que Pratici, i quali però io conosceva affai celebri nella Città. Ma non era quello un ascesso, dall'apertura del quale si potesse ragionevolmente sperare la guarigione del malato? In varie maniere, ed in vari fiti si possono presentare le vomiche, perché più opportunamente si aprano. Un giovane mio amico, dopo una peraltro leggiere peripneumonia, rimafe con

una

<sup>(</sup>a) CORNEL. TACIT. Annal. lib. 1. m. 1.

una molesta tosse, con febbre lenta, la quale Osservaziopo' poco si esacerbava nella notte, per diminuire poi sul mattino con un sudore puzzolente, altra vomb ed acre, il quale talmente gl'irritava la pelle, ch' era diventata scabra, e si squamava. Dopo essergli alquanto gonfiati, e divenuti edematost ambidue i carpi, cominciò ad avere la respirazione più difficile, e grave, poi gettava colla tosse una materia falsa al gusto, e di consistenza glutinosa: la sebbre su maggiore per pochi giorni, e finalmente, fatta ancor più aspra la tosse, cessò la evacuazione di quella materia, ma gonfiò edematoso tutto l'articolo superiore finistro, la spalla, e il giogolo di quel lato; la gonfiezza era maggiore sotto l'ascella, poiche ne occupava tutta la cavità, e, perchè divenne poi dolente, furonle fatte fomentazioni ammollienti, e carminative, ma due giorni dopo il loro uso la sebbre venne con eccessivo rigor di freddo, gonfiò maggiormente, e dolfe il tumore sotto l'ascella, fattosi però più molle con un certo senso prosondo, ed oscuro di fluttuazione, e coll'apparizione di strisce erifipelatose per la lunghezza di quell'articolo. Si applicò sotto l' ascella un cataplasma fatto colla putrilaggine di cipolle di giglj bianchi, di radice d'aliea, di foglie di parietaria, di malva, e di meliloto con poca farina di linseme, e gomma ammoniaca sciolta nel tuorlo d' novo. Dopo l'applicazione continuata per alcuni giorni di tal cataplasma quel tumore si sece più appuntato con una mollezza più dilatata, e con fluttuazione più fensibile, essendo però anco cresciuto l' edema del braccio colla sparizione quasi totale delle strisce erisipelatose. Allora io aprii la gonfiezza sotto l'ascella, avanzando col taglio sulla prossima parte del petto, la quale pure era edematosa, e alquanto suppurata. Uscì niente

più di un bicchiere di marcia bianca, senza che la gonfiezza diminuisse; ma nella notte seguente la febbre con freddo fu più forte, l'affanno della respirazione gravissimo, somma la inquietudine, ed al mattino si trovò la cellulosa, che gonfia, e abbeverata di un umor mucoso erafi allungata groffa quanto il pugno fotto l' ascella fuori della incisione. Fu determinato di mozzarla, e d'inciderla colle punte delle forbici; n'usciva contuttociò a stento quella materia mucosa. Infine dopo un nuovo accesso di quella febbre fu veduta la cellulosa nel profondo dell'ascella cancrenata in modo, che si potè trarre fuori a lembi: ne feguì poi uno scolo abbondantissimo di una materia, che era vera meliceride (a), e della stessa natura erano gli sputi, ed il malato tanto più ne sputava, quanto più se ne diminuiva lo scolo dall'ascella, sicche non si potesse dubitare, che fosse una vera vomica del polmone, la quale per quella parte ancora si evacuasse. In fatti, se diminuiva la tosse, e diminuivano gli sputi, cresceva lo scolo dall'ascella. Fra tre mesi e mezzo il malato fu perfettamente guarito, se non che gli rimase una gibbosità delle costole sotto l'ascella, la qual gibbosità era stata osservata sin da'primi tempi della gonfiezza dell'ascella, segno non meno valente a farci credere, che dal polmone fosse quivi venuta la materia. L'edema dell' articolo poteva effere stato prodotto in parte dalla pressione, che il tumore dell'ascella faceva fulle ghiandole sottoascellari, e sulle molte vene linfatiche, che quì da tutto l'articolo concorrono, e in parte ancora dallo spandimento

Spiegazione de' princípali accidenti offervatifi in questa vomica.

> (a) Nel cap. delle ulcere in generale si spiegherà, cosa sia la marcia chiamata meliceride, o meliceria.

dalla stessa materia, dappoiche per tutta la spalla esso edema era piuttosto di color di perla, come accade affai frequentemente nelle infeltrazioni cutanee, che pure vengano da un ascesso interno, infeltrazioni prodotte dalla parte più tenue della marcia, che ivi ha trapelato. Noi sappiamo, che la cellulosa è una spugna di e cellule insieme comunicanti, la quale si continua per tutto il corpo, e qui appresso (219) daremo altri esempi, com'essa abbia portato lontanissimo dal primo sonte la materia della suppurazione. Riguardo a quella curvità morbosa delle costole, ella è frequentissima ne' lunghi. ed abbondanti abbeveramenti di pus, o di linfa, che siensi fatti tra esse costole, e la pleura. Io ho trovate alcune volte le coste così flessibili. e molli, che poteva piegharle con somma facilità come una verga di legno verde. Il CHI-COINEAU nell' Accademia delle Scienze di Parigi anno 1731, racconta di un incurvamento delle ultime vertebre del dorso fatto da un tumore umorale del petto dietro i polmoni, il quale erafi evacuato per secesso; e perche il soggetto era nella prima pubertà, quelle vertebre poterono ancora raddrizzarsi.

197. Quando si debba aprire un ascesso del petto, bisognerà usare il gammautte piuttosto, che il lancettone: si tagliano, prima gl' integumenti secondo la lunghezza del petto; dopo la qual' incisione, se i muscoli intercostali non sono aperti, come sovente in tali circostanze lo sono, si apriranno per la loro altezza. Quando per quest' apertura siasi veduta colare la materia, si esplorerà colla punta del dito s'essa apertura possa bastare, e, se vi sosse motivo di crederla insufficiente, riconosciute che sarannosi le aderenze delle pareti della vomica, le quali sossero ancor lontane, ed allato, si dovrà pure dila-

Modo di aprire gli afcessi del petto.



tare in trasverso, per avere una sufficiente s costante apertura: quella fatta per l'altezza de' muscoli di rado suol bastare, restando sovente otturata dalla materia glutinosa, o dal gonsamento della cellulosa.

Segni degli ascessi cellu-Lari del polmone, o della picura.

198. Gl' indicati ascessi del polmone, o della pleura (195) sono qualche volta cellulari, e separati gli uni dagli altri, e soglionsi aprire successivamente, il che viene significato dal nuovo affanno, e dalla inaspettata esacerbazione della tosse, e della febbre suppurativa, e se poi se ne rompono i tramezzi, sicche comunichino infieme, si vede allora colare dalla prima apertura maggior quantità di marcia, oppure gli sputi purulenti diventano più copiosi. Ma se il nuovo follicolo apertofi non giunge a comunicare col primo ascesso, o non si evacua per alcun' altra escrezione, darà poi forse anch'esso segni esterni della sua sede, perchè si possa aprire. Io ho dovuto in un foggetto aprirne tre a diverse distanze, ed altezze.

Segni, e cura degli ascessi fattifi nella doppiatura del mediastino.

199. Il più difficile, e oscuro ascesso del petto suol essere quello, che si fa sotto lo stemo: suole anch'esso essere terminazione di un morbo infiammatorio del mediastino, come se quivi fosse la pleuritide, la quale, oltre i segni d' infiammazione, è principalmente significata da un dolore, il quale si stende per la lunghezza di esso mediastino, ed è più forte, e acuto nels tempo della inspirazione con istiramenti dolorosi, e gravi verso la gola, e inferiormente alla fossetta del cuare: il malato non giace meglio che supino, e qualche volta anche prono; in fine, dopo la febbre di suppurazione (191), dente quivi una gravezza. E' accaduto qualche volta, che la materia, avendo scostato appoco appoco le lamine del mediastino, sia giunta al alzare

alzare la cute tra l'interstizio di due costole; dove il Cerufico avendo fentito la mollezza, e la fluttuazione, abbia potuto fare felicemente un'apertura; se ciò non accade, suole ammollirsi l'osso, che è spugnoso, essere dilatati. o rosi i suoi pori, sicchè in fine la materia trapeli sin sotto gl'integumenti, e siccome ne trapela prima la più tenue, per lo più non fa trova se non una leggiere edemazia agli stessi integumenti con qualche macchia erifipelatofa, Si fa talvolta un tubercolo, dal quale aperto esce una maggior quantità di umore, che non. Cura: sembrava promettere il suo picciol volume. Quando il flusso della materia è continuo, e copioso, che ne mostra il grande spandimento in quella duplicatura, è per lo più necessario di applicare una corona di trapano allo sterno, per renderne più facile l'uscita. Alcune volte èstato trovato suppurato il timo, il quale presentandosi con una estremità alla parte inferiore della gola, e quivi facendo tumore, fattane l' apertura, si vide, che la materia veniva dal basso, cioè dallo spazio triangolare anterior superiore del mediastino. Bisogna in questo caso essere solleciti a farne l'apertura; che altrimenti la vomica dilatandosi sotto lo sterno, può sare pericolosi guastamenti (a). Altre volte essendo

(a) Anzi qualche volta non basta di aprire con sollecitudine il tumore apparente, che bisogna trapanare lo kerno, per dare un libero scolo alle marce, che ne occupano la parte nascosta sotto quest' osso. Vedasi la quarta osservazione rapportata dal la-MARTINIERE nella fua Differtazione sur l'opération du trepan au sternum, inserita a pag. 545. del IV. Tomo dell' Aceademia Reale di Chirurgia di Parigi. Quantunque l'Autore nol dica, si vede niente manco dalla narrazione della storia, che il tumore steatomoso ivi descritto era fatto dal timo. Veggafi inoltre ciò

H 4

#### 110 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

suppurata la cellulosa tra i muscoli scaleni. o tra le glandole giogolari, le quali non di rado formano una catena, che si continua sin giù nel petto, si vide la suppurazione continuata sin nella sommità del petto, e far tumore sopra, e sotto la clavicola. Tosto che in questo sito compajono alcuni segni di suppurazione, conviene subito aprire dove, e come meglio st potrà, per evitare il maggiore guastamento delle parti contenute nel petto. Per una tale flussione purulenta negletta, o mal curata, discesa dal collo nel petto, io ho trovata scoperta, e cariofa la estremità sternale della clavicola, che ho dovuto separare. Ma il malato morì per 1º ulcera cancrenosa, che si era fatta alla prossima parte del polmone.

> Degli ascessi, che si fanno dentro la cavità dell'addomine.

# § IV.

Segni razlos nali degli ascessi del fegato fatti per sussione. 200. Dovendo ora trattare degli ascessi interni dell' addomine, comincieremo da quelli del segato, i quali debbono più frequentemente accadere, dappoichè ne abbiamo un più gran numero di osservazioni. E, seguendo il Mo-RAND (a), noi pure li divideremo in ascessi fatti per stussione, e in quelli, che si fanno per congessione: a questi ultimi più, che ai primi, debb'essere soggetto il segato per l'abito suo, come quì sotto dimostreremo. Quando l'ascesso

(a) Mémoires de l'Academie Royale de Chirurgie Tomi

che facciamo osservare nel Discorso preliminare a questo Trattato a proposito di quella Disservazione, e di quanto qui insegna il BERTRANDI.

escelso è terminazione della precedente infiammazione, sono stati non equivoci i sintomi della epatitide, ed il malato ha dovuto sentire continuamente in un preciso luogo gli effetti del flemmone; il dolore però suol essere ottusissimo, e appena sensibile, quando l'ascesso si è fatto profondamente nella fostanza del viscere acuto. e distensivo, quando facevasi immediatamente fotto la sua tonaca, il che come avvertì lo stesso GALENO (a), è comune a quasi tutte le infiammazioni de' visceri. In fatti resta dormigliofo, quafi apopletico il malato nella infiammazione della propria sostanza del cervello, delira all' opposto, e soffre stupendi tumulti, e convulsioni, quando sono insiammate le meningi. Quella ottufità di fenfo è ancor maggiore nelle profonde infiammazioni del fegato, perchè è un viscere molle, inerte, dotato di piccole arterie, e di pochi nervi in proporzione della sua grande massa, e mole.

201. Si farà l'ascesso per congestione, quando appoco appoco continui a crescere la ostruzione del viscere, la quale sarà dichiarata dalla itterigia, dai vomiti, dalle nausee, dai vizj della bile, dalla gravezza, durezza, e tensione dell' ipocondrio destro, dalle urine gialle ec., sicchè per l'impaccio prodottovi si accumulino insensibilmente gli umori in alcuna parte di esso viscere, e si scompongano, onde facciano in fine la vomica, od apostema, ma con tanta lentezza ( alcuna volta fe non fra mesi, o un anno ), che si possa veramente dire fatto per congestione, cosa non difficile a intendersi, Le si rislette alla lentez, e viscidità degli umori, che abbeverano il fegato, e all'accennata sua mol-

Di quelli fatti per congestione.

(a) De loc. affett, lib, v. cap. VII.



#### 122 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

mollezza organica. Ma, mentre si farà quelle scomponimento dell'umore, cresceranno la tenfione all'ipocondrio, il vomito, la itterizia, e succederà quella sebbre, che dicemmo di suppurazione (191).

Segni esterni comuni agli uni, e agli altri.

202. Ma perchè non tutti gli ascessi del segato, siansi esti fatti per flussione, o per congestione, possono essere colla operazione guariti, e che tal cura si può solamente eseguire in quelli, che si presentano all'esterno con un tumore più o meno apparente, giova, oltre i riferiti segni razionali (200., 201.), addurne altri foggetti ai sensi, che ce li facciano meglio conoscere. Siffatti ascessi conoscibili per segni esterni, e perciò foggetti alla Chirurgia son quelli, che fi fanno nella faccia convessa dei due lobi del fegato verso il loro margine anteriore, e inferiore, bisognando innoltre, che quivi abbiano contratta aderenza col peritoneo. Il MORAND nel luogo citato (a) dice, che i cinque ascessi, che aveva veduti, de' quali quattro guarirono. erano tutti nella parte convessa, inferiore, e sociile del viscere quasi nel mezzo della regione epigastrica. Io ne ho veduto uno inferiormente al margine delle tre false costole superiori, sapendofi, che il fegato ne diverfi soggetti trovasi più o meno allungato ingiù, e che ancor più fi allunga nelle oftruzioni (b). Quando adunque pel morbo preceduto in quel viscere,

(a) Pag. 71. di detto secondo Tomo dell'Accades mia di Chirurgia.

<sup>(</sup>b) Due ascessi del segniziono stati con buon successo aperti a due malati in questo Spedale di San Giambattista, l'uno de' quali si mostrava nell'interssizio intercartilaginoso delle due prime false costole, e l'altro tra la punta delle medesime cartilagini, e la linea biança.

e per la febbre di suppurazione, che sarà finalmente accaduta, si avrà sospetto dell'ascesso, se ne dovrà cercare indizio più certo nella parte, osservando, se dalla cartilagine xisoidea per tutta la regione epigastrica verso i margini delle costole non vi sia tumidezza, edemazia, o aleune stimate erisipelatose, e infine se non si senta alcuna quantunque profonda, ed oscura fluttuazione di un umore: quando questa si senta, si dovrà far volgere supino all'uno, e all' altro lato il malato, per palpare il tumore, comprimendo, e battendo con una mano ad uno de' lati, onde sentire contro l'altra mano, che si tiene serma all'altro lato del tumore, il muovimento dell' umore, e la stabilità del follicolo, sul cui vertice facendo poi anco qualche compressione, sentesi l'umore ritornare in su, o indietro, o contro i muscoli dell'addomine secondo la sua situazione, e direzione. Se vi è aderenza del follicolo dell'ascesso col peritoneo, coll'uso de' cataplasmi ammollianti, e suppuranti vedesi quasi sempre crescere il tumore, e rendersi più sensibile la fluttuazione, ficchè il Cerufico possa con maggiore siducia · farne l'apertura.

203. Abbiamo alcuni esempj, che l'apostema In qual masiasi aperto spontaneamente, la materia avendo do tali ascesanacerati, e rosi peritoneo, muscoli, e integumenti; ma se non si apre da se, se ne farà l'apertura fulla fua parte più eminente, o fu quella, dove sentirassi maggiore raccoglimento del fluido: deefi essa fare perpendicolare, e secondo la lunghezza dell'addomine, avvertendo di non iscorrere col gammautte molto in basso, per non recidere l'angolo della unione del follicolo col peritoneo, che la materia allora potrebbe versarsi nella cavità dell'addomine; vi



sarà poi tempo di dilatare, quando ne giorni

seguenti siasi potuto più comodamente esplorare il fondo, e i lati dell'ascesso. Il MORAND però vorrebbe (a), che nel medefimo tempo fi facesse anco un piccolo taglio trasversale verfo la linea bianca, anzi che essa stessa si recidesse, quando l'ascesso sosse all'epigastrio, perchè (die egli) per l'avvicinamento, ed abbassamento della prima incisione longitudinale non così facilmente l'apostema potrebbe evacuarsi, e purgarsi, principalmente quando debbano uscire materie viscide, crasse, e sioccose, ed egli è raro, che si veda uscire pura, e schietta. marcia; essa è per lo più tinta di materia rosfigna, giallognola, o verdastra, e la massima quantità suol essere simile alla feccia del vino, con fiocchetti di sostanza parenchimatosa, cellulosa, e vascolare. « Quando si vede uscire » una tale fostanza, dice il citato Scrittore (b), » talvolta sembra, che niente affatto siavi di » pus, ma se si lascia deporre in un vaso, si » vede dopo qualche ora il pus bianco sopra » quella sostanza spessa, e rossigna, ed allora » separando per inclinazione le due sostanze. .» possonsi distinguere i siocchetti, che dicemmo » vascolari, e parenchimatosi, de'quali dice di » averne una volta tratta una libbra alla prima » apertura, e per sei settimane un mezzo bic-» chiere al giorno. " Sonvi esempj, che l'ascesso del segato, fattosi verso la sommità del viscere, abbia perforato il diaframma, e reso il malato empiematico, o che fattosi aderente lo stesso polmone col diaframma così perforato, fiasene la marcia evacuata per gli

iputi.

Qualità della marcia, che ne suole utcire.

<sup>(</sup>a) Nel luogo citato pag. 74. (b) Ibid, pag. 72. e 73.

Bouti. Il PETIT figlio nello stesso Tomo dell' Accademia di Chirurgia pag. 59. rapporta la osservazione di un ascesso al segato con tumore a tutto l' ipocondrio destro, e parte dell' epigaftrio, il quale si stendeva sin sopra la parte anteriore, e laterale del petto tra la quarta, e la quinta costola, contando di basso in alto, nel qual luogo, cioè tra quelle due costole, il Cerusico avendo sentita maggiore la fluttuazione. vi fece l'apertura, e dopo che furono evacuati tre bicchieri di marcia del colore della feccia del vino ( fegno che l'ascesso era nel fegato ) introdusse il dito nel petto, e per un foro, che trovò al diaframma, si accorse poi di avere penetrato nell'ascesso del segato, ed il malato fu così felice, che guari perfettamente nello spazio di sei settimane. Non mancava forse la porzione carnosa del diaframma dalla eartilagine xifoidea alle costole corrispondenti, come abbiamo qui sopra accennato (196), ficchè la materia non abbia perforato, che il peritoneo, e la pleura (a)? Lo stesso PETIT raccomanda conseguentemente di aprire tali ascessi con qualche sollecitudine, quando siansi conosciuti, e perchè troppo non si dilatino, e perchè forse non si sciolgano le aderenze del sollicolo (b).

Offervazione del Pg-TIT di un ascesso del segato penetrante nel petto, aperto, e guari-

204. Il

<sup>(</sup>a) Anzi non è neppur necessario, che abbia la marcia persorato queste due membrane; basta, che colla sua copia le abbia spinte in su, e dilatate; che se le avesse rotte, allora l'ascesso non sarebbe stato sollicolare, ma farebbesi fatto uno spargimento purulento nel petto.

<sup>(</sup>b) Non sara fuor di proposito il narrare la storia di un ascesso del segato, la cui materia dovea esfersi raccolta tra le due lamine del ligamento salcisorme. Un nobile Signore Vercellese, allora in età di 14. anni, dopo una epatitide ebbe un sumore edema:

### 326 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

Tumori della ciftàfelles.

204. Il Petit padre nel primo Tomo della stessa Accademia di Chirurgia pag. 155. (a) ha rapportari alcuni esempi, che la fola vescica del fiele abbia fatto cumore all' ipocondrio defro, e quivi fimulato un ascesso, dappoiche si sentiva la fluttuazione dell'umore. E perchè l'averlo aperto fu in certi cafi cagione della morte de' malati, deve importare moltissimo di esattamente distinguere le due malattie, nè potremo far meglio, che esporre le rislessioni, ch' egli stesso ha fatte a questo proposito. " Bisogna essere avvertiti ( dic'egli pag. 159.) » che l'ascesso del fegato, e 1 rattenimento » della bile nella vescichetta, essendo il più » delle volte la conseguenza della infiamma-» zione di quelle parti, hanno da principio gli » steffi sintomi; ma i rigori di freddo sono più lunghi

toso all' ipocondrio destro, che si stendeva verso la linea bianca sino all' ombilico, dov' era più prominente, e dove sentivasi l' ondeggiamento della materia. Non avendo il fanciullo voluto lasciarlo aprire col serro, bisognò ingannarlo, e applicare su
quella prominenza un pezzetto di pietra infernale,
la quale, lasciatavi dalla sera per tutta la notte,
sece un' sscara, dalla cui screpolatura usci lungo la
giornata una pinta, e più di materia oscura, la
quale continuò a colare per venti giorni sempre in
minore quantità, più chiara, e infine mucosa. L' ulcera si cicarizzò dopo due mesi circa di cura; ma
un anno oscura, e in minor copia. Nuovamente si
ria meno oscura, e in minor copia. Nuovamente si
chiuse quindici, o venti giorni dopo, e poscia una
terza volta si riaprì dopo quattordici, o quindici
mesi. Guari di bel nuovo in poco tempo, e continua ancor presentemente, che è fatto uomo adulto,
a godere persetta salute.

(a) Il titolo della sua Dissertazione è il seguente: Remarques sur les tumeurs sormées par la bile retenue dans la vescieule du siel, & qu'on a souvent prises pour

des abscès au foye.

> lunghi, quando si produce l'ascesso del se- Segui, che m gato, che quando si accumula la bile nella: diftinguono i tumori del-» vescica, quelli sono seguiti da un maggior la cistifellea » calore, poi da sudore; ma quando si sa la dagli ascessi » retenzione della bile, la cute è quafi sem-» pre secca, ed il rigore è così leggiere, e » passaggiero, che sembra prodotto da una su-» bitanea accidentale irritazione. Il tumore fat-» to dall' ascesso del segato, quando compari-» sce all'epigastrio, non è così bene circo-» scritto, sembrano gonsi insieme muscoli, e » integumenti, i quali dicemmo essere alcuna » volta veramente edematofi (202): allo 'ncon-» trario il tumore fatto dalla vescichetta è di-» stinto, limitato, per lo più globoso, e tur-» gido, e si trova sempre precisamente sotto » le false costole, e sotto il muscolo retto, » mentre l'ascesso del fegato può essere in ogni » parte dell'epigastrio più dilatato, e meno » tumido. Infine la fluttuazione ne' due casi si » fa diversamente sentire; conciossiache, per » quanto poco la vescichetta sia gonfia, e fac-» cia tumore, si può tosto sentire la fluttua-\* zione dell' umore, la quale cresce a peco a » poco, quando dipende dall' ascesso del se-" gato: infatti sovente in questi ascessi essa è " così oscura, e profonda, che quando uno " pure la fente, altri ne dubita ancora, nè di-" venta maggiormente sensibile, se non con » nuove, e maggiori accessioni di quella seb-» bre suppuratoria. Inoltre la fluttuazione dell' » umore nella vescichetta da principio, come " dicemmo, meno equivoca, e meno profonn da, sentesi in uno spazio determinato, e " circoscritto, che è il sito della vescichetta: n il tumore, che ha preceduto l'ascesso, era » duro da principio, ed, anco fatta la suppu-» razione, n'è rimasta la circonferenza gon-

### 128 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

» fia, ed inzuppara: all' opposto il tumore » della vescichetta del fiele, quando fiane ces-» fata la turgidezza, e la infiammazione, non » suole lasciare durezza, o gonsiamento alla " circonferenza."

Qualche volta gli afcessi del fegato evacuansi per fecessio ; in che modo ciò possa farsi;

205. Tale gonfiamento della cistifellea suol essere prodotto da un impaccio, che siasi fatto al corso della bile da quel sacco nel condotto coledoco, sia esso un calcolo, una scirrosità, o simili. È nell'istessa maniera, che qualche volta gli ascessi del fegato evacuansi colle secce, o perchè la parte apostemata siasi unita, e poscia apertasi nell' intestino colon ( della qual cosa abbiamo alcuni esempj (a), principalmente di quegli ascessi, ch' eransi fatti alla faccia concava del viscere ), o perchè la materia dal fegato prese la strada della bile, per portarsi nell'intestino duodeno per mezzo dello stesso condotto coledoco ( e in amendue questi casi, dopo aver preceduto uno stimolo, di evacuare le materie fecali, colle quali si trovò poi la materia purulenta dell' ascesso, quale l'abbiamo quì avanti descritta (203), diminuiscono la tensione, ed il tumore all'ipocondrio); così anco qualche volta può fgorgare la bile dalla vescichetta pel canale coledoco, che sia divenuto o affatto libero, o alguanto meno ostrutto, ed allora anco diminuisce o poco, od assai il eumore sotto le costole, e sopraggiungono presfanti, ed involontarie evacuazioni delle fecce ( se non anco vomiti ), le quali poi trovansi tinte di bile gialla, verde, oscura, o di color tanè, mentrecchè prima erano pallide, o grigie. Narra il PETIT (b) di un uomo, il quale

Anche la bile trattenuta nella vescichetta può evacuarsi per quella strada.

> (a) Petit loc. cit. pag. 172. (b) Loc. citat. pag. 168.

poteva alcune volte evacuare per secesso la materia biliosa, che faceva tumore all'ipocondrio, con far quivi solamente alcune leggieri compressioni colla mano.

206. Il Petit fu avvertito della possibilità di tali tumori della cistifellea (a) dall' averne veduti aprire, perchè erano stati presi per ascessi; ma la operazione è sempre stata mortale, quando la vescichetta non erafi fatta aderente al peritoneo, perchè la bile si spandeva peritoneo. fugli altri visceri dell' addomine; epperciò non se ne dee fare l'apertura, se non quando la vescichetta fattasi in quel modo aderente rimanga immobile. Si può sospettare essersi fatta una tale aderenza, quando fi abbiano avuti segni della infiammazione; imperciocche le parti infiammate, quando sono a contatto, soglionsi fare aderenti tra di se, e ciò si potrà con maggior fondamento conghietturare, quanto più frequenti, e più violente saranno state le coliche, come diconsi, epatiche: maggiori indizi, anzi certezza se ne avrà, se facendo giacere il malato ful lato finistro colle cosce piegate, e avvicinate all'addomine, mentre si palpa, e si preme all' uno, e all' altro lato il tumore, questo non cangia di situazione, e rimane sempre colla stessa convessità, anzi cresce ancora alcun poco; all' incontrario quando manca quell' aderenza, sentesi mobile, e scorrevole. Egli è vero però, che, durando per alcuni giorni la gonfiezza della vescichetta, nè cessando la infiammazione, suole medesimamente succedere qualche gonfiezza edematosa agl' integumenti, ma i fintomi preceduti, e l'abito del tumore saranno sempre tali, che non vi possa rimaner dub-

L' apertura del tumore della cistifelles è iemle. se non è aderente al

Segni razionali indicanti tale adea



<sup>(</sup>a) Ibid. pag. 155., e 156. BERTRANDI TUM. TOM. I.

RIO ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

dubbio, se la gonsiezza sia della vescichetta, o

del fegato.

207. Se l'apertura della vescichetta del fiele è sempre stata micidiale, quando non era aderente al peritoneo (206), abbiamo all'opposto alcuni esempi, che sia felicemente riescita, quando vi era quell' aderenza, quantunque il tumore fosse stato aperto, perchè preso per un ascesso del fegato. Non si apre spesso felicemente, e per ogni parte la vescica della orina? Quando fiavi la semplice ritenzione della bile, il PETIT (a) pensa, che potrebbe bastare di fare una punzione col tregnarti, il quale non debb' essere più lungo di tre dita trasverse. Si sceglierà il luogo più basso del tumore, conciossiachè il sondo della vescichetta penda inferiormente fotto le costole, e si diriggerà la punta dello strumento un poco in su, ed obbliquamente in dentro, come se si volesse andare verso l'intestino duodeno. Io ho veduto in Londra fare tale apertura con un faringotomo. e quando il Cerufico vide fgorgare l'umore, v'introdusse una tenta, e poi per mezzo di questa una cannella. Si conoscerà di non aver fatto errore, vedendo uscire un umore saponaceo, giallo, oscuro, o di colore di casse, che tale suol essere la bile in questi casi; qualche volta si vede anco uscire un umore mucoso, e bianchiccio, che è l'umore stillante dalle ghiandolette, o follicoli della vescichetta stessa. Ma perchè non si può sempre sperare, che dopola punzione la bile sia per riprendere così tostamente il suo corso naturale, e potendo essere incomodo l'uso della cannella, conviene quasi sempre sare qualche poco di dilatazione col

Quando, e come debbasi aprire la cistiscellea col srequer-

Quando, e come sia ne-cessario di-latare la punzione.

col gammautte, tanto più se vi fossero calcoli nella vescichetta, come sovente si trovano in fimili cafi, i quali alcuna volta fogliono urtare contro la cannella stessa: nientedimanco per averne maggiore certezza, fi potrà introdurre per questa una tenta di argento flessibile colla punta ottufa, o una candeletta. Per questo motivo sarà sempre meglio usare una cannella, che abbia una fcanalatura, lungo la quale si possa fare strisciare, occorrendo, la punta del gammautte, onde dilatare la punzione con un taglio parallelo al margine delle costole. E perchè questo taglio si potrà fare più sicuramente, e più esattamente, quando la vescichetta faccia ancora tumore, perciò si dovrà allora otturare la bocca esterna della cannella medesima. Fatta sufficiente dilatazione, i calcoli fogliono effer tratti fuori dalla bile medefima, che continua a sgorgare, se no si dovranno estrarre con mollettine, le quali si portino dentro la vescichetta, diriggendole sopra una grossa tenta scanalata, che serva di conduttore.

Come fi cdanofcano, o come debanni eftrarre i calcoli biliari.

della vescichetta sattasi insiammazione, e quindi aderenza della medesima al peritoneo (206), formossi poi quivi un vero ascesso nelle corrispondenti pareti dell'addomine, entro il quale essendosi aperta spontaneamente la stessa vesci-chetta, all'apertura di quell'ascesso trovaronsi calcoli, che avevano penetrato, trattivi dallo scolo dell'umore, tra gl'integumenti, e i muscoli, donde si dovettero estrarre colla dilatazione de'seni. In un cadavero io ho veduto un ascesso al lato destro della regione epigassirica, dalla cui apertura uscì un liquore giallognolo, e mucoso, sicchè se tale ascesso sosse satto por

Talvolta & fa l'afcesso, e l'apertura spontanea della cissificalea.

Offervazione dell' Autore di un tumore, che fimulava un ascesso del segate.



tuto credere, che fosse un' apostema del fegato;

ma eravi un follicolo, che dalla carcilagine xifoidea stendevasi da un lato sotto il prossimo lembo del fegato, e dall'altro lato fino alla linea bianca, alle quali parti era unito: la materia di quest' apostema aveva stillato dalle ghiandole, che stanno attorno il piloro, le quali trovaronii grosse come uova, ed ulcerate. Priına che l'ascesso fosse fatto, io aveva potuto palpare il tumore globoso, e limitato di quelle ghiandole, la digestione era lentissima, e difficilissima, e facilissimi i vomiti, quando qualche copia di alimento tentava di passare per l'angustia del piloro. Il MORAND nel terzo Tomo dell' Accademia di Chirurgia pag. 470. rapporta due osservazioni di ascessi stemmonosi, che sono stati aperti alla regione epigastrica verso l'ipocondrio destro, veri ascessi, dic' egli, slemmonost, dai quali si vide uscire veramente uno schietto pus ( nè mai tale suole uscire, come abbiamo qui sopra avvertito, dagli ascessi del fegato (203), o dal tumore della vescichetta (207)), e alcuni giorni dopo fu veduta colare pretta, e pura bile. Egli pensa, che essendosi quegli ascessi fatti tra il peritoneo, ed i muscoli contro la vescichetta del fiele, questa abbia potuto connettervisi per la infiammazione, di cui avesse anco partecipato, e che poi, ammollite, e macerate le sue tonache, siansi sinalmente aperte, come dal guastamento prodotto dal pus negli ascessi del perineo vediamo

sovente aprirsi la vescica dell'orina. 209. Il signor Hevin nel primo Tomo della medesima Accademia (a) ha raccolte diverse sto-

Altre due offervazioni del Mo-RAND di ascessi flemmonosi, e biliosi nello flesso tempo.

<sup>(</sup>a) Vedasi la sua lunghissima Dissertazione intitolata: Précis d'observations sur les corps étrangers arrêtés dans l'assophage, & dans la trachée-artère a pag. 444: di detto Tomo,

rie di ascessi al collo, al petto, e all'addomine, prodotti dalla presenza di corpi stranieri arrestati nell'esofago, nel ventricolo, o negl'intestini, i quali sitti, e come imprigionati in un determinato luogo di quelle parti, avevanle compresse, irritate, e tumesatte, sicchè infine si fosse prodotto un ascesso, dall'apertura del quale ( dappoiche quelle parti eranfi conglutinate colla pleura, o col peritoneo ) que' corpi stranieri hanno potuto felicemente estrarsi; ma di questi ora non vogliamo parlare, e potere esserne istruiti dalla citata Dissertazione dell' HE-VIN, o da ciò, che ne scriviamo nel capitolo della tracheotomia (a). Ora continuando le nostre osservazioni di quegli ascessi, che per altre cagioni, per lo più interne, si producono sui visceri dell' addomine, diciamo, che l'ascesso del ventricolo non suol essere soggetto alla Chirurgia; conciossiachè esso piuttosto si evacui per l'esosago con vomiti, o escreati purulenti, o per secesso, essendo cosa rara, che in simili casi il ventricolo abbia contratta tale aderenza col peritoneo, che se ne possa tentare l'apertura, e sperare la guarigione, com'è accaduto di quelli prodotti dalla presenza di corpi stranieri; aggiungasi, che tale ascesso suole prodursi tra le tonache del ventricolo, sicchè la interna possa più facilmente rompersi. dappoiche si trova più ampia, e più rilassata. Vedetene una storia nel terzo Tomo delle Disputazioni Mediche della Raccolta Alleriana pag. 125. (b).

L' afcesso del ventricolo non è soggetto alla Chirurg 1, e perchè.

210.

(a) Ved. il Trattato delle operazioni Tom. 11. cap. xx.
(b) Gothofredi SAND, & Georgii Alberti STOLZ
parus ventriculi abscessus.



## 134 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE.

La milza è pochissimo loggetta ugli ascessi,

Distinzione, e sede degli ascessi del mesentorio.

Segni, e cause dei fatti per flufo fione,

210. Nulla diremo degli ascessi della milza. perchè ce ne mançano gli esempi: questo viicere cotanto molle, spugnoso, e pieno di sangue piuttosto s' indura, o secondo le diverse cagioni si sfacela: Ma moltissime osservazioni si leggono di ascessi del mesenterio, conseguentemente ad ostruzioni del fegato, della milza, del pancreate, alle suppressioni del flusso emorroidale, o menstruale, ec., la materia de' quali ascessi alcune volte è stata trovata tra le lamine dello stesso mesenterio, altre volte erano le ghiandole stesse mesenteriche apostemate. I primi sogliono essere fatti per flussione, principalmente quando repentinamente, e violentemente fopprimansi quelle evacuazioni, la diarrea, o la dissenteria critica, del quale accidente abbiamo molti esempi. Cessata la violenza del morbo precedente, è il malato sorpreso dalla febbre suppurativa, gli si contraggono gl' ipocondrj, il ventre diventa poco, od assai tumido con un dolore gravativo ai lombi; sembrando però, che il peso si faccia anco sentire verso la regione ombelicale; sono preceduti dolori colici più, o meno forti, i quali pur anco continuano dopo fatto l'ascesso, comecchè più miti, la suppressa evacuazione non è più comparfa, nè il morbo della milza, del fegato, o del pancreate, che fu la cagione predisponente, l'ascesso è pienamente terminato; conciossiache l'ascesso in simile caso sia per lo più piuttosto un epifenomeno (a), che la terminazione di esso morbo. Gli ascessi del mesenterio fatti per congestione sono prediposti da

<sup>(</sup>a) Episenomeno, o epigennema ( che sono sinonimi ) significa un accidente, un sintoma aggiuntos a un morbo, senza che questo sia terminato.

una lenta, ma continua congerie d'umori, che si fa nelle sue ghiandole conglobate nelle persone cachetiche, soggette a febbri insermittenti pertinacissime con ostruzioni anco lentamente prodotte della milza, o del pancreate, ma ancor più ne' soggetti strumosi: loro si guastana le digestioni, succede la inappetenza, i vomiti sono frequenti, rara la escrezione delle secce, oppure accade la vera lienteria, l'addomine è teso, duro principalmente alla regione ombelicale, si tocca sotto de' muscoli nell'aja della cavità il tumore, che non si potrà pel sito, che occupa, dubitare essere del mesenterio, e quando siasi disposto lo scomponimento, avranno preceduti alcuni accessi della sebbre di suppurazione.

che occupa, dubitare essere del mesenzio, e quando siasi disposto lo scomponimento, avranno preceduti alcuni accessi della sebbre di suppurazione.

211. Pietro ESTANOVE alla pag. 62. del primo Tomo della Biblioteca Cerusica del Manageri racconta di un fanciullo, il quale, perchè aveva il ventre molto gonsio, era creduto identica ma gli crebbe tanto il supporte all'ome

idropico; ma gli crebbe tanto il tumore all'ombilico, che infine da se si aprì, donde n'escirono otto, o dieci libbre di pus lodevole, ed il fanciullo perfettamente guarì. " Ayvertano ,, i Giovani Cerufici (dice lo stesso Autore), , che sovente tali *tumori* ne' fanciulli si pro-" ducono, come se fossero idropisie; ma se si 2, aprono in tempo, i malati per lo più guariscono." L' Autore non ha determinata la precisa sede di quell' ascesso, si può però conghietturare, che fosse nel mesocolon trasverso dietro l'omento, e che divenuto aderente al peritoneo nella regione ombelicale, abbia quindi potuto evacuarsi con quella felicità. Pare anche, che fosse del mesenterio quell'ascesso, di cui ci ha data la storia l' HEURNIO nel suo

Di quelli , che si fanno per congestion

Offervazione dell' Es-TANOVE di un ascesso del mesocolon apertosi da se, e guario to.

Altra dell'
HEURNIO
di un afceffo
del mesenterio guarito
coll' operazione.

Commento all' aforismo fettimo della sezione

### 136 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

VI. d'IPPOCRATE (a): " Ho veduto, dice egli. " una donna, la quale aveva il ventre più du-" ro d'un saffo: gli seci applicare sopra un ", empiastro delle mucilaggini, ed essendovi nata " in un luogo qualche rossezza, quivi seci fare " un' apertura affai profonda, da cui usci molta , copia di marcia, e la donna fu guarita. Ho " veduto ( segue lo stesso Autore ) che tali " ascessi, se non si aprono, induransi come ,, sassi, ed ugualmente duro diventa tutto il , mesenterio, e i muscoli dell'addomine fanno , troppa refistenza, onde non se ne possa così " facilmente sperare la spontanea apertura. Nel urzo Tomo delle Disputazioni Mediche della Raccolta Alleriana pag. 513., e seg. (b) potete leggere un gran numero di offervazioni di ascessi al mesenterio, che occupavano diversi fiti, ed avevano diverse direzioni, e perchè il Cerufico non ha potuto operare, quafi tutti fuzono mortali. Alcune volte fissatti tumori sono meliceridi (387) così recondite, e mobili, ovvero ateromi (389), o steatomi (388), o sarcomi (505) fitti, e conglutinati con diverse parti, che ogni operazione sarebbe pericolosa. se non micidiale, onde di questi niente più diremo.

Afcessi delle intestina come si possano aprire esternamente. pj, che dopo pertinaci oftruzioni de' visceri dell'addomine, dopo lunghi, e continui dolori colici, o anche per colpi ricevuti, qualche pezzo d'intestino fiasi fatto aderente al peritone nell'istesso modo, che dicevamo ciò qualche che

(a) Hippocratis aphorismi grace, & latine, brevi enarratione, sidaque interpretatione illustrati a Johanne HEUR-NIO. Ultrajecti 1601. in 4.

(b) În una Disfertazione Henrici HENRICI, & Gregorii Ludovici NOTTNAGEL de abscessu mescenterii, &
musculorum abdominis plane singulari.

che volta accadere per corpi stranieri nel tubo intestinale arrestatis (209): nel luogo dell'aderenza fattosi poscia tumore, ed ascesso, e questo apertosi o spontaneamente, oppure anco col ferro ( dappoiche l'ascesso era stabile, e con perspicui segni d'ondeggiamento ) surono vedute uscirne le fecce, la marcia, o vermini ( vedetene varie offervazioni nell' accennato Tomo della Biblioteca cerufica sotto l'articolo ascesso), cioè, come si è detto, della vescichetta del fiele (208), può alcuna volta l'intestino fatto aderente infiammarsi, suppurare, e romperfi, e perciò senza ragione si condannerebbe un Cerufico, di avere aperto un tale ascesso, quantunque colle marce vermini si vedessero uscire, o materie secali. Le vomiche del mesenterio ( 210. 211. ) possono alcune volte romperfi, e spandere la loro materia nella cavità dell'addomine; ne leggiamo alcuni esempi presso gli Autori: succedono allora lipotimie gravissime, nausee, vomiti, sudori freddi, tensione agl' ipocondrj, infine sente il malato una gravezza come una spinta, che inopinatamente lo sorprende verso il pube, e verso le anguinaglie; conciossiachè le materie sparse nell' addomine ivi quasi sempre si determinano: Vedete il capitolo delle ferite dell' addomine, che quivi abbiamo trattato assai ampiamente l'argomento degli spargimenti, che in questa cavità si possono fare, e del modo di curarli, se pure il malato sopravvive ( la qual cosa raramente può accadere), alla screpolatura di una vomica, la quale suole essere assai grande in simili casi.

213. La nefritide, o sia l'infiammazione de' reni può essere mossa da calcoletti, da sabbie, da muchi, da orine acri, dall'abuso delle bevande

Quelli del mesenterio si aprono tal-volta nell' ampia cavità dell'addomine.

Segni.

Ove si prefenti per lo più la materia.

Cagioni della nefritide

### :-! ANDER NEEDS WELL ASSOCIATE.

rance mannie. The contents, etc., e all inimmunicate mannie man il rais I ajulio.

namos medio ini intra liverare la matera
le te evante de la va tela acue; ma quitre vitta i trattene de vitane, fiave mova
matera communicate accommunicati, mine appare tavore materie princena alla regione insmate mano i margine nell'inimia faita codiola,
ficiale avendo recontent i ferra man equivoci
cell'afferme animamentate del rine, eta non
fi prita fiumane ten ma afecti i hingra disque reconciueit, concistiacire la profundita
cell'a alla fiumane manimice, che fi pula
femine la fiumaneme manimice, che fi pula
femine la fiumaneme tena maccio.

≨ুলা প্রেম্ব কুন্দু, জেড

214. L'amano ga ĉero in altri luogii ( 191. É aiss ), e noi discuo mai abballan-22, the is inputatione latte it pad complicittutare da teen from e coccioni della inglanmarines precedura, dalla calura apparente, ma breve, che ne ierni, escadoù poi tatto sentise an divorc gravativo, tairoita pulleggiante con ngon à frecco, indon, ec. Gli afcest consecutivi and meritade (213) fono per lo più cola impremone, o almeno con molta dimisuzione delle orine, le quali escono sempre con un dolore, che si stende dai lombi per la via degli ureteri fino al pene, melcolate di langue, di mucchi, di marcia, di calcoletti, di lablie; quindi è, che il loro sedimento è torbido, spesso, rossigno, e purulento. Quell' atroce dolore de lombi fi fa ancor più sentire, quando quelle parti fi toccano, e tofto fi propaga, come dicevamo, per gli ureteri fino al pene, anzi vedonfi convellere, e ritirare i te-Aicoli medefimi; qualche volta al semplice toccare la parte de' lombi, che è affetta, il malato strilla fortissimamente, come se gli si saceffe una puntura, ed allora è segno, che quivi sia sitto un calcolo nella parte inseriore del rene verso il pelvi; e veramente la maggior parte degli ascessi de' reni, dei quali abbiamo le osservazioni, sono stati promossi da calcoli, come dalla cagione più possente, e in questi casi il malato ha ordinariamente prima patito di renella. Io ho veduto seguire la nestricide, e a questa l'ascesso del rene alla suppressione della podagra, ed è antica osservazione, che non solamente l'assezione renale, ma il calcolo stesso segua alla podagra.

215. Abbiamo più che di ogni altro ascesso delle viscere dell'addomine, molte offervazioni, che il rene apostemato o siasi spontaneamente aperto, o se ne sia fatta felicemente l' incisione. Quando dunque l'ascesso del rene sia evidente pei segni sovra esposti (214), e per così dire palpabile sotto il margine inferiore dell' ultima falsa costola, si dovrà fare una incisione lungitudinale parallela alle vertebre nel luogo della maggiore protuberanza, tagliando integumenti, e muscoli. Come si avanza col ferro, si esplorerà sempre più col dito l'ondeggiamento della materia, ficchè infine fi penetri nel follicolo dell'ascesso. Quando il rene Suppurato ha dati que' segni esterni della postema (213), la materia non è sempre tutta compresa nella sostanza di esso rene, ma, essendo anche suppurata la tunica adiposa, che lo avvolge, non sempre alla prima apparizione della marcia si dee credere di avere aperto il follicolo dell'ascesso: bisogna, per accertarcene, portare il dito indice della mano finistra più in dentro, e tasteggiare, se non si sente ancora esso follicolo pieno di umore, il quale poi, quando si apra, non solamente si vedrà colare, ma versare impetuosamente altra marcia, la quale allora verrà precisamente dal rene. I grossi vaſi

Maniera di aprirlo.

vasi di questa viscera sono più in alto del luogo, dove si può fare l'apertura dell' ascesso. non potendosi il rene aprire, se non sotto quel margine dell' ultima falsa costola (213) fin dove debb' essere giunto l'ascesso; operando adunque con esattezza, que' vasi non possono essere offesi. Ma se sosse stato tagliato qualche ramo arterioso di qualche riguardo, il quale si sosse trovato tra i mufcoli, s' introdurrà un pezzo di fungo di quercia, o di esca, ed altri ligati ad un refe, fino che sia fatta sufficiente compresfione. Quando per la ferita fatta ai muscoli si porti il gammautte veramente ful rene, bisogna farlo penetrare lentamente, e con cautela, per non giungere ad aprire il peritoneo, che copre il rene nella sua faccia anteriore, perche allora potrebbonsi offendere con grave pericolo altre parti, o le marce spanderebbonsi nella cavità dell' addomine. Colla marcia vedesi sempre uscire la urina (a), e sovente calcoletti, o sab-

Non è vero, che dall' apertura di tali ascessi esca sempre insieme colla marcia dell'urina. À un Pittore di questa Città, dopo atrocissimi dolori del rene finistro, i quali durarono interpolata-mente ora maggiori, ora minori un mese circa, comparve infine alla parte finistra della regione lombale sotto il margine inferiore dell' ultima falsa costola una poco elevata gonfiezza quasi edematosa, che si stendeva in giù due, o tre dita trasverse lungo il margine anteriore dell' origine comune da muscoti facro-lombale, e lungo dorsale. Nel mezzo della gonfiezza eravi una macchia nera fimile a un' ecchimofi non più larga di un' unghia. Perchè dai fegni precedenti si aveva giusto fondamento di credere, che si fosse fatto un ascesso a quel rene, si applico il caustico potenziale su quella macchia, e n' uscirono per sette, od otto giorni materie icorose, e tenui, le quali probabilmente trapelavano dal profondo dell' ascesso a traverso i muscoli. Alla caduta dell' escare si sentì col dito una mollezza circoscritta grossa

bie; anzi quando esce un calcoletto, bisogna restare in aspettazione di altri, poichè di rado un sol calcoletto impaccia la via delle orine,

e produce l'ascesso.

216. Sonvi molte offervazioni, che dopo l'apertura dell'ascesso del rene siavi rimasta la fistola, la quale non pote guarire, se non colla estrazione di un nuovo calcolo, che era stato negletto, oppure non erafi da principio potuto estrarre. În caso di simile fistola, bisogna, per farne l'esplorazione, far uso di una candeletta, o di una tenta flessibile di piombo: fi curerà poi con quelle cautele, che insegneremo nel Trattato delle ulcere. Enrico ROON-HUYSEN nella Parte prima delle sue Offervazioni Osservazione XXII. (a) narra di un uomo, a cui due anni dopo di avergli aperto un escesso del rene destro, dal quale aveva estratto un calcolo assai grosso, su obbligato di riaprire l'antica cicatrice, che si era un poco infiammata, dalla quale potè ancora trarre un altro calcolo poco più piccolo, e dopo quella seconda operazione godette una persetta sanità. Egli è vero però, che tali fistale rimangono alcune volte incurabili, principalmente quando non cessa la nuova generazione di calcoletti, o

Onde nasca lafistola, che rimane dopo l'apertura degli ascessi del rene,

quasi come la metà di un uovo, dentro la quale essendosi spinta la punta di una lancetta tanto profondamente, quanto si potè, n'escì subito una buona chicchera di marcia schietta senza cattivo odore, la quale continuò a colare per due mesi, e più, pos si fece una soda cicatrice, nè mai si vide uscire la menoma goccia d'urina. Sembra, che in questo caso l'ascesso occupasse, e penetrasse nella sostanza medesima del rene, da che per tre mesi circa il malato pisciò del pus coll'orina.

(a) Queste Offervazioni Cerufiche, che sono in numero di quaranta, sono state pubblicate in lingua,

Olandese a Amsterdam l'anno 1672. in 🛼

## 142 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

di arene; ma i pericoli di quegli ascessi sono così grandi, e pressanti, quando si presentano fino alla cute de lombi, che il Cerufico non dovrà mai pentirfi di averne fatta l'apertura. massimamente che sogliono restare ancor più facilmente fistolosi quelli, che si aprono spontaneamente. Leggete la seconda, e la terza sezione della prima, e seconda parte della grande Dissertazione dell'HEVIN sopra la nefrotomia, inserita nel terzo Tomo dell' Accademia di Chirurgia (a), che quivi troverete raccolte moltissime offervazioni, per le quali con maggior fiducia oserete aprire tali ascessi, e minor fastidio avrete della fistola, che talvolta rimanesse dopo la vostra operazione. Egli è sempre utile di essere armati contro i detrattori malevoli, i quali fogliono quasi sempre condannare le operazioni più riguardevoli, perchè meno frequenti.

Afcessi tra il peritoneo, e i muscoli dell' addomine.

217. Nel paragrafo seguente ( 222. e seg. ) esporremo i segni, pei quali si possano conoscere gli ascessi prodotti dal latte nella cavità del pelvi, o tra il peritoneo, e i muscoli dell'addomine: quegli stessi segni topici indicano ogni altro ascesso, che si faccia in quelle parti; qui solamente debbo prevenirvi, che, conosciuta la flussione dell' umore ad una di esse parti tra il peritoneo, ed i muscoli, non bisogna argomentare della maggiore, o minore suppurazione dall' esterna elevazione del sumore: conciossiache più facilmente possa cedere il peritoneo verso la cavità, che i muscoli in fuori, ma bensì dalla continuazione, e veemenza de' dolori, dal fenso di maggiore, o minor gravezza,

Da quali fegni fe me debba conghietturare l'ampiezza.

<sup>(</sup>a) Recherches historiques & critiques sur la néphrotes mie, ou taille du rein pag. 238. di detto Tomo.

vezza, dalla violenza della cagione, che ha prodotto il tumore, dalla frequenza degli accessi della febbre suppuratoria, dall'ampiezza dell'edema, o delle stimate risipelatose, infine dalla estensione, che si sente del vano al di sotto, mentre si comprime, senza poter comprendere colla mano alcuna globofità. Avendo io aperto ad un uomo un tale ascesso sotto, e da canto all'ombilico, ho potuto col dito indice, che y' introdussi, prima che il pus ne fosse tutto evacuato, toccare le vertebre de' lombi; conciossiache il tumore interno ( il quale però era anche un poco elevato in fuori ) aveva alzati. e gettati da canto gl' intestini. Questi ampj ascessi possono essere evacuati per una piccola incissone di due, o tre dita trasverse, perchè, tolta la pressione alle parti interne, queste sempre più premono il peritoneo contro i muscoli, sicche minor copia di marcia vi possa restare, e sempre più diminuendosene il ricettacolo, infine si conglutini, e si chiuda. L'apertura fi dee fare per la lunghezza del ventre, e non in trasverso, che più facilmente ne accadrebbe l'ernia ventrale.

In che modo fi debbano aprire.

A18. Nelle pertinaci iscurie, o strangurie può alcuna volta infiammarsi, e suppurare la cellulosa tra il peritoneo, ed i muscoli superiormente al pube: succede anco quella sebbre suppuratoria, sentesi una tensione de' muscoli sopra quella parte, una gonsiezza dissinta da quella della vescica con una certa gravezza; nasce presto l' edema degl' integumenti, e fassi un vero ascesso, di cui sovente si può persino sentire la stuttuazione. Bisogna essere solleciti ad aprirlo, perchè altrimenti la materia macerando le tonache della vescica, questa può screpolarsi, e spandersi con grave pericolo insieme colla marcia la orina. Io ho veduto screpo-

Ascession and selection of the peritoneo, e i muscoli come si conoficano, e da che procedano.

Vogliono effere prefio aperti, e perchè. Ascessi della pariche.

220. Le affezioni ischiatiche possono anche, terminare con un ascesso, il quale talvolta si

ni consecutivi alla gobba, che si sa sotto il diafram-ma, l'attribuisce, dico, al consenso delle parti, ma non ispiega, come questo consenso si faccia. Il celebre CAMPER ( demonstrat. anatomico-patholog. lib. 2. cap. 1. n. 6. ) fa con molta sagacità osservare, che. dipendendo quella gobba ordinariamente da un tumore, che per lo più degenera in ascesso, nato tra il corpo delle vertebre, e quel ligamento lungitudinale, la marcia trova una strada bella, e fatta, per portarsi dai lombi nella fossa iliaca, e da questa agl' inguini sotto l'arco crurale, stantechè quello stesso ligamento dà origine alla guaina aponeurotica, che veste i due muscoli psoas, e poscia l'iliaco interno. donde viene poi a inguainare al di fotto dell' arco erurale il tendine comune al psoas, e all'iliaco. Noi ne abbiamo trovato uno di questi ascessi nel cadavero di un fanciullo rachitico, e gobbo, che occupava tutta la fossa iliaca destra al di sotto di gnell' aponeurosi, che serviva di follicolo alla marcia. Una fanciulla abbiamo ancor di presente in cura, alla quale, dopo essere comparso esternamente al lato destro de' lombi un ascesso, il quale su aperto col. caustico potenziale, s'incurvarono indietro le tre prime vertebre de' lombi, e sei mesi dopo comparve un tumore alla regione iliaca dello stesso laso, nel quale non si poté sentire un qualche ondeggiamento. se non molto tempo dopo tra le due spine anteriori dell'osso ilio. Si aprì nello stesso modo questo nuovo ascesso, e n'esci per molti giorni, e n'esce an-cora molta marcia, e si conosce colla tenta, che il seno va oltre la regione iliaca sino ai lombi. Abbia-mo pochissima speranza della guarigione di questa fanciulla, sì perchè probabilmente le vertebre sono già cariose, sì perché ella è al sommo emaciata e da questo ascesso, e da altri fattisi in diverse altre parti del corpo. Il lodato CAMPER nel luogo citato dice di averne veduto guarire uno, che occupava la natica, e tutto l'osso iliaco finistro, soggiungendo, che il malato rimaso rigido de' lombi era costretto d'andare col tronco inclinato all'orizzonte. In un fanciullo, che era gobbo al di fopra del diaframma, formaronsi diverse fistole e all'inguine, e lungo

#### DELLE NATICHE, E DELLA COSCIA. 147º

fa fotto, i due primi muscoli gluzi, sicche la natica ne fia elevata in tumore, ma senza alcuna varietà di colore alla cute a cagione della profondità della materia: il muovimento dell' articolo è difficile, e doloroso, esso articolo poco, o affai greve, e quafi stupido per la pressione, che la materia sa sopra i nervi sacroischiatici, il tumore rappresenta un emissero, e quando si comprime da un lato, e dall'altro, sentesi l'ondeggiamento della materia, come se Come si cofosse racchiusa in un denso, e resistente follicolo. Nello scomponimento di essa materia succede poi anche la febbre suppuratoria. Anche in questo caso bisogna essere solleciti ad aprire l'ascesso, acciocche la marcia non giunga a spandersi in luoghi ancor più prosondi, dove collo strumento non si possa forse arrivare, o infine non tia afforbita con grandissimo danno. In questo ascesso il taglio si dee anche fare assai profondo, dovendo il ferro oltrepassare la spessezza di que' muscoli, e si dovrà fare secondo la lunghezza della natica. L'HOLLERIO nel lib. 2. cap. 1. delle Instituzioni Cerusiche ci av- Non si dee vertisce non solamente di non tagliare, ma neppure di scoprire il nervo sacro-ischiatico, perchè ne potrebbe restare stupido l'articolo, quanto poco quel nervo fosse osseso, non dice già dallo strumento, ma solamente dall' aria. Alcuna volta la materia sparsa contro i muscoli

Quando, e come si debbano aprire.

scoprire il nervo sacroifchiatico.

la coscia, ed essendo finalmente morto consunto, trovò il corpo delle vertebre lombali, e di alcune di quelle del dorso affatto corroso dalla marcia. Vedesi' da questa ultima osservazione, che gli ascessi alla regione iliaca, e agl' inguini si fanno sia che la gobba trovisi al di sopra, o al di sotto del diaframma, perchè quel ligamento si stende, come si è detto, anche lungo il corpo delle vertebre dorfali.

Afceffi profondi della parte fuperiore della cofcia.

quaetro-gemelli della coscia giunge a comprimere il collo del femore, che poi il capo n'è spinto fuori della cavità cotiloidea: allora la coscia divien gonfia sotto l'arco crurale, e attorno i trocanteri. Ma per lo più così tardi fi conosce un tale ascesso, e così tardi se ne sente la fluttuazione, per poter diriggere il taglio, che, quando pure si apra, trovansi disfatti, e laceri que' muscoli, macerato, ed aperto il ligamento capsulare, consunto il rotondo, e carioso l'osso; onde, se pure il malato non muore tabido per la continua generazione della marcia, e più prestamente pel suo riassorbimento, resta almeno storpio dell' articolo, e questo medesimamente per lo più emaciato, e stupido. Nel Trattato delle ulcere insegneremo il modo di curare i suppurati internamente, e i cachetici: per ora basti di avervi avvertiti di questi casi, i quali potrete ancor meglio conoscere, ed acquistar maggior fiducia per trattarli, se vi accostumerete a leggere gli Scrittori di osservazioni; che artem experientia fecit, exemplo monstrante viam (a).

# Degli ascessi lattei.

# **S.** V.

Sede, cagioni, e differenze degli fpandimenti lastti.

221. Accade qualche volta, che nelle nutrici, e ancor più sovente che nelle puerpere
l'umor latteo si spanda nella cavità del pelvi,
il che suole avere per cagione principale l'impedita, o la suppressa separazione del latte nelle manmelle, onde queste sogliono, prima che
quello spandimento si faccia, rendersi ricascan-

<sup>(</sup>a) Manil. Astronomic. lib. 1. verf. 61.

ti, ed esauste. La sede dello spandimento è o nel tessuto cellulare contro le pareti del pelvi, e negl'interstizi de' muscoli, o nella duplicatura de' ligamenti larghi, in una comune cavità, oppure egli è cellulare, e diviso in vari follicoli.

222. Quando tale inzuppamento si fa nella Loro segni, cellulosa del pelvi, e negl'interstizi de' muscoli, l'ammalata fi lagna, tofto che comincia, di debolezza nella coscia, di dolore ottuso nell'inguine, e di peso nel pelvi a quel lato, ove si fa l'inzuppamento, o ad amendue, se ad ambi i lati va facendofi. Quando poi è fatto, alcune volte col tatto possiamo assicurarci del tumore, sentendosi in quelle parti una certa fpugnosa mollezza, turgenza, o spessezza: stando l'ammalata coricata sul dorso, prova molto maggior dolore, quando allunga le cosce, per la pressione, che allora fanno sul tumore il muscolo psoas, l'iliaco interno, e il loro tendine comune, ed ecco perché in fimil cafo suol tenere le cosce piegate: anco il cordone de' vasi crurali è doloroso per qualche tratto sotto l'inguine, e vi si scorgono attorno e per la lunghezza piccioli nodi, o gonfiezze della tunica cellulosa.

223. Se il tumore si è fatto nella duplicatura de' ligamenti larghi (221), essendo allora elevato, e distratto il ligamento rotondo accanto la vulva ( che è il luogo della sua inserzione ), sente quivi la donna un dolore più, o meno acuto. Egli è raro, che l'inzuppamento si faccia da principio in amendue que' ligamenti, piuttosto si dilata nella cellulosa del peritoneo. onde fi offerva qualche gonfiamento dall' offo ilio di quel lato al pube, o in vicinanza delle vertebre de' lombi, e dell' offo facre vente fi dilata giù per la cofcia all

quando fi cellulosa

Ouando fanno ligamenti larghi 🕽

fino al piede, le quali parti allora divengone turgide, e tese, ma non trasparenti, e lucide, come nell' edema, piuttosto di un color di perla bianco, e latteo, nè da principio così facilmente vi rimane l'impressione del dito.

Segni della loro dilatazione alle estremita interiori.

224. La dilatazione dell' inzuppamento latteo dal pelvi alla coscia, abbia esso la sua sede nella cellulosa (222), o ne'ligamenti larghi (223) ( che in amendue i casi suol farsi ), si annunzia con una tenfione fommamente dolorosa alla coscia, principalmente lungo il cordone de' vasi, e nervi crurali, cioè dall' inguine alla parte interna della coscia, al poplite, e profondamente nella gamba, ma sovente senza calore, nè rossore, o gonsiamento apparente: ne' seguenti giorni cresce la tensione nella gamba, e trattanto compare il gonfiamento della coscia, la quale però diventa men dolorosa, ed a questo modo la tensione, ed il gonfiamento fi fuccedono fino al piede, diminuendo sempre il dolore, come cresce il gonfiamento, anzi accade piuttosto una certa stupidità, e impotenza di quell'articolo. Tale modo, col quale questi inzuppamenti procedono, oltre lo stato di nutrice, e del puerperio, e qualche volta anche della gravidanza, che come cagione li muove (221), li fa abbastanza distinguere dai gonfiamenti semplicemente edematosi: sogliono anco essere annunziati della perdita dell'appetito, e del fonno, da una febbre leggiere, alcuna volta continua, altre volte intermittente, i cui accessi cominciano con un piccolo, e freddo tremore. Alla loro apparizione fono quasi sempre suppressi, o colano scarsamente tenui, e fierofi i lochj. Il LEVRET scrisse (a) non ac-

<sup>(</sup>a) Nella già citata sua Opera intitolara: L'ste, ses accouchemens &c.

cadere a quelle donne, che allattano, e poterne essere sorprese le nutrici, quando cessano di allattare. Bisogna anche notare, che non sempre gl' inzuppamenti lattei, che si fanno nelle estremità inferiori, hanno origine dallo spandimento del latte fattosi prima o nella cel-Iulosa del pelvi (222), o nella duplicatura de' ligamenti larghi dell'utero, dal qual luogo fi propaghi in quell' articolo; che alcune volte coscia sono veramente gonfia primitivamente lo stesso arti- primitivi. colo, non essendovi segno di alcun tumore in quelle parti superiori, alle quali talvolta piuttosto accade conseguentemente allo spandimento fatto alla coscia.

Talvoita gl'

225. La rifoluzione dei descritti inzuppamenti Facilmente suole cominciare alla coscia, siegue poi alla ne accade la gamba, e finalmente al piede; ma se, mentre come, e dodiminuisce il tumore della coscia, non sopravvengono sudori, orine, o slusso di ventre abbondanti, e lattei, bisogna temerne la metastasi, o lo spandimento in altro luogo. In fatti si vede sovente, che l'umore in simili casi trascorre dalla coscia alla natica, e ai lombi del medesimo lato, o alle stesse parti dell'altro lato, alla gamba, ed al piede. Allora l'ammalata ha una maggiore interna, e universale agitazione, la respirazione affannata, mal di capo, e la febbre più forte, i quali fintomi appoco appoco diminuiscono, e infine cessano, terminata la metastasi. Accade qualche volta, che l'umore si ripartisce ad amendue gli articoli, o si spande per tutto il corpo.

metastasi 🗸 ve questa si faccia, e come si conoíca.

226. Sul principio degl' inzuppamenti lattei bisogna tentarne la risoluzione, la quale in quelli, che hanno avuto origine dalla suppressione del latte nelle mammelle (221), più facilmente fi ottiene, richiamando il latte ad esse mammelle. Conviene trar fangue dal braccio, o dal piede fecondo

Cura interna per ottenerne la rifoluzione :

lo stato presente dell'ammalata; anzi il celebre Puzos in una sua dissertazione dei tumori prodotti dal latte (a) vuole, che le cavate di sangue siano frequenti, e successive, parendo che in esse egli mettesse tutta la siducia per risolverli. Beverà l'ammalata decozione, o acqua distillata di parietaria, di malva, di viole, e fimili, aggiungendovi qualche cucchiajo di sciroppo delle cinque radici aperitive, e XII. grani di sal fisso di tartaro, supposto però che non vi sia molta insiammazione, ne orgasmo, ed in simile caso si terrà l'ammalata sufficientemente coperta in letto, e le si proccurerà un leggiero, e continuo sudore, facendole anco bevere alcuna dose di acqua distillata di siori di sambuco. e di ninfea.

Cura efter-

227. Alle parti si faranno fomentazioni ammollitive, e risolventi, e vi si applicheranno cataplasmi di pane, e di latte con morli d'uova, ed olio di gigli bianchi, oppure con zafferano, se non vi fosse molto dolore, oppure quelli fatti colle quattro farine risolventi, e colla de-cozione di fiori di sambuco, e di camomilla. In fimile caso il Puzos propone medesimamente le unzioni col sapone molle, e butiro fresco mescolati insieme, o coll'olio di palma, o di mandorle dolci mescolato con quello delle amare, ai quali si aggiungano ( supposto però, che niente vi sia d'instammazione ) alcune gocce di Spirito volatile di sal ammoniaco: infine, movendofi la risoluzione, si potranno usare quegli stillicidi, bagni, o lavande del LEVRET, che abbiamo proposto per le mammelle (130). Ma que' due celebri Maestri vogliono, che la risoluzione si

<sup>(</sup>a) Vedasi il suo Traité des accouchemens &c. avec trois mémoires sur les dépôts laiteux. Paris 1759. in 4.

ajuti con leggieri purganti, quando essa abbia una volta cominciato, e perciò dapprincipio si daranno due, o tre clisteri al giorno semplicemente ammollitivi, quindi qualche purgante per

bocca, come il sale de duobus ec.

218. Malgrado l'uso de' risolventi (227). niente di manco alcune volte cresce l'interna agitazione, fuccede una maggiore elevazione fuppuraziodel polso, ed un forte rigore di freddo, come se fosse di una febbre intermittente, ed allora maggiormente duole, e gonfia la parte, perchè

vi si determina la fuppurazione.

229. Qualche volta la materia di tali tumori suppurati si evacua per la via delle orine, e delle fecce, come ne abbiamo alcuni esempj, la qual evacuazione non di rado continua per settimane, e mesi con sebbri irregolari; nel qual caso convengono le decozioni vulnerarie, e i balsamici aggiunti ai clisteri. Ma se ciò non accade, quando il tumore è stato fisso, e limitato attorno il pelvi, la suppurazione suole presentarsi esternamente all' inguine o sotto il legamento del FALLOPPIA più insù, o più ingiù, ma sempre in que' contorni con un tumore lungo non molto elevato, fotto cui affai fovente si sente piuttosto un inzuppamento edematoso, che la fluidità di un travasamento: quivi si debbono applicare cataplasmi quanto più si potrà ammollitivi, e suppuranti, e, quando i segni della suppurazione fatta siano evidenti, qui pure dovrassi aprire. Non sempre però tanto si attenua la cute, nè si estende tanto ingiù il tumore, che non vi resti dubbio sulla presenza concioffiachè la materia del della marcia. sumore trovandofi nella cellulofità del peritoneo sotto i muscoli dell' addomine, questi non possono cedere, come cede il peritoneo (217); conseguentemente oscura, e profondissima n'è la

Segni, che indicano farfene

Per quali strade talvolta la natura ne evacui la marcia.

Segni della Suppurazi**one** fatte .

Quando, e dove fi debba farne l'apertura d : fluttuazione, se pure alcuna se ne può sentire: tutto al più, dissi, agl' integumenti si osserva -qualche poco di edema con qualche striscia, o marca roffigna, ficchè si dee piuttosto co'segni ruzionali della suppurazione conghieturarne il raccoglimento, combinando infieme i fintomi preceduti, ed i presenti, e poscia con certa ragionata fiducia facendo l'apertura, fi vede da un piccolo tumore uscire per lo più tanta quantità di marcia, che ben dimostra venire da lungi. Non di rado la suppurazione tarda moltissimo a prodursi, che bisogna aspettarla con grande fastidio e settimane, e mesi; ma quanto più presto si produce, essa è sempre meno putrida. Dall'apertura di un tale ascesso io ho veduto uscire puro latte con grumi veramente caseofi (a) .

<sup>(</sup>a) Non sempre gli ascessi, che si fanno nella fossa iliaca nelle puerpere, sono prodotti dal latte; qualche volta dipendono dalle contusioni fatte in quella parte dalle ruvide mani degli ostetricanti, i quali ne' parti difficili, mentre le introducono nell' utero, o per mettere nella natural fituazione il feto, o per istaccare la placenta, non di rado oltre le pareti dell' utero ammaccano le parti, sulle quali esso appoggia, quali sono in quello stato i muscoli psoas, ed iliaco interno coll'abbondante membrana adiposa, che li copre. Dall'espertissimo Chirurgo signor Giambatista Verna, che è con onore più d'una volta citato dal Bertrandi nelle sue Dissertazioni de hépate, & oculo, fonoci state graziosamente comunicate moltissime osservazioni di Chirurgia fatte dal fuo Bisavolo Alberto Verna, di cui faremo a suo luogo uso, tre delle quali si aggirano intorno ascessi fattifi nella faccia interna delle ossa iliache per fiarili contusioni. La prima narra di una puerpera, a cui, dopo gravi dolori di ventre, più forti però nella regione iliaca destra, sopraggiunsero dejezioni purulente, e fetide, per le quali emaciata mori quattro mesi dopo. Nel cadavere si trovarono quasi tutt

230. L'ascesso aperto si medicherà secondo Cura interil metodo ordinario: si darà una situazione alla parte, per cui le marce colino più facilmente, e si continueranno i rimedi vulnerari interni asasso. .(229), finche sia esausto il sonte della suppu-. razione, il quale alcune volte dura moltissimo sino a ridurre al marasmo le misere donne,

na, ed efteraperto l'

te le intestina livide, e tra le loro anfrattuosità molta marcia. Questa veniva da un'apertura fattasi al peritoneo dirimpetto alla fossa iliaca di quel lato, la qual fossa conteneva un ampio ascesso, che stendevasi verso i reni quasi sino al diaframma. Tutta la cellulare di quelle parti era consunta, e nudi vedevansi i muscoli psoas, ed iliaco, e il cordone de' vasi iliaci: l'accennata apertura del peritoneo comunicava con un foro fattofi alla proffima parte del colon, onde si spiegano quelle lunghe dejezioni purulente. Hoc exemplo (riflette molto a proposito l'avveduto Osservatore) aliisque quamplurimis edotti, ubi perfectae suppurationis signa habeantur, ferro viam esse exterius aperiendam sentimus, duos, vel tres digitos transversos supra inguen, & infra cristam ossis ilii, incisionem, quantum satis sit, profundam instituendo. Multis quidem (soggiunge egli) operatio isla imprudens, ac prope temeraria videri potest, propter periculum intessina perforandi, quod tamen periculum vitari potest, si instrumentum instituendæ aperturæ destinatum aliquantisper ilii ossi adhærendo introducatur, ita tamen ut iliacus muscu-Tus eidem offi accumbens non lædatur. Collecti enim humores inter perisonaum, & membranas (cioè nel tessu-to cellulare, e sorse anche sotto la guaina di quel muscolo) vel inter membranas, & musculum, idem peritonaum, adeoque proxima intestina ab iliaco musculo separant, atque abducunt, ut ferro transitus tuto concedatur; e lo prova colle due seguenti osservazioni, nelle quali fatta a tempo nel luogo indicato l'apertura riesci felice. Nota inoltre, che gli ascessi in quelle parti negli uomini non meno, che nelle donne qualche volta procedono dalla stanchezza de' lunghi viaggi, o da violente corse, e ne adduce due osservazioni: i malati curati in quel modo in pose tempo perfetramente guarirono.

# 156 CANCRENA IN GENERALE:

le quali ne possono poi morire, potendosi internamente produrre la cancrena, o lo sfacele (232), se pure non si fa una metastasi mortale. 231. Gli ascessi, che si fanno lungo la coscia, o alla gamba si debbono curare nello stesso modo: questi sogliono essere di minore utilità, perchè pel loro mezzo non sono per lo più abbastanza alleggerite le parti interne, la lessone delle quali è molto più pericolosa.

latei lungo l'articolo inferiore sono meno utili, e perchè.

Gli afceffi

Vedasi alla sine di questo Tomo la nota \*

# DEI TUMORI CALDI

ORDINE IV.;

Che tratta della Cancrena;

Definizione della cancrena,

Dello sfa-

232. LA cancrena, altrimenti chiamata mortificazione, o necrofi, è la perfetta estinzione di ogni forza organica in alcuna parte del corpo animale: la quale, quando occupa tutta la massa di un membro, allora chiamasi sfacelo (a).

<sup>(</sup>a) La parola Greca gangraina viene dal verbo graino, comedo, depascor, onde alla lettera significherebbe piuttosto un' ulcera depascente, che la mortiscazione di una parte; ma le si è dato tal nome, perchè ordinariamente, quando si mette in un membro, suole stendersi, e sar progressi nelle prossime parti. Il vocabolo necrosis, che viene dal verbo necroo, mortisco, interimo, corrisponde appuntino all'italiano mortiscazione. Sphaeolos poi, ovvero sphaeolismos viene dal verbo sphaeo, che significa ammazzare, mettere a morte; dal che si vede, che queste tre voci hanno appress' appoco la medesima sorza. Gli Antichi però sotto il nome di cancrena intendes.

233. La cancrena è la pessima terminazione Distingione de' tumori (13), delle ferite, e delle ulcere; nè della caneresempre le parti, quando si cancrenano, sono tumefatte; quindi fu fatta la divisione della cancrena in umida, e in secca. In quella le parti precedentemente tumefatte sono conseguentemente inzuppate di alcun umore, e prima di cancrenarsi ancor più gonfiarono: in questa la parte è piuttosto secca, arida, ed emaciata. Nelle cancrene umide suole prestamente accadere la dissoluzione putrida degli umori, perchè tali cancrene sogliono succedere agl'impetuofi muovimenti, che hanno prima infiammata la parte, e predisposta quella dissoluzione: nelle secche manca per l'ordinario dapprincipio tale dissoluzione.

234. Le cagioni della cancrena possono essere esterne, ed interne. Tra le prime si contano le gravi contusioni, le ligature strettissime, l'aria freddissima, l'applicazione de'corpi agghiacciati, le ferite avvelenate, e quelle, a cui sopraggiunge, per ragione della struttura della parte. la infiammazione suffocativa, le forti compressioni, gli astringenti repercussivi, gli oleosi, e soprattutto i rancidi, e tutt'i rimedj acri, stimolanti, o corrofivi applicati sulle infiammazioni, il lungo, e costante decubito sopra di alcuna parte, le scottature, e simili.

· Cagioni efterne della cancrena,

vano comunemente la mortificazione incominciante, che era ancor capace di guarigione, e sotto quello di' necrosi, o di sfacelo, e i Latini sotto quello di sideratio la mortificazione perfetta di una parte, che non ammetteva più altro rimedio, che l'amputazione. Il Latinissimo Celso, come si può vedere dal cap. 26. n. 31. del lib. v., e da altri luoghi ancora, chiama la cancrena, e lo sfacelo era gangræna, ora cancer,

Interne :

235. Le interne possono essere gli eccessivi muovimenti d'insiammazione, l'acre puirefaciente costituzione degli umori, come si osserva nelle sebbri maligne, nel vajuolo, nello scorbuto, nelle rispole maligne (161), nelle assezioni cancrenose, la putrida spontanea dissoluzione degli umori ristagnanti, i veleni, l'atonia, la rigidità, la compressione de vasi, o nervi maggiori. L'intensità delle quali cagioni, e la perseveranza possono sempre fare temere la cancrena, s'essa non è ancor satta, ed accelerarne il progresso sino allo ssacelo (232), se ha una volta incominciato, quantunque vi si oppongano i migliori rimedi, come dimostreremo a suo luogo (238., e seg.).

Le cancrene umide fi fanno talvolta. con fomma prestezza, e quando.

236. Sonvi sancrene, che si fanno quasi instantaneamente; non che si possano impedire di passare in sfacelo, massime quelle, che da una cagione maligna, velenosa, e deleteria procedono, come si osserva ne' carbonculli maligni (177), o pestilenziali, nelle parotidi suffocative (102), nel fommo grado dello scorbuto, nel furore delle febbri maligne, vajolose (235), e fimili; in queste cancrene però sempre precedono i fintomi dell'inzuppamento, e de'la suffocazione, onde sono cancrene umide (233). Allo incontrario le cancrene secche ( ibid. ) si fanno quafi sempre appoco appoco, che appena il malato se ne accorge, e da minime parti principiando, lentissimamente procedono: alcune voite però alla cancrena secca succede l'umida, e in questo caso i progressi della prima sono più celeri.

Le ferche fifanno lentamente.

### Della Cancrena umida

### S. I.

227. Il celebre QUESNAY (4) ha compresa la cancrena umida (233) sotto i seguenti nove della cancre capi, i quali sono per lo più le cagioni congiunze, o i modi fisici, secondo i quali le parti. possono eslere affette, perchè si cancrenino, cioè infiammazione, strangolamento, infeltrazione, consussone, stupefazione, morsi di bestie velenose, putrefazione, congelazione, e scottatura.

238. Quando si fa la cancrena per insiammazione, diminuiscono, e infine cessano i suoi zione. fintomi, il tumore s'abbassa, la parte diventa fredda, e stupida, senza moto, e senza senso, cinericcia, pallida, fosca, livida, e nera, molle, ricascante, e spugnosa, che non si rialza dopo la compressione, sorgono pustule, e vesciche piene d'un icore linfatico, giallognolo, o rossigno, quelle pustule, e quelle vesciche infine si screpolano, e n'esce quell'icore, che tramanda un puzzore cadaverico (22).

239. Trattando del flemmone suffocativo abbiamo infegnato, come dobbiamo opporci alla violenza di que' fintomi, che possono determi- Cura copical narne la cancrena (88., 89., e 90.); ma se finalmente i vasi hanno perduta ogni azione, e la parte è veramente mortificata ne' suoi termini, le scarificazioni bisogna farle per tutta l' altezza della mortificazione, finchè il malato dia segno di sentirle, e n'esca il sangue vivo. Fatte le scarificazioni, si laverà, o somenterà quella parte con acqua calda, o col vino bianco, in cui siasi disciolto sal comune, sal gemma,

Segni della cancrena pes . infiamma-

<sup>(</sup>a) Traité de la gangrene à Paris 1764. in 12.

fale ammoniaco, o borace; oppure si facciano lavande collo spirito di vino, e si continuino le fomentazioni con decozioni di piante aromatiche, quali sono, oltre quelle, che allora abbiamo accennate (90), la centaurea minore, il cardo santo, il dittamo, il maro ec., cotte nel vino bianco, aggiungendovi mirra, aloe, e spirito di vino, per avvivare il rimedio, e renderlo più essicace, onde possa resistere alla putresazione, che va inducendos nella parte. Nella stessa decozione di quelle piante si possono fare medesimamente cataplasmi colle farine di save, di linseme, di meliloto ec.

L'infiammazione femplice raramente è causa della cancrena: quasi sempre vi è congiunto il vizio degli umori,

Segni, che dimostrano quel vizio.

Cura inter-

240. Egli è molto difficile, che un' infiammazione semplice, quantunque grande, termini in cancrena, se gli umori non sono pervertiti, e divenuti di una natura acre, e putrefaciente. In fatti si osserva in pratica, che la cancrena in simili casi infiammatorj si sa con tanta prestezza, che pare procedere come da un contagio velenoso: fi perde quasi in un attimo tutta la sensitività della parte, ed il malato, dopo il tormento di un violentissimo orgasmo. rimane debole, e spossato, impallidisce, e sostre alcuna fincope, perde sempreppiù le forze, e ha un polso languido, e picciolissimo. I rimedi semplicemente antiflogistici hanno poco, o nulla giovato, e si vede, che le ripetute cavate di sangue surono piuttosto perniciose, avendo accelerata la cancrena, perchè hanno dato uno spazio maggiore alla dissoluzione putrida ( 123., 170., 182.). Conviene piuttosto allora ravvivare le forze vitali cogli alessifarmaci, e diaforetici, come sono le decozioni di scorsonera, di contrajerva, di scordio, di cardo benedetto, di sambuco, di camomilla, la decozione della raspatura del corno di cervo, la confezione alkermes, la giacintina, il bezgar, la triaca, il mitri-

mitridato sciolti nell'acqua alessiteria, in quella di turto cedro, di menta spiritosa, o tridcale . Altre cautele per la cura della parte accenne-

zemo qui appresso (250., e seg.).

241. Lo *strangolamento* dipende o da un'apa plicazione esteriore, come sono le forti legature: prodotta da o dallo stiramento, e somma distrazione di aleuna parte membranosa, aponeurotica, tendinosa, o nervosa. Lo ftrangolamento, che arresta il sangue nelle vene, può produrre un inzuppamento prodigioso anco senza infiammazione ragguardevole. Lo Swieten racconta (a) di un giovane briaco, a cui, essendosi addormentato ritto in piede, ed appoggiato co' gomiti sopra una finestra, le legaccie delle calzette troppo strette talmente avevano compresse le vene, che svegliatosi il mattino cadette per terra, come se gli fossero mancati i piedi, le gambe erano molto gonfie, e fenza grave infiammazione in pochi giorni gli fi cancrenarono fino alle cosce, onde dovette morire. Ognuno sente, che tali strangolamenti si debbono tostamente togliere, ravvivare con fregagioni, e cogli *spiritosi* l'azione delle parti, quando però vi fia solamente quello stupore, che dipende dall'inerzia dell'organo, e non ancora la putrefazione degli umori; che allora fi dovrebbero fare le scarificazioni, come per la cancrena prodotta da infiammazione maligna, e suffocativa (239., 240.).

242. Gli strangolamenti, che succedono per ragione della struttura delle parti assette (241), sogliono essi pure promuovere la cancrena,

Cancrena ftrangola-

Offervazios ne dello SWIETEN.

Cura della prodotta da Strangolamenti esterio-

In qual modo fi faccia la cancrena per istrangolamenti dipendenti dalla struttura della parte.

BERTRANDI TUM, TOM, I.

<sup>(</sup>a) Ne' suoi Commentari agli aforismi del BOERAAVE de cognoscendis, & curandis morbis aphor. 422. tom. I. pag. 740. dell'edizione di Torino.

di una grave infiammazione, e di molto inzuppamento. Anzi alcune volte la infiammazione, che si fa nelle parti, ove sonvi aponeurosi, non produce una tumefazione apparente, che annunzi la cancrena, perchè questa si sa profondamente, prima che appaja agl' integumenti, sicche sovente i Cerusici ne restano sorpress. Non basta in questo caso di scaribcare quanto y'è di cancrenato, ma bisogna penetrare più lungi, cioè a quel luogo, dove pei principi di Anatomia fi può credere esservi la tensione della parte, che sa lo strangolamento, e quella recidere, come meglio dimostreremo nel Trattato delle ferise. Quella tensione bifogna principalmente togliere, e alcune volte basta un picciolo taglio al luogo preciso della medesima, perchè la cancrena tostamente si arresti, come appunto si arresta quella degl'intestini pigiati nell'anello, quando si screpolano, ficche, vuotandofi, non fiano più turgidi, e conseguentemente neppure strangolati. Dopo le punture dell'aponeurosi del bicipite nella cavata di sangue, basta, quando già comincia la cancrena all'avan-braccio, la recisione di quell' aponeurosi, per impedirne i progressi. Ma i lumi, disfi, dell' Anatomia debbono in simili casi

Come accas da la cancrena per infeltrazione.

Cura :

ficuramente togliere lo ftrangolamento. 243. La infeltrazione degli umori, che fi fa negl' inzuppamenti linfatici, produce, quando è arrivata al fommo grado, l'estinzione del movimento vitale, per la somma dilatazione de' vafi linfatici, e delle cellule; ficchè perdano la loro forza, la quale anco difficilmente fi potrebbe sostenere, essendo in queste malattie sempre debole, e infievolito il principio della vita in tutto il corpo, o almeno nella parte, Una leggieristima infiammaziono precede alla canq

determinare i luoghi, dove, tagliando, si possa

crend

egena, della quale meno si accorgono i malati segni : pel gran lentore, e freddezza, che già soffrivano. Secondo la maggior parte de' Maestri, in questo caso le scarificazioni non si debbono fare sopra l'escare cancrenose; conciossiachè vi fi potrebbe accelerare la dissoluzione putrida, cura: per cui essa cancrena dee maggiormente spandersi, ma si faranno piuttosto ne' prossimi luoghi, ed anco superfiziali, purchè per esse si possa evacuare parte di quella linfa, la quale forma l'inzuppamento. Sulla parte cancrenata fi debbono poi applicare filaccica intrife nell' acqua di calce, e sul resto del membro edematoso cataplasmi fatti colle farine risolventi cotte nell'ossimele, o nel vino colle polveri di quelle piante aromatiche, che qui sopra abbiamo annoverate (239). Poco, o nulla giovano le fomentazioni, perchè tosto si raffreddano pel continuo gocciolamento del fiero; perciò questi stessi cataplasmi si deono applicare piuttosto più caldi, che negli altri casi, ed assai spessi, acciocchè così presto non si raffreddino; se ne potrà medesimamente conservare il calore, applicando attorno il membro ampolle piene d' acqua bollente, tegole, o mattoni caldi, o sacchetti pieni di sabbia, o di cenere calda. Quanto suole gocciolare l'umore, altrettanto poi si vede la cancrena circoscritta, ed allora dalla circonferenza dell' escara scaturisce una materia purulenta, per cui quella incomincia a muoversi, e finalmente si separa ajutata dall' uso de' digestivi animati, come sarebbe l'unguento di stirace rimescolato con aloe, e mirra; ma quantunque la cancrena si spandesse, ed approfondasse, siate cautissimi nel fare, o nel ripetere le scarificazioni, che poi nulla, o poco giovano, anzi, come abbiamo già avvertito, piuttosto accelererebbono la dissoluzione putrida; L 2

e ficcome: per l'inféreia del movimento vitale; che in questi sasi occupa sempre una gran superficie, sovente, i malati muojono, potrebbe ad alcuni sembrare, che piuttosto per quelle scarificazioni si sosse dilatata la cancrena, e quindi accaduta la morte.

Attenzioni da averfi, quando la infiammazione cresce.

244. In questi casi si osserva anche, che quanto più la cancrena fi avanza, la infiammazione fi fa tanto maggiore nelle parti vicine ma però di un color rosso molto intenso, e con una tenfione, di cui non pareva capace quella parte, la quale prima forse era per l' inzuppamento linfatico molto molle, ed inerte, Giovano allora le fomentazioni fatte a que' luoghi colle decozioni di fiori di camomilla, di fambuco, e di lupini animate con po' poco di spirito di vino; difficiliffimamente però quella infiammazione si risolve, anzi piuttosto si cancrena, se tostamente non si eccita la suppurazione attorno l'escare: sono anche state provate utili in fimili casi le fomentazioni fatte colla decozione, o infusione di corteccia peruviana nel vino generoso bianco, o rosso, anzi se ne può applicare la polvere nelle screpolature dell'escare, o mescolarne coi digestivi.

245. Della cancrena, che può succedere alle gravi contusioni, o stupesazioni, e alle scottature tratteremo in Capitoli particolari delle serite, richiedendo essa diverse attenzioni, e cautele secondo la parte affetta, e la quantità della contusione, stupesazione, o scottatura, ed ivi anco parleremo della cancrena, que può avvenire alle

ferite avvelenate.

La cancrena prodotta da putrefazione è di tre spezie. 246. La cancrena prodotta da putrefazione come da causa antecedente, si può, secondo lo stesso QUESNAY (a) ridurre a ere spezie. La prima

(a) Lib. cit. chap. XX. pag. mihi 308,

prima dipende dalla dissoluzione putrida della massa degli umori, la quale si scorge in alcune cacochimie biliose, o scorbutiche, in alcune sebbri maligne con esantemi ec. Questa cancrena sopravviene con poco, o nessun dolore; pare piuttosto esservi un enfisema di color rosso vermiglio, e a certa distanza dilavato, simile a quello delle infiammazioni erisipelatose (158): l'infiammazione appoco appoco si fa più intensa, poi la parte diventa sempreppiù stupida, cinericcia, e livida, si screpola, e n'esce un umore tenue, rossigno, giallognolo, asfatto putrido. La generale diffoluzione putrida degli umori, fecondo le offervazioni del celebre LA-PEYRONIE (a), è ad un tale eccesso in questa spezie di cancrena, che sovente, facendosi scarificazioni. o altri tagli alla parte, succedono emorragie, le quali non possono arrestarsi, se non difficilmente, se pure si arrestano, il sangue non zampilla dalle arterie, ma continuamente gocciola, e inzuppa l'apparecchio, nè può rappigliarsi, e fare grumi. In fatti le stesse emorragie dal naso, dall'utero, dall' emorroidi, dalle gengive, le quali fogliono fuccedere alle affezioni scorbutiche, o cancerose in sommo grado, quasi sempre sono mortali.

non di rado produce la cancrena, è la suppurazione putrida, cioè quando negli ulceri virulenti, e cachoetici la materia putrida icorosa s'inseltra, e s'arresta nella spugnosità delle carni; per la qual cosa, facendosi pel soggiorno sempre più putrida, estingue infine colla sua forza setatica l'azione della parte. In simile caso l'inzuppa-

Prima spezie. Dissolut on putrida generale degli umori.

Segni di questa prima spezie.

Seconda
fpezie, suppurazione
putrida

L 3

<sup>(</sup>a) Appresso il Quesnay nel luogo poc'anzi ci-

· Segni di questa spesie di conpamento fi fa maggiore, l'ulcere fi dilata, e fi profonda per poi diventare affatto cancrenoso, le parti membranose, e cellulose fi distaccano a lembi, lasciando non di rado i muscoli, e i tendini nudi: quelli per la irritazione divengono tumidi, e quasi ensisematici, e quasi si desquamano, la parte all'intorno, e per lungo tratto si fa edematosa, istupidisce con freddo marmoreo, e sinalmente perde il moto, e il senso.

Terza spezie, congestioni putride.

248. La terza spezie dipende dalle congestioni putride, le quali si possono fare in alcuni tumori, come ne' cancrenosi, e ghiandolosi maligni, ove l'umore, divenuto sommamente acre, e settico, ha potuto distruggere gli organi della vita di quella parte. In fatti si sono vedute mammelle cancerose separarsi o intere, o a frammenti, corrose, e cancrenate per la forza settica di tale umore: Si possono aggiungere a questa spezie di putrefazione quelle, che dipendono da umori travafati, i quali spontaneamente si putrefanno, e putrefatti estinguono la forza organica delle parti, che occupano, il che succede alle grandi ecchimosi, alli travasamenti di sangue, di latte, di bile, di materie fecali, di orina in alcune cavità; conciossiachè gli umori sacilmente diventano viziofi, si putrefanno, e si scompongono, se non si muovono.

Propostico della prima (peric.

249. Quando la cancrena dipende dalla universale putrida dissoluzione degli umori (246), ella è quasi sempre mortale, e coll'amputazione del membro, se anco sosse possibile, i malati più prestamente muojono; l'arte medica non avendo sinora trovato alcun antisettico così essicace da poter ricomporre gli elementi del sangue. E perchè le scarificazioni alla parte sarebbero pericolose, preparandosi con esse un maggiore spazio al progresso della cancrena (243), doven-

Cure.

dovendoli anche temere quelle emorragie, che abbiamo sopraccennate (246), si dovrà piuttosto sperare ne rimedi interni alessifarmaci, ed antifeccici, che abbiamo già più volte lodati (240), e negli antiscorbutici i più efficaci, quando la diffoluzione fosse scorbutica, nel qual caso gli spiriti ardenti antiscorbutici, come quelli di coclearia, e di beccabonga, serviranno ad inzuppare l'escare cuntrenose, applicandovi poi alcuno di que' cataplasmi aromatici, che abbiamo dapprincipio proposti (239); imperciocche la putrefazione cancrenosa, fattasi una volta ch'essa è in una parte, essa è fisicamente sempre la stessa : da qualunque cagione sia prodotta. E' stato os- che volta servato, che le cancrene dipendenti da causte scorbutica, non di rado accadono coll'alleviamento della maggior parte degli altri tintomi dello scorbuto, come se fossero critiche, quantunque esse divengano poi mortali pel loro progresso, il quale non si può impedire, cancrenandosi le parti a proporzione della flussione, che ad esse si fa dell'umore settico.

250. Se dalla suppurazione putrida, quale l' abbiamo spiegata (247., 248.), è stata prodotta la cancrena, anche difficilissimamente si arresta, se co'vulnerarj, e cogli antisettici non si giunge a correggerne il principio, che per lo più è già fatto universale per l'afforbimento nella massa di quel putrido umore stagnante. Gli Autori dicono, che in questo caso bisogna non solamente recidere, e separare le carni cancrenate, ma anco quelle, le quali sono ulcerose, e ritengono nella loro spugnosità i liquori putridi, i quali coll'accumularsi sempre prù imputridiscono. Si difenderanno le prossime carni ancor vive co' topici antiputridi, e co' balfami più efficaci, tra' quali hanno maggiori Iodi l' olio di trementina, o la dissoluzione di pece liquida fatta nella decozione d'assenzio, d'ori-

Le cancrens fono qualcritiche, mortali -

Pronostico della feconda, e terza spezie.

Mediante la separazione dell' efcare.

Cogli antifertici balfamici; e aromatici ,

gano, di ruta, di pulegio, e fimili, in cui a inzuppino filaccica, o compresse. Sanno gli Anatomici, che con questi liquori si conservano persino le parti de' cadaveri.

Cogli antifettici falini.

Cogli esca-

251. Se con tali rimedj (250) la cancrena non si arresta, altri propongono gli antisettici salini, come il salmarino, il nitro, o il sale ammoniaco, co' quali abbondantemente s'asperga la parte cancrenata, ed infine ricorrono agli escarotici, quali sono gli spiriti di sale, di nitro, di vetriuolo, e di zolfo, l'acqua fagedenica, il butiro d'antimonio, i mercuriali corrosivi, e simili. « Ma mi pare ( dice il sopralodato » QUESNAY (a)), che in questo caso gli esca-» rotici debbano essere preferiti; imperciocchè » essi non solamente sono specificamente propri » contro la putrefazione, ma lasciano un'escara, » che copre le parti vive, sinocchè essa si separi con una lodevole suppurazione, e ci avvertisce, che, se, invece di una suppurazione purulenta, non vi gocciolasse se non una materia saniosa, egli è segno, che gli escarotici non hanno penetrato tutte le carni cattive. e putride, perlaqualcosa sia necessario di ripeterne l'applicazione, finchè giungano a quelle carni, le quali sole possono dare quella lodevole suppurazione. Ma nota nello stesso tempo, che i corrosivi, rodendo, e distacçando le carni morte, scoprono le vive, le quali sono abbeverate da cattivi sughi, e l'espongono alla impressione dell' aria, prima che sia stabilita la suppurazione, donde la mortificazione si avanza, e sa progressi, soggiungendo, esser osservazione frequente, che nelle cancrene dipendenti da vizio d' umore quanto più si scoprono le carni vive, tanto

Rificfioni
contraddittorie del
QUESNAY
circa l'ufo
degli efcarotici, e corrofivi

<sup>(</sup>a) Traité de la gangrene chap, XXI. pag. mihi 316.

tanto più se ne facilita la dilatazione, perlaqualcosa, dic' egli " « gli Antichi usavano il fuoco » o l'olio bollente per cauterizzare le ulcere » cancrenose ».

252. Dobbiam maravigliarci, che l' Autore stesso faccia questa giustissima rislessione, dopo aver poco prima proposti gli escarotici, i quali agiscono nel modo stesso, che i corrosivi. Eppure, malgrado quel pericolo di esporre col loro uso le carni vive al contatto dell'aria, e alla più pronta mortificazione (254), l'uso degli escarotici è pressocche universale, su quel principio, che fi debba tostamente separare il corrotto, acciocche non si guasti il sano. Ella è Argomenti cosa certa, ed indubitata, che, se la cancrena è stata prodotta da cagione esterna, sarà più prestamente terminata coll'uso delle scarificazioni, e degli escarotici; ma qual profitto se ne può sperare, quando essa cancrena dipenda dalla tabe senile, da mancanza di nutrimento, da affezione scorbutica, artritica, venerea, o da qualunque altra caeochimia, primacche essa sia stata corretta, perchè si possa credere anco terminata la cagione della canstena? La ragione, e la sperienza ci dimostrano, che, quando in una parte si è fatta la cancrena, tosto si limita, e fi circofcrive, se gli umori abbiano riacquistato la loro balfamica natura, e i folidi la loro forza. Si sono vedute gambe, e braccia separarsi intiere dal tronco, lasciando un' ulcera schietta e pura, allorchè era cessata la cagione della cancrena; quello è il tempo, in cui conviene separare le putride, e morte carni, o amputare il membro, la cui struttura organica fosse irreparabilmente distrutta, nè la vita del tutto si potesse altrimenti conservare. Non si può negare, che l'umore virulento debba irritare le fibre contigue delle parti vive; ma sarà forse minore

contro l' abuso degli esearotici nelle cancrene prodotte causa interminore l'irritamento, che produrranno que' rimedi stimolanti, acidi, acri, e corrosivi? Si
dovrà sorse temere l'assorbimento dell'amore
settico, se tutta la massa degli umori è anco
essa putrida? Bisogna, che questa cessi, altrimenti il progresso della cancrena, e la morte
potranno alcune volte essere creduti gli esserti
delle intempestive scarificazioni, o amputazioni,
o de' corrosivi, e caustici.

Altri ricavati dai Commenti dello SWIE-TEN agli aforifmi del BOERAA-VE.

253. Egli è dunque certissimo, che la separazione delle sostanze morte, nella maggior parte delle cancrene critiche, dee farsi dalla natura (252): « homini quinquagenario ( racconta lo " SWIETEN (a)) in febre acuta continua unjus » noctis spatio siderabatur extrema pars pedis. » & postea decidebat, homine tamen superstite » manente. Simul ac enim »morbi malignitas » hanc partem occupaverat, cessabat sebris, & » redibat reliquo corpori- sanitas». Ma perché fiate maggiormente convinti del pericolo, che vi può essere di scarificare, amputare, e cauterizzare le parti, prima, che la canorena sia limitata, e terminata, siami permesso di rapportarvi il ragionamento dello stesso SWIETEN: nè ci parrà d'aver perduto il tempo nell'accumular ragioni contro una tal pratica, la quale è divenuta troppo comune: « sempre si osserva » (dice egli (b)), quando le forze vitali sono » valide, che in quel luogo, dove la crosta » cancrenosa tocca le parti vive, vi nasce un » rossore, ed infiammazione, perchè gli umori » portati dai vafi vivi fono obbligati di arre-» starsi in quel confine del vivo. e del morto. non

(b) Pag. 788. di detto primo Tomo

<sup>(</sup>a) Commentar. in BOERHAAYE aphorismos de cognoscendis, et curandis morbis aphor. 253. tom. I. pag. 412., & 749.

non potendo altrimenti passare per la crosta » cancrenosa: nè quella infiammazione può faw cilmente risolversi, perchè non si possono » disserrare le estremità di que' vasi ostrutti : » conseguentemente essa pure dovrà o cancre-» narsi, o suppurare. L'arte dunque dee piut-» tosto proccurarne la suppurazione: euperciò » le forze vitali deono regolarfi in tal modo. » che fiano maggiori, che nello stato sano, » ma non eccessive: gli umori si dovranno » attemperare, e cogli antisettici correggere la » loro, putrefazione. Allora per la continua » impulsione de'liquori, i quali scorreranno pei » vasi vivi sino al luogo cancrenoso, appoco » appoco si sciorranno i lati de' vasi, e si se-» parerà la parte viva dalla morta, forgendo » da quella la suppurazione, ed è allora, che, » non essendo la parte cancrenosa, e morta più " irrigata dai liquori vitali, ed essendosi la loro ,, parte più sottile svaporata pel calore dell'aria, " e delle parti vicine vive (le quali anco per " la loro contrattilità se ne possono separare), ", fi farà una rima, o un solco, per cui la ,, parte cancrenata farà perfettamente divifa dalla ,, viva, nè vi sarà più pericolo, che la cancrena , faccia progresso. In fine ammollita, e sciolta , l'escara per la suppurazione, si potrà sepa-,, rare senza violenza, o fare l'intera amputa-,, zione del membro, se fosse necessaria, ed ,, inevitabile: qui plus hic fapere voluerunt , ( segue lo stesso Autore ), putantes, quod ", fecando, urendo, corrodendo possent ci-, tius perficere hanc separationem mortui gangrænofi a vivis partibus, erraverunt certe; , omnibus enim his modis vel relinquitur pars 🚤 mortui 🕻 vel una cum mortuis destruuntur ,, viva

,, viva vicina". Il LA-MOTTE (a) proccurò di stabilire questa dottrina con osservazioni convincentissime; vedete tra le altre la osservazione 298., e le quattro seguenti, ove condanna sortissimamente quella cattiva pratica, che gli era stata insegnata a Parigi, di voler separare con troppi solleciti tagli le parti cancrenate, primachè la cancrena sia terminata.

A che poffano fervire le leggiere fearificazioni.

Sembra, che gli stessi antifettici non troppo convengano, e perchè.

254. E' però vero, che alcune volte le scarificazioni sulle parti morte fatte con cautela, e senza offendere le vive, possono giovare, per dar uscita ai cattivi umori, che vi si trattengono (243), o per far più facilmente infinuare i rimedj antisettici, se pure da questi si può sperare alcun vantaggio, essendo anch' essi da alcuni Autori fortemente riprovati come dissecanti in questi casi, ne' quali, come si è detto (252), si dee aspettare la separazione del cancrenoso da una suppurazione veramente purulenta, la quale con tali rimedi potrebbe forse essere ritardata, o impedita. Antonio BENEVOLI nella offervazione XVI. intitolata di diverse cancrene in una coscia da esso con facilità separate (b), lasciò scritto come segue: "comeche a torre la siccità, ed ,, a temperare l'adustione, e l'acrimonia (c) cosa

(a) Traité complet des opérations de Chirurgie tom. 111.

pag. 335. 6 suiv.

(b) Pag. 141. della sua eccellente, ma ormai divenuta troppo rara Opera, che ha per titolo: Dissertazioni sovra l'origine dell'ernia intestinale, intorno alla più frequente cagione dell'iscuria, e sopra il leucoma, aggiuntevi quaranta osservazioni, tre delle quali sulla rachitide, e le alire in diversi casi di Chirurgia. In Firenze 1747. in 4.

<sup>(</sup>c) Ciò si riferisce alla natura delle cancrene, che fanno il soggetto di questa offervazione. "Compara, vero (avea detto poc'anzi) nella parte interna, della cossia destra alcune macchie livide della lazz

non vi è più efficace dell'acqua tiepida, di ,, essa, ad esclusione di ogni altra fomenta, io " mi prevalsi. Anzi, per dire il vero, da qual-,, che anno in quà comunemente mi servo dell' , istessa, pura, e semplice acqua tiepida nelle ,, cancrene ancora di altra qualità, ed in molte ,, forte di piaghe, lavandole copiosamente con ", esta, e ponendovi sopra le fila, e le pezze ,, in quella bagnate, con esito felicissimo. E , veramente qual altro più efficace rimedio per ,, le cancrene anche umide dell'acqua comune ,, tiepida si trova, per rilassare la valida ten-,, fione, che si fa ne' vasi, acciò si accresca , la circolazione de'fluidi, e per isnervare l' , umor coagulante, cagioni amendue principali , della cancrena? Inoltre per mezzo dell'acqua , meglio fi porta via quella gran putredine, , che nella parte offesa si genera, la quale ,, colla sua cadaverica natura vieppiù l'offende. Certo si è, che l'acqua tutti questi buoni ", effetti produce, e tanto più agevolmente, e ,, ficuramente li produce, quanto ella è più pura, e meno mescolata con quelle sostanze, ,, che son contrarie all' innocente sua qualità,,.

Efficacia dell' acqua tiepida in fimili cafi. Offervazione del BE-NEVOLI.

ghezza di un giulio, le quali nel corso di pochi
giorni si manisestarono vere, benchè supericiali,
e cutanee cancrene, e fino in diciotto ne comparvero senza la minima tumesazione della parte,
mentre solo ne'luoghi da esse occupati si rendea,
la cute nera, e dura qual cuojo, o come se vi
fosse stato messo un qualche caustico. La natura
di queste cancrene sece supporre l'origin loro altra non essere stata, che una massima adustione,
o acrimonia de' liquidi, che inducesse una eccessiva siccità nella parte offesa, ed una insuperabile,
e valida increspatura dell'estremità de' vasi, che
terminavano nella cute, per cui, ivi rimanendo
sil sangue immobile, egli la cancreno, ed alla cancrena altresì condusse le di lui contigue parti."

Sin qui il BENEVOLI, configliando egli ancora, che per le stesse ragioni si faccia uso d'impiastro di natura simile, cioè di foglie di malva, e di viole coll'aggiunta di un po' di farina d'
orzo per legare inseme l'erbe. In somma pensate, che le parti putride, e cancrenose non si
possono in alcun modo ristorare, e quando la
cancrena sia giunta al suo termine, non se ne
potrà mai ottenere la separazione con minore
violenza, che quando sieno state ammollite
dalla suppurazione purulenta delle parti vive; e
con questa rissessione non vi parrà tanto stravagante il consiglio del BENEVOLI, il quale
ne' suoi tempi faceva l'onore, e la gloria della
Chirurgia di Toscana (a).

In quali cafi fi debba
abbandonare la feparazione
dell' escara
alla suppurazione, e in
quali debbasi proccurare coll'
arte.

255. Stabilita che fiasi la suppurazione, si dee badare a quelle parti, sulle quali l'escara è posta; imperciocchè se copre parti magre, le materie purulente sono il più sicuro strumento, acciocchè l'escara si separi senza accidenti, come abbiamo sin qui insinuato; ma se coprisse parti pingui, ed umide, quelle materie possono raccogliersi, ed insinuarsi ne' luoghi circonvicini con grave guastamento. Si sono vedute cancrene al perineo, le quali neglette hanno prodotti seni purulenti, che difficilmente si poterono riempiere (b); per la qual cosa in simili casi si dee con molti tagli dividere l'escara, e tostamente distaccare quelle parti, le quali già sosseno state sciolte dalla suppurazione, senza però ossendere le parti vive.

256.

(b) Vedasi l'Osservazione xv. dello stesso Benze Voli.

<sup>(</sup>a) Questo valente Cerusico, nato l'anno 1685. in un Castello del Ducato di Spoleto, esercitò con molto applauso la sua professione a Firenze, dove è morto l'anno 1756.

256. Quando la cancrena occupasse le natiche, ci avvertisce il QUESNAY (4) di non fare le scarificazioni, infino a tanto che la suppurazione cominci a farsi vedere alla circonferenza dell' escara, massime nelle grandi malattie, quando i malati debbono giacere supini; conciossiache l'escara è allora necessaria per difendere quelle carni vive, che copre: bisogna piuttosto lasciarla intera, acciocchè rimanga più uguale, anzi sarebbe medesimamente necessario di ritardarne la separazione, e d'impedirne la putrefazione coll'olio di trementina, o colla zintura di aloe, e di mirra, principalmente se il malato perdesse involontariamente le fecce, avvertendo però, che non diventasse troppo dura, onde potesse comprimere, ed offendere le carni vive, che vi sono sotto; e se vi fosse questo pericolo, si dovrebbe applicare l'unguento di stirace. Quando la natura promuovesse il distaccamento dell'escare, e già il malato fosse in migliore stato, si dovranno allora usare gli unguenti, che potessero maggiormente ammollire, come il balfamo dell' Arceo, l'unguento basilicone, e gli empiastri ammollisivi, coll'attenzione di tagliare le carni morte, quando dalla suppurazione fossero state maggiormente ammollite, e in gran parte distaccate, avvertendo però sempre di non iscoprire le vive.

257. Separata l'escara, non di rado vi rimane una fordida, e viscida sostanza cellulosa, la quale copre, e lascia appena travedere le. carni vive: convengono allora i digestivi ani- de, caduta mati, ai quali anco fi può aggiungere qualche blando cateretico, perchè più prestamente siafter-

Regole concernerti la cura delle cancrene, che si fanno alle natiche per decubito.

Cura efterna, ed incancrene umi-

<sup>(</sup>a) Lib. cit. partie 11. chap. 2. pag. mihi 396.

asterga. E perchè in fimile caso la parte è molle, e quasi sempre edematosa, si debbono usare cataplasmi risilventi, e corroboranti, come quello delle quattro farine con polveri delle piante aromatiche, le quali abbiamo da principio proposte (139), altrimenti ne potrebbe succedere una suppurazione colliquativa, a cui dovesse anco succombere il malato. Si prescriveranno dunque decozioni vulnerarie, ed opiate antisettiche, alle quali si può aggiungere la polvere di correccia Peruviana, che in questo caso principalmente giova, non essendo altrimenti tanto vero, che efficacemente impedisca i progressi della cancrena, quando questa non è ancora terminata. Giova anche di mescolarne co' digestivi, e fare bagnature della infusione della medesima nel vino bianco generoso. A dir vero però molto più utile fu provato, secondo le osservazioni del celebre RAMBY (a), l' elixir di vetriuolo, bevendone gocce a grata acidità nell'acqua semplice, o in quella di tutto cedro, di menta semplice, di foglie d'aranci, nella deeozione d'agrimonia, o d'iperico ec. Quando principii, o si abbia da temere quella dissoluzione putrida, che suole succedere ad alcune cancrene, altri lodano, come efficace rimedio antisettico, la dissoluzione di pece liquida fatta nell'acqua, o in una decozione vulneraria, ufata internamente, ed esternamente, como già abbiamo accennató (250).

Segni della congelazio-

258. Quando la cancrena è prodotta dal fredcancrena per do, le parti cominciano a impallidire, poi diventano rosse con dolore pungente accompagnato

<sup>(</sup>a) Nel suo Trattato delle ferite fatte da arme da fuoco, stampato per la prima volta in Inglese a Londra l'anno 1744. in 8., poi a Parigi 1760. in 8. tradotto in francese dal Desnonis.

gnato da molestissimo prurito: cresce poi il rossore, e si sa purpureo, quindi la parte diventa cinericcia, di color di piombo, e sinalmente nera, e sfacelata sino alle ossa, sicchè sovente si può con molta facilità distaccare. Sono soggette a questa spezie di cancrena principalmente le parti estreme del corpo, cioè le dita delle mani, e de' piedi, la punta del naso, i lobi degli orecchi, e qualche volta medesimamente la testa del pene.

» 259. Il calore del nostro corpo in istato di

Quali parti più vi fiano foggette.

» fanità, persino nella state fervida ( osserva » il più volte lodato SWIETEN (a) ) è mag-» giore del calore dell'aere ambiente, ficchè » debba essere acerrimo il freddo, per poterne » irrigidire col gelo le parti; e siccome, tutt' » altre cose uguali, il calore è naturalmente » minore nelle estreme parti del corpo, per-» chè la celerità del fangue è minore nelle » parti più distanti dal cuore, e in quelle, do-» ve i vafi sono più minuti, e tenui, quindi » si capisce, perchè gli effetti del gelo si fac-» ciano principalmente in quelle estreme parti, » che abbiamo nominate (258); e come il ge-» lo converte in rigide punte, e in soda massa » l'acqua, può parimenti irrigidire, ed asso-🤲 dare i nostri umori, che abbondano d'acqua, » donde ne verrà la loro perfetta stasi, cioè » la cancrena, nella quale però da principio » non vi farà la menoma dissoluzione putrida, » ma folamente l'inerzia delle parti organiche. » E conciossiachè allora le punte degli umori congelati fieno fisse in minimi, e delicatissi-» mi vasi, i quali sono anche dal gelo stesso

1

غا

Offervazioni fisiche dello Swie-TEN circa il modo, con cui i nostri umori fi congelano, e circa l'effetto del caldo, e del freddo nelle cancrene per congelas zione .

<sup>(</sup>a) Commentar. in BOERHAAVE aphorism. tom. L. aphor. 454. pag. 798.
BERTRANDI TUM. TOM. L. M

» dilatati ( perchè i liquori non fi congelano 🕽 » se non acquistando maggior volume), facil-» mente fi concepirà, che, se vengono messe » in movimento coll'applicazione di un fubi-» taneo calore, debbano col loro spartimento » rompere, lacerare, e distruggere i vasi, ne' » quali sono contenuti, come appunto si sciol-» gono, e si stemprano i frutti gelati, se s'im-» mergono nell' acqua calda, dappoiche quan-» do fiano in parte sciolte quelle punte conge-» late, e già si muovano, quelle, che non » faranno ancora state sciolte, faranno necessa-» riamente applicate, e'spinte contro le pareti » de' vasi, nelle quali s' impianteranno, pun-» gendole, e lacerandole: e siccome l'impeto » del liquore, che è spinto in avanti dalla » forza delle parti vive, accresca sempre più » l'urto, e l'impulso di quelle punte rigide, » ed acute contro gli ostacoli, questi dovran-» no rompersi, e conseguentemente distrugger-» si la loro struttura organica di maniera, che » non vi potrà poi essere altro rimedio, se » non se di proccurare la separazione delle parti » morte. Forse anco ciò succede ( nota lo » stesso Swieten ) perchè le particelle saline » de' nostri umori sciolte, e separate per la » congelazione, come si separano dall' acqua, » e si precipitano, allorche si congeta prima, » che siano ben rimescolate, pungano, e la-» cerino d'ogn'intorno. " Sia adunque, che l'acqua freddissima stringa a poco a poco i canali, che furono eccessivamente dilatati per la congelazione degli umori, e che accrescendone la forza colla sua fisica azione, proccuri il discioglimento degli umori, o spinga suori, come alcuni pretendono, quelle particelle, che hanno potuto produrne la congelazione, come pare dimostrato dalla osservazione dell'ILDANO,

che qui fotto rapporteremo (260), egli è certo, che l'acqua freddiffima, e le fregagioni colla neve, e col ghiaccio furono provate come fi-

curi rimedi.

,, 260. Se s'immergano nell'acqua freddissima ( scrive l' ILDANO nel suo Trattato della ,, cancrena cap. XIII. ) mele, o rape gelate, , vedrassi l'umor gelato, il quale conteneva-., no, essere quasi cacciato fuori, sicchè quelle 🔑 frutta ritornano alla loro pristina natura; ma 🕠 se s' immergano nell'acqua calda, o tepida, , immantinente trovanti fracide, e poco dopo ,, diventan nere, e imputridiscono. Quindi ", nella Livonia, nella Irlanda, nella Norve-,, gia, e negli altri Paesi settentrionali è costu-, me, quando si ritorna la sera a casa, di non , entrarvi, nè di presentarsi al suoco, o alla ,, stusa, se prima non si sono fregate le mani, , la punta del naso, e le orecchie colla neve, , anzi quando ritornano di viaggio, ed hanno ,, intirizzite, o gelate le mani, o i piedi, non , fi fanno pena, tosto che sono entrati in una 2, casa, d'immergere le parti gelate nell'acqua , fredda, o nella neve, come per riscaldarle. Narravit mihi ( segue l' istesso ILDANO ) vir quidam nobilis, & fide dignus, se, quum eas regiones peragraret, incidisse aliquando in viazorem secundum viam frigore rigidum, ac pene mortuum, quem plaustro suo impositum, quum deduxisset in diversorium, hospes illico demersit in frigidam: quo facto, undequaque ita erupit gelu, ut ipsius corpus ceu ferreo thorace conte-Aum conspiceretur. Tum quoque propinatum illi ajebat cyathum ampliorem hydromellitis, quo . illi ceu potu ordinario utuntur, addito pulvere cinnamomi, caryophillorum, & macis, unde sudor in lecto provocatus est, atque ita ægrum ad se rediisse, amissis dumtaxat manuum, & pe-M 2

Narrazione dell' ILDA-No circa il costume de' Popoli Settentrionali per guarire le cancrene prodotte dal gelo. dum extremis articulis. E chi di noi ancora non ha veduto tra la nostra gente, che le mani intirizzite, e torpide pel freddo si riscaldano, fregandole col ghiaccio, o colla neve, o immergendole nell'acqua fredda, e che allora possono sossirire il calore del suoco, il quale prima eccitava dolorosissime punture?

Quando convengano gli aromatiti efternamente, e i cordiali internamente.

261. Quando il malato non senta più alcun dolore, e la parte cominci a riscaldarsi, si faranno leggieri fregagioni con panni caldi, poi fomentazioni con decozione di piante aromatiche, come di rammerino, di lavendula, di bacche di lauro, e fimili. Alcuni propongono quale specifico il decotto di rape. Starà il malato ben coperto in letto, e gli si daranno bevande riscaldanti sudorifiche, come vino generoso, in cui abbiano bollito alcuni garofani, cannella, o mácis, o una dissoluzione di triaca, o di mitridato nell'acqua di cardo santo, o di sambuco. Sopra le parti gelate, onde mantenervi un calore moderato, si potramo mettere gl'intestini, i visceri, o la pelle di qualche animale ammazzato di fresco, colombi, o polli fpaccati vivi, o, ciocchè è più comodo, vesciche piene dell' accennata decozione, o della seguente lodata dal BARBETTE (a):

Rl. Scord., vincetoxic., rut. a manip. j., femin. nasture., urtic. a drach. iij., coque in s. q. vini albi generosi, et pro qualibet libra adde unc. j. spirit. vini.

Gio-

<sup>(</sup>a) Nella sua Chirurgia pubblicata, e accresciuta dal MANGETI con questo titolo: La pratique de Chirurgie enrichie, & augmentée de plusieurs remarques, & histoires. Lyon. 1693. in 12. 3. vol.

Giovano anco allora le unzioni con olio de Filosofi, di cera, di trementina, di semi d' orzica, e di nasturzio. 

262. I proposti rimedi convengono, quando pel freddo è solamente stata, pet così dire, scarificaçiosospesa l'azione organica delle parti agghiadate dal gelicidio; che se poi molta su l'intensità ni, ed interdel freddo, distrutta la loro sostanza organica. soffocate si sfacelano, indi si separano per la dissoluzione putrida, che finalmente vi accade, ed allora giovano gli antifettici, e i corroboranti anco esterni, avendo prima fatte le scarificazioni sulle parti veramente sfacelate, e moræ. L' HDANO (a) loda la seguente fomentazione:

Quando le ni, e gli antifettici ester-

Rl. Folior. laur., melis., rorismarin., rut., origan., scord., absynth. a manip. s., radic. vincetoxic., angelic. a unc. ij., coq. in vin. alb. generof. lib. vj. ad consumtionem quartæ partis.

Si useranno i digestivi più forti, ed animati, aggiungendovi qualche cateretico secondo la maggiore, o minore putrefazione.

263. Quando il freddo fuccede ad un gran calore, la cancrena si sa prestissimamente. Rac- si sa con conta il LAMOTTE Tomo III. pag. 384. d'un uomo, che nel mese di Luglio essendo discefo in un pozzo, per purgarlo, sentì tostamente un gran freddo, e nello stesso tempo un atrocissimo dolore al maggior dito del piede finistro, il quale in breve tempo si propagò fino ai malleoli, e in un'ora l'articolo fi trovò sfacelato fin oltre la sura, onde su neces-

La cancrena fomma preftezza,quando il freddo bruscamente al caldo.

<sup>(</sup>a) Nel luogo citato.

faria l'amputazione della gamba (a). A unz fanciulla nel mese della canicola, per avere immerse le mani nell'acqua fredda nel tempo, ch'ella aveva un'ardente sebre, si cancrena-rono sino al luogo, dov'erano state immerse, tutte, e due le mani, e dovette perdere alcune dita. Vedete l'ILDANO nel suo' Trattato della cancrena cap. IV.

# Della Cancrena secca.

## S. II.

Segni, cagioni, e modi diversi di procedere delle cancrene secche. 264. La cancrena secca è quella, che si sa, come abbiamo già detto (233), senza precedente, o attuale tumesazione della parte, anzi è accompagnata da una certa aridità, per cui essa dissiminate passa in una dissoluzione putrida (b). La parte comincia a diventar fredda, perchè diminuisce il movimento delle arterie, le quali prima si sono rinserrate: le carni poi restano morte senza senso, e senza nutrimento, e appena mortificate diventano più serme, e più resistenti ai tagli, che le carni vive, in una parola secche, e coriacee, quasi sempre però sono morte, prima che si secchino. Si sono qualche volta tagliati membri anco superiormente al luogo, che per la siccità vedevasi

<sup>(</sup>a) Ma con tutto ciò non si potè salvare la vita all'ammalato, perchè, come assai bene rissette il QUESNAY ( Traité de la gangrene partie 1. chap. XIX. pag. mihi 297.) l'amputazione è stata satta intempestivamente.

<sup>(</sup>b) L'aridità, che è il carattere distintivo di questo genere di cancrena, l'ha fatta da alcuni chiamaze aridura. Il SAUVAGES (Nosolog, method, tom. II. pag. mihi 623,) la chiama necrosis.

cancrenato, senza che i malati abbiano sentito alcun dolore; le carni non erano putrefatte, ma un di presso simili a quelle di un uomo recentemente morto, e non escirono, se non poche gocce di fangue nericcio. Secondo la cagione, che produce la cancrena, i malati sentono alcune volte alla parte, che si dee cancrenare, un calore urente, e ciò accade, quando la cancrena è prodotta da un umore caustico. e corrosivo; nulladimeno però, se si tocca la parte, in cui dicono sentire quel calore, essa trovasi già fredda. Altre volte provano un freddo dolorosissimo per la mordacità dell'umor setsico, il quale instantaneamente produce la cancrena, ed altre di queste cancrene si fanno a poco a poco, fenza dare alcun fentimento. principalmente quelle, che procedono da infufficienza di nutrimento, e per la debolezza delle forze vitali, come nella tabe senile, o per la debol forza organica di alcun ramo principale de' vasi sanguigni, che a poco a poco cresca per l'aumento di qualche tumore, da cui venga compresso, o perchè le sue tuniche diventino ossee, o altrimenti si serrino. Racconta il BOERAAVE di un giovane, a cui essendo stata tagliata l'arteria ascellare, il braccio divenne secco, ed arido, simile a quello di una mummia d' Egitto.

265. Egli è raro, che in queste cantrene preceda l'infiammazione, come non vi precede il sumore (264), o se pure qualche leggiere infiammazione precede, ella è di pochissima profondità, ed eresipelatosa con pochissimo tumore, poco dura, e passa così presto in cancrena, che non v'è da sperare quella suppurazione purulenta, che sola può terminare la cancrena, onde questa piuttosto si spande e si dilata: " Tale

M 4

Che fortz d' infiammazione preceda a queste cancrene, e in quali cir, Tale spezie d'insiammazione (dice il QUES-, NAY (a)) può paragonarsi a quella, che è , eccitata dall'applicazione di una pietra cau-, stica, la quale niente affatto corrisponde alla , violenza, con cui essa riduce in escara can-, crenosa le altre parti, che abbrucia; " e anco questa leggiere insiammazione accade solamente, quando la cancrena è prodotta da vizio degli umori, e non quando dipende da qualche disetto organico.

Segni caratterifici delle cancrene prodotte da difetto d'organo, e di quelle, che dipendono da vizio degli umori.

266. Quando la cancrena secca dipendente da qualche difetto organico va facendo progresso, i malati niente altro sentono alla parte, che un freddo, una gravezza, e stupidità, l'estensione della quale mostra l'estensione della cancrena stessa. Ma quando essa sia prodotta da vizio d'umori, il suo progresso meglio ancora si conosce da alcuni cerchi rossi, i quali si dilatano, e si spandono, e le parti per lo più diventano livide, e nericce, mentre che nelle cancrene prodotte per vizio d'organo quasi sempre rimangono pallide, e cinericce. Quelle alcune volte si fanno con una stupenda prestezza. Il Tulpio racconta (b) di una donna di settant' anni, a cui in una notte per una sebbre ardente si sece nero, ed arido tutto un braccio, come se fosse stato per molti mesi seccato al fole. Lo SCHENCHIO (c) parla di una

can-

<sup>(</sup>a) Traité de la gangrene partie sesonde chap. 1. pag. 325.

<sup>(</sup>b) Observat. medicar. lib. 111. cap. 48.
(b) Molti essendo gli Scrittori di questo nome, si parla qui di Gioanni Schenchio Dottor Medico nato a Fribourg l'anno 1531., e morto nel 1598. L'osservazione qui accennata trovasi nell'ampia sua Raccolta di osservazioni intitolata: Observationum medicarum, rararum, novarum, admirabilium, & monstruogiarum volumen, Francos. 1600, tom. 11. in 8.

cancrena, la quale rapidissimamente si propagò: avea cominciato da un dito del piede, ed in tre ore era pervenuta fino al ventre. Tali cancrene sono sovente accompagnate da un gran puzzore, e la dissoluzione putrida tosto, o tardi non manca di accadere. Che allo 'ncontrario le altre, le quali per difetto d'organo, o di nutrimento accadono, si fanno alcune volte con una lentezza altrettanto stupenda, quanto la prestezza di quelle. Il CAMERARIO narra (a) di una cancrena, che durò un anno prima di giungere dalle dita del piede fino al ginocchio; ed io ne vidi una, che durò diciassette mesi per giungere dal piede al ventre, ed un'altra, che. durò con progressi lentissimi ben per due anni.

267. Di rado si elevano vesciehette nella cancrena secca, ed essa tarà già divenuta profonda, e si sarà molio dilatata, quando poi se ne veggono sorgere alcune. Accade però qualche volta, che tutta l'epidermide si distacchi dalla cute senza formar vescichette, nè la pelle cangia sì tostamente di colore, la qual cosa principalmente si osserva in quelle cancrene, che sono prodotte da stupefazione, e da para-

268. Dalle cagioni sovraccennate (266) producenti le cancrene secche apparisce, ch' esse possono essere primitive, o essenziali, oppure consecutive a qualche altra malattia: quelle dipendono da una causa immediata mortificante, queste vengono conseguentemente all'apparato, ed al progresso di una qualche malattia, e possono essere critiche, o sintomatiche, secondo la mag-

Di rado si fanno fletene nelle can-

Loro diffinzione in primitive, e in consecutive.

<sup>(</sup>a) Nelle Efemeridi de' Curiosi della Natura Centuri VI. offervazione 82. .

Bellissima descrizione di fiffatte cancrene fatta da Antonio Beni-VIENI.

maggiore, o minore perversione degli umori. e più, o men gravi secondo la loro estensione, e secondo la parte, che occupano. Il costume, che hanno tali cancrene di fare progressi, quantunque i migliori rimedi si adoperino, è stato descritto da Antonio BENIVIENI Fiorentino, che visse nel XV. secolo (a): Qui ulcere nigro ( lasciò egli scritto nel libro de abditis morborum caussis osservazione LXXI.) quod gangrænam Graeci appellant, afficiuntur, si id a digito pedis incoporit, & patiens fuerit senex, vel ex his, quarum corpus mali habitus sit, celerius moriuntur. Incipit enim caro ipfa in ul-. cere paullatim nigrescere, & livens fieri, quin & arida interim, atque ficca, & curis circumjacens nigris impletur pustulis: tum & quæ proxima est, amisso sensu, livet, palletque, nec prius serpere id malum desinit, donec ossa etiam inficiat: quod si quidquid aridum est, & proximum quoque locum vel usque ad sanum prorsus excideris, revertitur tamen, & serpit.

Cancrena sceca prodotta dalla segala insertadello sperone. 269. Una cagione fingolare della cancrena fecca è il pane fatto colla segala infetta dello sperone, le cui spighe vengono più tumide, e più allungate delle sane (b). Questa cagione di

tal

<sup>(</sup>a) Poco sappiamo della vita di questo dotto Medico: si sa solamente, ch'egli è morto nel 1502., e che la sua Opera de abditis nonnullis, ac mirandis morborum, & santionum caussis è postuma, pubblicata a Firenze in 4. nel 1507. appresso Filippo Giunti per opera di Gerolamo Benivieni fratello dell' Autore.

<sup>(</sup>b) Questa malattia della segala, che viene pure, ma più di rado, al fromento, e ad altre piante graminee, è chiamata dai Francesi ergot, ou bled cornu, e dai Latini clavus, nè bisogna consonderla col carbone detto dai Latini ustilago, come sembra aver fatto il Sauvages nel luogo quì sopra citato. Le spighe attaccate dallo sperone allungano i loro grani in

tal cancrena è stata osservata nel sine del secolo paffato, nel principio di questo, e pochi anni fono nella Fiandra, e nella Normandia (a). Molti villani, dalle miserie forzati a nutrirsi di quel pane, ne morirono. Cominciano i malati a cadere in una grave lasfitudine, però senza sebbre, o altra agitazione interna, le estremità delle membra diventano stupide senza moto, e senza senso, pallide, e rugose; internamente in quelle parti sentono dolori atroci, i quali crescono maggiormente, se la parte si espone al calore, ma diminuiscono qualche poco, esponendole al freddo. A que' dolori alcune volte succede una leggiere infiammazione, ed un ardore urente, il quale instantaneamente si cangia in sentimento di un freddo marmoreo: quel dolore, se comincia dalle dita, si stende quindi al piede, alla gamba, ed anco alla coscia; da quelle della mano all'avan braccio, ed alla ipalla, e termina con una cancrena, che annerisce, e secca le parti fino a separarle dalle vive; sempre però precedono que' dolori, e ad alcuni è accaduto, che, levandofi i guanti, o le calzette, vi tro-

Segni di quelta can-

una spezie di corno, fatto da una sostanza sungosa assai dura, quasi cartilaginea: se ne sono veduti de' lunghi più di due pollici. All' opposto il carbone, detto volgarmente gran nero, riduce i granelli in una sinissima polvere nera, quasi simile a quella delle vescie di lupo.

<sup>(</sup>a) Circa la storia di questa malattia vedasi la dottissima Disserzione de' signori De Jussieu, Paulet, Saillant, & Abbé Tessier intitolata: Recherches sur le seu Saint-Antoine, inserita a pag. 260. del primo tomo de la Société Royale de Médécine, nella quale dimostrano, che il suoco di S. Antonio, e il suoco sacro, di cui parlano le croniche dei bassi secoli, era questa spezie di cancrena,

varono dentro alcune dita, le quali si erano separate senza la menoma sensazione. Mentre che a questo modo si cancrenano le gambe, o le braccia, non fentono altro male, fuorchè una leggierissima febbre nel tempo, che i dolori sono nella loro maggior violenza, e poco sudore stilla dalla fronte, e dalla regione epigastrica, quando i malati prendono qualche alimento caldo, nel rimanente dormono tranquillamente, nè di altro male fi lagnano. E' stato osservato, che questa cancrena accade negli anni piovosi, quando per la gran pioggia la segala, o anche il grano fanno spighe con quello sperone (a), dal quale è pervertita la qualità della farina: essa cancrena comincia tostamente dopo la messe, e finisce qualche mese dopo (b), e i poveri villani costretti per l'in-

(a) Nella Sologna, e in altre Province della Francia, che sono umide, e pantanose, frequenti sono le cancrene secche, perchè frequentissima è quella malattia della segala. Nel 1779, anche in Piemonte si è osservata quella cancrena a Dronero, perchè l'anno su piovoso, e molta segala patì quel morbo.

<sup>(</sup>b) La cancrena secca suol manifestarsi principalmente subito dopo la messe, perchè è stato osservato, che lo sperone perde moltissimo, o anche affatto la sua qualità venefica, quanto più lungo tempo è trascorso dalla raccolta della segala. Gli abitanti della Sologna ne sono così sovente attaccati, prima perchè mangiano generalmente quasi tutto pane di legala, la quale colà sempre più, o meno patisce lo sperone; poi perchè per la miseria sogliono farne del pane subito dopo la messe, anzi sovente ne mietono una certa quantità per farsene pane, ancorchè non fia ancor matura. A Dronero accadde, come si è detto, in un anno, che su piovoso, e nel tempo stesso accompagnato da gran carestia de' grani, sicche i contadini furono costretti, per levarsi la fame, anticipare le messi. Il BRUNNERO nell' Efemeridi de' Curiosi della Natura 1699, dice, che

digenza di profittare della nuova messe sono quelli, che principalmente ne sono offesi.

269. La causticità, o settica natura degli umo- Cura generi, i veleni, l'inerzia delle parti organiche per difetto di organo, o di nutrimento, che sono le cagioni principali della cancrena secca (264. 265.) essendo difficilissime a superarsi, non dobbiamo stupirci, s'ella fa alcune volte stupidissimi progressi; e per essa molto più servono quegli avvertimenti, che abbiamo dato nel precedente paragrafo, di non essere troppo solleciti a scarificare, ed amputare, prima che la cancrena non sia circoscritta, e terminata, tanto più se fosse critica ( 251., e seg. ) Dissi in quel luogo (249), che alcune volte negli scorbutici ( e lo stesso accade in altre cacochimie ) coll'apparizione della cancrena scemano gli accidenti universali, nè perciò si debbono meno usare gli specifici interni; imperciocche quegli. accidenti non diminuiscono già, perchè i liquori abbiano cangiata natura, ma perchè evacuandosi possono meno irritare in altre parti, e farvi impeto. Se la cancrena procedesse, da virulenza venerea, questa, combattendosi col mercurio, di quella anco s'impedifce il progresso: ma se da altra cacochimia dipende, gli alessiteri, ed i cordiali sono i soli rimedi, che si possa-

cancrene fec-

il pane caldo, e fresco molto più nuoce, che il freddo, e stantio. Leggasi pure a pag. 417. dello stesso tomo la Disserzzione particolare dello stesso Abate Tessier sur la maladie du seigle appellée ergot, dove dà un' esattissima descrizione di questa malattia della segala, e le figure di diverse spighe, che ne sono attaccate. E sopra tutto leggasi l'altra sua Dissertazione sur les effets du seigle ergoté inserita a pag. 587. del secondo tomo della medesima Società.

no usare, non avendo la Medicina altro speci-

Come se ne possa sedare il dolore.

270. L'atroce dolore, che non di rado precede, o accompagna le cancrene secche ( 264. 269. ) in alcuni fu superato collo stillicidio, o colle fomentazioni di latte tiepido, di brodo di budella, e di trippe, di testa, e di collo di montone, o coll'applicazione de' visceri fumanti di qualche animale, i quali rimedi pare, che debbano principalmente convenire, quando la parte è già arida, e adusta. Nulladimeno però P ILDANO, il quale in somiglievoli casi aveva provate utili queste fomentazioni emollienti, ed untuose, altre volte dovette usare la spirito di vino canforato, che a questo solo cedeva il dolore (a). Il Muys racconta (b) di avere instantaneamente calmato l'atroce dolore di una cancrena secca, che dalla gamba già si stendeva alla coscia, con una decozione di calamo aromatico, d'enula campana, di dittamo di Creta, di ruta, e di lupini fatta collo spirito di vino. Bisogna alcuna volta ricorrere agli opiazi, che altrimenti non si può sedare quell' atrocissimo dolore.

Operazioni, e rimedi
da praticarfi, quando
la cancrena
fiasi limitata.

271. Parlando della cancrena umida, abbiamo infegnato, quali debbano essere le operazioni, e i rimedi da praticarsi, quando la cancrena si arresti, e si circoscriva (252. e seg.) lo stesso deesi fare riguardo alla secca, e se sosse ridotta ad uno ssacelo persetto, e la parte, che occupa, non si potesse amputare, o non si dovesse pel pessimo stato, in cui si trova il malato, bisogna proccurare d'indurvi una maggiore

(a) Nel più volte citato suo Trattato de gangraena, 6 sphacelo cap. v.

(b) Appresso il BARBETTE pratique de la Chirurgio seconde partie liv. 1. chap. 14.

giore efficcazione, e impedire, quanto sia posfibile, la dissoluzione puerida; che a quel modo arefatta la parte, potrebbe lungo tempo conservarsi senza nuocere al malato, o almeno finche se ne possa fare l'amputazione. Il BOE-RAAVE (a) ha veduto un uomo decrepito, a cui si conservò quasi un anno una gamba quantunque cancrenata coll' applicazione di rimedj spiritosi, ed essiccanti. Si dovranno però separare le carni sfacelate, se ciò si potrà fare senza offendere le sane, anzi senza scoprirle, ed esporle al contatto dell'aria. Quando dunque la cancrena sarà veramente terminata, s'inzupperà la parte coll'aceto zeppo di salmarino, o con ispirito di vino cansorato, e s' inspergeranno polveri di colofonia, di mirra, o d'aloe, o ciò, che più giova, fi ungeranno le residue carni morte con olio di trementina, o con quello di spico vero, co'quali sogliono gli Anatomici conservare le loro preparazioni. Possono ancor meglio efficcarsi l'escare cogli spiriti acidi di nitro, di salmarino, di vetriuolo, o co' caufici attuali, avvertendo sempre, che la loro azione non si stenda sino alle parti vive.

272. Dopo che si saranno separate quelle carni morte, della porzione di cancrena, che vi rimane, bisogna aspettare, che la natura saccia la separazione da se stessa con una suppurazione purulenta: e allora si useranno que' digestivi, e que' cataplasmi, che abbiamo proposti sul sine dell' antecedente paragraso (257). Nè abbiate sassidio, se questa separazione alcune volte tardasse a prodursi, poichè sonvi os-

Metodo di cura, quando facciafi una buona suppurazio-

<sup>(</sup>c) Vedasi pure lo Swieten ne' suoi Commentarj agli aforismi dello stesso BOERAAVE aforismo 429. 20m. 1. pag. 758.

servazioni, ch' ella abbia tardato per molti mefi. Se in una parte, ove non fi potesse fare
l'amputazione, vi succedesse la carie, o la essiccazione dell'osso, se ne proccurerà la separazone con que' mezzi, che accenneremo altrove
(a). Ma quando in un articolo, essendo il malato ridotto in forze, e terminata la cagione
della cancrena, si vedesse la parte viva sopra
quel solco, che la distingue dalle parti morte,
elassica, non troppo turgida, e con una leggiere insiammazione, la quale persiste, e promette una suppurazione purulenta dall' estremità
delle carni vive, allora il Cerusico potrà determinarsi a farne l'amputazione.

Cura della cancrena prodotta da difetto di nutrimen-

273. Se la cancrena è stata prodotta per difetto di nutrimento, ciò dipendendo o dalla forza vitale, che diviene languida, ed inerte, come nella tabe senile, o da un vizio organico, che ha compresse, indurite, incallite, o fatte ossee le arterie di qualche membro, poco vi è da sperare. Si nutrirà il malato con cibi di facile digestione, e di buon sugo, il quale possa produrre un chilo sottile, e spiritoso, che presto ristori, e nutrisca, come sono i brodi di pollo, di colombo, di pernice, e di altri simili volatili montani: si ungerà la parte inaridita con olio di mandorle amare, di lombrichi, di costo, di cera, e simili, somentandola poi con qualche decozione aromatica, come di foglie di maggiorana, di scordio, di serpillo, di bacche di ginepro, di lauro, di femi di senapa bolliti in vino bianco generoso: la quale fomentazione, perchè più facilmente penetri per quelle inerte parti, alcuni propongo-

<sup>(</sup>a) Vedete nel Trattato delle ulcere il capitolo delli ulcere con carie dell'osso.

no, che prima vi si applichino le coppette, e vi si facciano fregagioni, sino che la parte diventi qualche poco rossa. Giovano molto più le applicazioni di visceri, o di animali caldi sumanti. Se poi vi si produce lo ssacelo, si tratterà, come abbiamo detto, per le altre cancrene.

274. Il DODART, che è stato il primo a parlare nel 1676. (a) della cancrena secca prodotta dal pane fatto colla fegala infetta dello sperone. dice, che l'orviesano, e il decotto di lupini erano stati provati utili, per arrestarne, i progressi, e che si poteva sperare di prevenirla coll' uso degli spiriti ardenti, e degli alcali vo-Latili. Il LANGIO, che l' ha offervata nella Svizzera negli anni 1709., e 1716. (b) scrive, che nel suo cominciamento giovarono gli emeuci, i cordiali, e i sudorifici, e alla parte gli spiritosi, e i cataplasmi risolventi: fatta poi che era, le scarificazioni, indi i digestivi animati, e le polveri aromatiche, e assorbenti : dannoso era il ber vino, il mangiar frutti, butiro, e altri alimenti di difficile digestione. E veramente le replicate sperienze dimostrarono confistere la cura esterna nel fomentar la parte cancrenata collo spirito di vino canforato, e. coll'acqua di fiori di sambuco: i casaplasmi ri*folventi* giovano, quando v'è infiammazione. apparente, e gli aromatici, quando la pelle è divenuta livida, secca, e dura; all'opposto sul principio, allorchè essa è semplicemente stupida. conviene avvilupparla con compresse inzuppate in un mescuglio di ugual quantità di butiro, e

Di quella prodotta dalla fegala infetta dello sperone.

<sup>(</sup>a) Vedasi il Journal des Savans di quell'anno.
(b) Vedete Caroli Nicolai LANGII descriptio morborum ex esu clavorum secalinorum. Lucernze 1717. in 8.

BERTRANDI TUM. TOM. 1.

di spirito di vino, oppure spalmare le stesse compresse col seguente unguento:

R. Ol. olivar. lib. iij., vini albi gener. lib. 1. s., Terebinth. lib. 1., eer, flav. lib. ss., santal. rubr. unc. ij. misc., s. s. a. unguentum.

Non si deono sare nè scarificazioni, nè amputazioni, infino a tanto che la cuncrena fia affatto circoscritta, e già incominciata la suppurazione purulenta, anzi il Cerusico non dee altro fare, che ajutare la natura nella separazione delle parti morte dalle vive, e neppur essere troppo sollecito in ciò fare. La cura interna si principierà dall' emetico, o da qualche purgante, onde nettare le prime strade; poi si farà bere all' ammalato l'infusione di siori di camomilla, e di fambuco, entro cui sciolto fiafi uno, o due ottavi di triaca, e se il posso è concentrato, si useranno i diaforetici ancor più forti, come il sal volatile di corno di cervo, il sale ammoniaco, la polvere temperante dello Sthal ec. La china-china, che sovente ha fatto tanto bene nelle altre cancrene (257), niente ha giovato in questa: piuttosto qualche vantaggio si è ricavato dagli acidi sì vegetabili, che minerali; nè inutile fu la cavata di fangue nel principio del morbo, almeno per calmare i dolori.

## Nota da agginigeast álla pog. 156. della fecondo Parte.

(\*) Alla pag. 934. della Storia del IV. Tom. della Società Reala di Medicina di Parigi leggesi la seguente ricetta comperata dal Re di Francia dalla Vedova del signor Weisse, il quale, mentre vivea, ne saceva un secreto:

## RIMEDIO ANTILATTEO.

Arifoloch. retund.,
radic. filia. mar.,
calth. vinear.,
perficar.
folior. hyperic., dum floret,
vinc. pervinc.,
betonic., werben.

Folior., & flor. ferpyll.,
primul. veris, visc. quercin.,
laureol., polypod. quercin.,
gallii. lutei, flor. til.,

radic. scrophular. major.

Dopo aver contuse le radici, e mescolate tutte queste piante insieme, se ne prende, quando se ne vuol far uso, una dramma, cui si aggiunge da mezza dramma fino a due, fecondo la forza, e il temperamento dell'ammalata, di fal d'Inghilterra, e mezi za dramma di follicoli di senna per le persone delicate, oppure mezza dramma di foglie per le più robuste. Si mette il tutto in infusione per due ore a un fuoco moderato in un quartino di fiero di latte depurato dentro un vase di terra ben chiuso: si cola poi l'infusione, e si divide in due dosi uguali da prendersi a un' ora di distanza l'una dall' altra. Un' ora dopo aver presa l'ultima dose, l'ammalata può mangiare una leggiere zuppa al brodo. Questo rimedio vuol esser continuato per quaranta giorni, osservando in tal tempo una regola esatta nel vitto, coll'astenersi dalle cose salate, dagl'intingoli, dall' infalata, dai frutti crudi, e dai latticini, e bevendo vino inacquato: ogni otto giorni bisogna prescriver-le un purgante composto di due once, e mezzo di manna, e mezz' oncia di sal d' Inghilterra sciolti nell' Infusione di cicoria selvatica, e di cerfoglio. Il giorno

della purga fi sospende l'uso dell'altro rimedio, co-

me pure nel tempo, che colano i mestrui.

I Commessari deputati dalla Società Reale a provarlo su diverse donne affette da insuppamenti lattei, riserirono, che questo rimedio produce costantemente più dejezioni lungo la giornata, nelle quali sovente si osservano dei grumi di latte ugualmente che nelle urine, e che l'hanno sperimentato molto salutare. Avvertiscono però, che non se ne dee sar uso, se non quando o quegl' insuppamenti non sono accompagnati da alcuna insiammazione, o questa è già calmata coll' uso degli attemperanti, e antissossistici. Vogliono, che 'l sal d'Inghilterra si adoperi alla dose di sola mezza dramma, o al più di una dramma per volta, perchè, a dose maggiore, e continuatone l'uso per lungo tempo, riesce troppo purgante, e dannoso. Also 'ncontrario quelle leggieri evacuazioni continuate non indeboliscono in nessun modo, anzi accrescono l'appetito. Vorrebbero pure, che la formola sosse resa più semplice in questo modo:

R. Summitee. florent. fambuc.

gallii lutei,
hypericon.,

Folliculor. fenn.,

fal. cathartic.

a fcrupul. j.

a fcrupul. j.

a drachm. fs.

ad drachm. j

... N. B. In vece del Sal d'Inghilterra si può usaro il nostro Sal di Canale, che ha la stessa virtù.

# INDICE

Degli Articoli con	tenuti	in a	uelto	primo	Ta	omo 2
PAR	•	PRI				1
_						:
DEdica .			• .	•		' V
Ragionamento sull	a vita	. e 1	ugli	Audi d	eZ	·
ŘERTRANDI .		_	. •			ıí
Orazione sopra gli	Rudi	per l	a Chi	rurgia	•	97
Hepatis Descriptio	, , ,		•	•	•	133
De hepatis abscel	fibus	capit	iš VI	lneribi	13	- , ,
<b>fupervenientibus</b>	3		•	•		188
Apologia della pre		e Dil	Tertazi	ione		198
		_	_		-	
PART	LE 2	ECO	NDA	•	•	
Discorso prelimina	re al T	rattat	o de' T	Tumori		1
De tumori in gene	rale			•		I
De' tumori classe p	rima.	che .	contie	ne i tu	<b>6</b> -	
mori umorali			_	•		17
De' tumori infiamn	rati ii	n gene	rale		•	18
Del flemmone	•	•	• .	•	•	29
Del bubone	•	•	· ·	: • • •	•	43
Dell' infiammazione	e delle	ton	fille ,	e del	ľ	•
uvola	\ !•• • •	. ,		• .		51
Della infiammazio	ne del	le ma	mmell	le .		64
De tubercoli infian	nmato	rj		٠ ٠٠٠	.•	71
Del panereccio	•	<b>.</b>	•	• '	•	76
Della risipola	•			•		88
Del carboncello	•	•		•	٠.	98
Degli ascessi intern	i in	genera	le	•	•	106
del ci		•	•	•	•	109
del pe	elto	•	•	•		112
dell <sup>†</sup> d		ine	•	•	•	120
delle	natich	ie, e	della	coscia		146
Degli ascessi lattei		•	•	•		148
Della cancrena	•	•	•	•	•	156

Della cancrena umida
Della cancrena secca

## ERRATA.

CORRIGE.

#### PARTE PRIMA.

Pag. 74. lin. 18. colombata . colobomata.
Pag. 78. lin. 4. in histribus . in his tribus.
Pag. 50. Fidatici alla memoria abbiam preso un leggier equivoco nell'esposizione della teoria del Pouteau circa gli ascessi del segato, il qual equivoco è riparato dall'Apologia del Bernandi pag. 188.
Pag. 192. lin. 28. abscussus . abscessus.

## PARTE SECONDA.

Alla pag. 56. note (2), e (b) aggiungus: Vedansi pure i numeri 469., 470., e 471. di questo Trauco.

## Imprimatur

- Fr. VINCENTIUS MARIA CARRAS Ord. Præd., S. T. M., & Vic. Gen. S. Off. Taurini.
- V. BELLARDI Med. Fac. Prior, & Regens.
  - V. Se ne permette la Stampa.
- GARRETTI DI FERRERE per la Cran Cuncellaria.

# VITTORIO AMEDEO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO:

E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOJA, DI

MONFERRATO, E PRINCIPE DI

PLEMONTE.

A Fratelli Giuseppe, Giacomo, e Stefano Reycends Libraj nella Città di Torino ci hanno rappresentato il loro desiderio di dare alle Stampe i Trattati, ed Opere del su Prosessore di Chirurgia nella Nostra Università, e Regio Cerusico Ambrogio Bertrandi, le quali con gravi spese sarebbe loro riuscito di far compilare, e ridurre da parecchi Manuscritti dal medesimo lasciati, con avergli eziandio fatti illustrare di molte importanti, ed utili aggiunte, e note per proccurare dal canto loro in una così interessante materia un vantaggio agli Studenti di Chirurgia, non meno, che al Pubblico; e di stampare altrest una nuova Edizione del Dizionario Italiano-Francese, e Francese-Italiano dell' Alberti, arricchita di molte utilissime addizioni, e ridotta ad una pressocchè totale perfezione. E siccome qualora fossero in progresso le suddette Opere ristampate, e vendute da altri Libraj, od introdotte dal fuori Stato, verrebbero i Ricorrenti a perder il frutto delle loro fatiche, e delle considerevoli spese, come sovra, fatte, CI hanno supplicati in vista dell'utilità, che può risultare al Pubblico dall' Edizione delle medesime ec. Epperò colle presenti di Nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Configlio, abbiamo accordato, ed accordiamo fenza pagamento di finanza alli prenominati Mercanti Libraj Giuseppe, Giacomo, e Stefano Fratelli Reycends il privilegio privato pendenti anni quindici da cominciare dalla data delle presenti di far stampare da quello Stampatore, che verrà da essi nominato, le Opere del fu Professore di Chirurgia Ambrogio Bertrandi, ed il Dizionario dell' Alberti Francese-Italiano, e Italiano-Francese; inibendo a chiunque altro ne' Nostri Stati di stamparli, ristamparli, o farli stampare sotto il medesimo, od altro titolo, oppure, d'introdurli, smaltirli, e venderli nel caso, che venissero stampati suori Stato; e ciò tutto sotto la pena della perdita de' libri, i quali cederanno a' Supplicanti, e di cinquanta scudi al Fisco Nostro applicandi per ogni contravvenzione, mandando a chiunque sia spediente di osservare, e sare osservare le presenti, che tal è Nostra mente. Dat. alla Veneria li nove del mese di Maggio l' Anno del Signore mille settecento ottanta sei, e del Regno Nostro il decimo quarto.

# V. AMEDEO.

V. LANFRANCHI PP. e Reg. V. Adami di Cavagliano. V. Di Cravanzana.

CORTE.

Registrata al Controllo Generale li 16. Maggio 1786. Reg. 69. Patenti a 22.

Mass.

# TORINO:

Dalla Stamperia d' Ignazio soffietti.

•

, • . • • .

فانتخ فنعد

